



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.



About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



3 2044 106 479 256

FL
47
S01
P
1799





Моря отъ Мборавъ!!-

J. S. I. Hattlerberger del. et inv. 1777.

Gravé par M. J.

F L O R A

P E T R O P O L I T A N A .

Sistens plantas in Gubernio Petropolitano sponte crescentes, tam eas quae olim in Flora Ingrica Krascheninnikovii a Gortero enumeratae sunt, quam novas post annum 1764 hucusque a variis Botanicis Petropoli degentibus detectas, nunc vero generice ac specificè descriptas cum additione variarum observationum, atque Russica plantarum denominatione,

C u r a n t e

Med. Doct. Confil. Aul. Colleg. Imper. Medici et Societat. Oeconom. Petropolit. Sodali, nec non Botan. ac Mat. Med. Professore publ. ord.

Gregorio Sobolewskj.

Cum approbatione Collegii Imperialis Medici.

P E T R O P O L I .

Typis Collegii Imperialis Medici.

1 7 9 9 .

Recd. Mch 1907

4
306
8

AUGUSTISSIMO AC POTENTISSIMO
ROSSORUM IMPERATORI
PAULO PRIMO
AUTOCRATORI MODERATISSIMO,
- PIETATIS AC IUSTITIAE
OBSERVATORI TUTORIQUE
STRENUISSIMO, FELICISSIMO,
SCIENTIARUM ET ARTIUM
PROMOTORI MUNIFICENTISSIMO,
PATRIAE PATRICLEMENTISSIMO

Floram hanc Petropolitanam

Summa cum devotione

D. D. D.

Subditissimus

Auctor.

LECTORI BOTANOPHILO

S.

Operae pretium esse putamus paucis exponere hujus opusculi rationem. Clar. vir Stephanus Krascheninnikow quondam Botanices et Historiae naturalis Professor Petropolitanus, absoluto decem annorum per Sibiriam itinere, ad Botanices provinciam Petropoli administrandam evectus ex professo totam Ingriam peragrans plantas obvias studiosissime examinavit, accurate descripsit, doctisque observationibus illustravit, easque ad methodum Royeni disposuit, atque codicem suum manuscriptum plantas 506 continentem, ante mortem suam, Academiae scientiarum tradidit.

Hunc codicem clar. vir David de Gorter ex archivis Academiae protractum ex Ammanni, Buxbaumii, Gmelini et Siegesbeckii operibus auxit, plantas obvias diligenter a se observatas inseruit Methodoque Linnaeana secundum Systema Naturae editionis decimae disposuit, atque anno 1761, sub nomine Florae Ingricae prelo submittere curavit, deinde anno 1764 Appendicem plantarum a celeberrimo Erico Laxmanno, Falkio, Lomonosovio et Staehelino detectarum addidit, asserens quae in sua praefatione pag. 6. „Eam publici juris facere non ideo, quod Ingrica tellus proferat plantas in aliis Imperii Russici, aut proximis Sveciae provinciis desideratas, sed ut Ingrica etiam exstaret Flora, cum europaeae fere omnes prodierunt. „ —

Nunc vero aliae sunt rationes, cur haec Flora Petropolitana in lucem prodeat. Nam ab eo tempore scientia ipsa botanica maxima adepta est incrementa; characteres novi detecti sunt; definitiones ac phrasae botanicae accuratiores plenioresque a cellb. viris Murrayo, Iaquino, Scopoli, Crantzio, Wildenowio, Wiggerfio, Iuffievio, Gmelino aliisque factae sunt, multisve observationibus ornatae ita, ut plurimae plantae a botanicae tyronibus facilius quam antehac dignosci potuerint, quod coram in lectionibus publicis discipulis meis non semel demonstravi. Deinde aucta quoque est necessitas urgentior edendae hujus Florae ob auctam multitudinem Medicinae ac Chirurgiae studioforum in duobus amplissimis Nosocomiis Petropolitanis, pedestri et maritimo, quorum ibi plus quam ducenti sumptu Imperiali aluntur, et inter caeteras scientias etiam Botanicam addiscunt stirpesque indigenas cognoscere cupiunt: exemplaria vero Florae Ingricae sunt jam distrata, unde illi in hac re penuriam patiuntur. Itaque ut illis praestantissimis auditoribus meis Botanicae que cultoribus ingenuis succurrerem in animo constitui, plantas circa Petropolim crescentes tam eas, quae in Flora Ingrica Krascheninnikovii a Gortero enumeratae sunt, quam novas a me anno 1775, et sequentibus, atque postea a celeb. viris Rudolpho, Boeberoque detectas, quae in descriptione Gubernii Petropolitani a clar. Georgi memorantur, aliasque curatius perlustratas generice ac specificè describere, sub nomine Florae Petropolitanae, nam plurimae earum in ipsa urbe vel non adeo procul ab urbe in hoc Gubernio proveniunt: atque non ideo, ut etiam Petropolitana exstaret Flora, nec pro eruditis botanicis, sed ut habeant studiosi nostri etiam tyrones elenchum, unde

plantas indigenas hujus Gubernii sibi notas fecere possint.

Qua propter ex variis clarissimis auctoribus, Murrayo Gmelino, Jussevio, Wildenowio, Moenchio et ex Flora austriaca portatili, aliisque omnia ad meum scopum pertinentia excerpta, eorum auctoritati innixus, quod grato animo agnosco, summa qua potui cura hic in utilitatem diligentissimorum auditorum meorum digessi; definitiones plurimas amplificavi, iconesque plantarum ex eorum quoque operibus citavi. Locos natales ubique sedule per viginti quatuor annos a me observatos eos praetuli, qui propiores ab urbe Petropoli essent, ne juvenes botanophili, ad stirpes querendas, longo itinere indigeant; attamen nonnullos breviter assignare coactus fui annotato nomine auctoris inventoris, ubi mihi, tam ob officium medico-practicum, quo per 15 annos in Nosocomiis quatuor legionum praetorianorum fungebar, quam ob calculum renum et vesicae, quibus saepe discrutior, occasio non fuit data longius exspatiari. Nihilominus tamen his tribus ultimis annis, iterum munere Professoris assumpto, in excursionibus, quamvis brevissimis, multas herbosas oras adivi, quas antea visitare non potui, plantasque ibi florentes, aut defloratas vario tempore quantum potui studiosissime observavi, dubiaeque durationis stirpes semper in meo proprio horto plantare curavi, ut inde certior esse possim an planta sit annua, an perennis, quod in Flora Ingrica fere neglectum erat. Quo ad locos natales plantarum hic memoratu dignum est, eos ab anno 1764 maxime immutatos esse ita, ut frustra quaeras plantas, quae ibi indicatae fuerunt, praecipue in urbe Petropoli, uti in insulis apotheca-

IV

ria, crucis, lapidea, bafileenfi; in parte Wiburgeni, circa Nofocomium pedestre et maritimum, in ripa feptentrionali Nevae fluvii prope Ochtam, dein Caterinhoffii aliisque in locis, tunc temporis vacuis et desertis incultisque, ubi nunc domus variae ac Palatia splendida aedificata funt; horti oleracei, plantationes variae, ambulacra ve confita; ubi vero fylvae amoeniffimae virefcebant betulam nanam aliasque plantas rariores continebant, ibi nunc prata nuda et Forum publicum est, uti circa Monasterium Newsky, et circa nofocomium pedestre ubi Ledum palufre et Lichen Islandicus in totum perierunt. In arvis et agris mutatio quoque locorum fatis notabilis accidit: ubi ante quindecim annos armenta pafcebantur, aut prata fertiliffima erant, aditusque omnibus patebat, nunc ibi agri culti funt vel Praedia magnifica exstructa et feptibus obvalata funt, uti circa viam Sarfcoseliensem, et viam Ochtensem etc: ubi antea Gentiana cruciata, Orchides, aliaeque plantae pulcherrimae crefcebant, nunc ibi avena fativa, aut hordeum vulgare, fecale cereale, vel folanum tuberosum locum occupant. Poffeffiones etiam quod attinet, nullam effe diu stabilem praeter nomina propria urbium vel pagorum aut praediorum ita, ut praedium vel villa aliqua intra paucos annos pluries permutet fuos dominos poffeffores que; quare in hoc opufculo nullum poffefforem nominare ftatui, fed nomina propria pagorum et locorum vulgo cognitorum indicaui. Unde patet, praeter alias caufas, et harum mutationum ergo, neceffitas, in tali Flora subinde locos revidendi, et iterum reindicandi, ut illa maneat femper tyronibus botanophilis ad ufum idonea. Plantas officinales etiam indigitare ftudui. Deinde nomina ruffica plantarum, quae jam exi-

stebant, simplici modo assignavi, quam plurimis vero plantis ruflice innominatis a me inventa dedi, appofita nota Sob. In cryptogamiis genera nonnulla, et species ad hodiernum Botanicae statum accommodavi plurimas que noviter a me observatas inferui. Ast fungorum, in primis agaricorum, immensum numerum nostra tellus producit, uti mihi quotannis videre contigit; et multoties colligebam eorum numerosam varietatem; sed doleo, quod fortuna non mihi permittit per aliquod temporis spatium ruri commorari, ut eos commode examinare ac secundum sistema definire potuiffem; sunt enim fugaces et faciem suam cito immutando non permittunt diu in eodem statu se videre: (*) interim et id fatendum est, quod illi a quocunque auctore facilius pro lubitu describi, quam dein ab aliis definiri possunt, nisi cum adminiculo iconum, quae saepe etiam fallunt; et quis, nisi ditissimus, icones et figuras omnes conquirere potis est? Iconibus autem destitutus ipse plurimas species fungorum ad naturam describere tentavi, quas cum definitionibus auctorum comparans vidi paucas descriptiones illas exactas in libris inveniri. Nec mirum est, ludunt enim, praecipue agarici, varietate colorum, quos vix quisquam mortalium verbis exprimere potest; tum pilei magnitudine, figura orbiculari, hemisphaerica, campanulata, conica, cylindrica, infundibuliformi; centro umbonato vel depresso; margine integro, striato, aut lacero, lobato; super-

(*) *Fungos non ut herbas facile exsiccare, in parvum fasciculum compingi, domum duci, servari posse; tum quod post exsiccationem, — vix eundem liceat dignoscere fungum. Linnei Flora lapponica. p. 352.*

VI

ficie tota ficca nitente, pulverulenta, maculata, squamosa, aut glabra, humente viscida; substantia crassa, solida, carnosa, spongiosa, aut coriacea, tenui, pellucida; lamellis concoloribus aut diversi coloris, crassis, integris, aut dentatis, crenatis, tenuibus, aequalibus, aut plurium ordinum, ramosis, inaequalibus, densis aut distantibus, stipiti contiguis, aut liberis, sive abruptis, aut in stipitem decurrentibus; stipite brevi, cylindrico, crasso, farcto, solido, aut elongato, tenui, fistuloso, glabro, aut striato, intorto, annulato, volvato, squamoso, integro, aut lacero, supra crassiore dilatato, aut infra bulbofo, globofo, pileo concolore, aut vario. etc. Boleti etiam variant coloribus, superficie, figura pilei stipitisque; tubulis vel poris integris rotundis, angulatis, aut laceris figurae variae; non dicam de aliis fungorum minorum generibus post b. Linneum a variis celeb. botanicis noviter constitutis, quorum etiam magnam copiam dari hic certum est; quam ob rem, et si plurimos examinavi et variis momentis annotavi, sed in definitos, in aliud tempus, vel aliis post me definiendos relinquere coactus sum. Muscorum algarumque etiam dari scio plures species in hoc Gubernio crescentes, quae numerum plantarum Florae nostrae augere possent, et quae itidem ob defectum occasionis indefinitae posteris relinquuntur. Clarissimi viri et Botanici egregii, qui plantas Florae hujus post Krascheninikovium detexerunt earumque numerum auxerunt, sequenti modo indicati sunt: (B.) Boeber. (F.) Falk. (G.) Gorter. (L.) Laxmann. (Lom.) Lomonosow. (P.) Patrin. (R.) Rudolph. (St.) Staehlin. a me vero detectae vel definitae hoc signo (Sob.) sunt notatae. Plantas in agris et hortis cultas, quas alii interdum floris suis inferere solent, nullas

hic memoravi ; nam si omnes illas quae in hortis Imperialibus Petropoli, Peterhoffii, Sarfcoselii, Gatzinae et in Pawlowsko expresso jussu AUGUSTISSIMI NOSTRI AUTOCRATORIS et CLEMEN- TISSIMAE IMPERATRICIS ex variis exteris regionibus, ex Anglia praefertim, advectae sunt summo- que studio in ambulacris et hybernaculis coluntur; tum eas, quae a Celeberrimis illustriffimis que Botanophilis, uti Principe Iussupow, Senatore Petro Soymonow aliisque plurimis, praecipue hoc tempore in hortos suos introductae sunt, attingere solum, non vero describere, voluiffem, in immen- sum volumèn Flora haec excresceret; quo enim jure Triticum, Hordeum et Avenam civitate dona- rem, eo etiam Brassica Lactuca, Beta et forte Bromelia Ananas donanda forent, nam omnes hae sunt esculentae et in maxima hic quantitate producun- tur; caeterae vero plurimae in aprico fere sponta- neae crescunt. Ad finem indices, latinus et ruffi- cus, pro facilitate inveniendi species, tyronibus adjunguntur.

Dabam Petropoli d. 5. Iulii 1799.

EPIGRAPHE.

Ut enim aliquis foli cujusdam plantas, siquidem paucas vel nullas omittere velit, describat, eum oportet et pedibus et animo bene valere tum in conquirendis plantis, tum ut earum nomina rite designet. Dillen. Praefat. in Catalog. plantar. Giffensium.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

HIPPURIS. Calyx nullus. Corolla nulla. Stamen filamentum vnicum, margini bilobo infidens. Anthera compressa. Germen oblongum, inferum. Stylus subulatus, stamine longior, stigma simplex acutum. Pericarpium nullum. Semen vnicum, subrotundum, nudum.

1. **HIPPURIS VULGARIS.** foliis octonis subulatis, (interdum tredecim verticillatis; similis equisetu sylvatico.) (Gorter.) Fl. dan. tab. 87.

✓ Habitat ad ramum fluvii Neuae Carpowca vocatum, in insula apothecaria, tum in variis paludibus et aquis stagnantibus. Floret Majo, Junio.
2) Водяная сосонка обыкновенная Sobol.

DIGYNIA.

CALLITRICHE. Calx nullus. Petala duo. Capsula compressa bilocularis, tetrasperma. Semina nuda, membranaceo-marginata. (Nonnunquam flores monoici, masculus in parte superiori, infra foemineus aut hermaphroditu.)

2 CLASS. II. DIANDRIA MONOGYNIA.

2. CALLITRICHE VERNA. Foliis superioribus ovalibus, apice integris, (floribus dioicis.) (G.) Gaertn. de fruct. et Sem. Cent. 5. t. 68. f. 4.

In fossis aquosis circa Nosocomium maritimum, nec non in palustribus et aquis stagnantibus. Floret Majo. ☉ Весенняя водяная звѣздочка Sobol.

3. CALLITRICHE AUTUMNALIS. Foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. (G.) Loefel. fl. prusf. tab. 38.

In fundo Nevae fluvii et pasim in fossis cum priori. Floret autumnno. ☉ Осѣнная водяная звѣздочка. Sobol.

C L A S S I S II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

CIRCAEA. Calyx diphyllus superus. Corolla bipetalata. Capsula infera, bilocularis, hispida. Semina solitaria.

4. CIRCAEA LUTETIANA. Caule erecto, racemis pluribus, foliis ovatis subserratis hirsutis. (Fructibus villis uncinatis.) (Rudolph.) Flor. Dan. tab. 256.

In sylvis humidis vmbrosis Caterinhoffii, et in aliis locis similibus. Floret Julio. 24 Парижская колдунница. Sobol.

5. CIRCAEA ALPINA. Caule ramosissimo depresso, foliis cordatis dentatis pilosis. (glabris peta-

lis albis. Caulis transparentes). (G.) Flor. dan. tab. 210.

Ad radices arborum infulae Basillienfis, et Cate-
rinhoffii, in locis humidis. Floret Augusto. 2/ Кол-
дунова шрава. Rufs. Горная колдунница.
Sobol.

VERONICA. Corolla limbo quadripartito: lacinia in
fima angustiore. Capsula bilocularis, apice emar-
ginata. Calyx quadripartitus, aut quinqueparti-
tus.

6. VERONICA SPURIA. Spicis terminalibus, fo-
liis ternis aequaliter ferratis; (calycibus qua-
dripartitis; corolla caeruleo-purpurascente, fauce
squamis villosis. (G.) Gmelin. iter. 1. t. 39.

In pascuis montosis circa Krasnoje Selo. 2/ Средня вероника, fine подложная. Sob.

7. VERONICA MARITIMA. Spicis terminalibus,
foliis ternis aequaliter ferratis. (In ficcioribus
plerumque foliis conjugatis est.) (G.) Flora dan.
t. 374.

Ad ripam Newae fluuii circa Caterinhof, et in
littore maritimo prope Strelinam et Peterhof-
tum in sylvis prope Lugam. Floret Iulio, Augusto.
2/ Сини сулшанчики, vel приморская веро-
ника. Sob.

8. VERONICA LONGIFOLIA. Spicis terminali-
bus, foliis oppositis lanceolatis ferratis acumi-
natis in petiolum desinentibus. (Caule polyta-
chio, hirsuto, calyce quadrisido, squamula hir-
suta suffulto, corolla violacea, albave, labio
superiori incumbente. Variat foliis angustis et

4 CLASS. II DIANDRIA MONOGYNIA

latioribus, spicisque septem aut octo.) (B) Sabbat. h. Rom. 2. tab. 48.

In viciniis urbis Oranienbaum, et in pratis humidis, parce. Floret Julio, Augusto. 2 Долголистая вероника. Sobol.

9. VERONICA SPICATA. Spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis, caule ascendente simplicissimo. (Calyxibus quinquefidis. Folia plus minus villosa. Altitudine admodum variat: nunc vix spithamea, vix pollicari, nunc ultra-pedali. Spicae semper inflectuntur.) (G.) Flor. dan. t. 52.

In fylua circa ostium Narovae fluvii locis ficis et arenosis abunde crescit. Praeterea nusquam observata. Floret Julio. 2 Андреевъ крестъ. Russ. Андреевская вероника. Sobol.

10. VERONICA OFFICINALIS. Spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. (Geniculis radicanibus; foliis scabris, nunc ternis, nunc oblongis utroque latere dentatis, nunc lanceolatis latere inferiore dentatis) (G.) Fl. dan. t. 248. Veronica officinar. Ubivis in fyluis opacis, gramineis. Floret Junio, Julio. 2 Вероника аптекарская Russ. Sobol.

11. VERONICA SERPYLLIFOLIA. Recemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris, crenatis, (oppositis, paribus duobus; caule procumbente. Calyces quadrifidi. Corollae albae lineis caeruleis, fauce virente.) (G.) Fl. dan. t. 492. Planta admodum varians pro natura foli. Varietates 6, enumerat Schmidt flor. Boëmica. Adducta aquarum et vias; ut et in sylvarum locis sterilibus et humidiusculis. Floret Majo et Junio. 2 Богородичнолистная вероника. Sobol.

12. *VERONICA BECCABUNGA*. Racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. (Foliis carnofis, denticulatis glandulofis, corolla laete caerulea, racemi oppofiti, longi.) (G.) Flor. dan. t. 511. Beccabunga officin.

In pratis aquofis infulae apothecariae, tum prope Sarfcoje Selo, et circa montes Krafnofelii, Duderhofii, et vbiq̄ue ad riuulos. Floret Junio. 24
Вероника ручейная. Sob.

13. *VERONICA ANAGALLIS*. Racemis lateralibus, foliis lanceolatis ferratis, caule erecto, (calycibus quadrifidis, floribus confertis erectis, caerulefcentibus. Tota succulenta) (G.) Rivin. t. 100.

In rivulis infulae apothecariae, et circa fluuium Lugam, nec non in aliis locis humidis, cum praecedente. Floret Junio, Julio. ☉ Водяная вероника. Russ. Sob.

14. *VERONICA SCUTELLATA*. Racemis lateralibus laxis diuaticatis alternis: pedicellis pendulis, foliis linearibus subintegerrimis, (caule angulato, procumbente; calyce quadrifido, corolla rubella.) (G.) Fl. dan. t. 209.

In uliginofis infulae Bafileae et in aliis locis humidis gramineis vulgatiffima planta est. Floret Junio. 24 Щитовая вероника. Sobol.

15. *VERONICA CHAMAEDRYS*. Racemis lateralibus, foliis ovatis fessilibus rugofis dentatis, caule bifariam pilofa. (Racemis lateralibus oppofitis, calycibus quadrifidis. Admodum varians: caule ascendente, prostrato, erecto, corollis albis, carneis, caeruleisve. Calycina foliola inaequalia lanceolata.) (G.) Fl. dan. t. 448.

Ubiuis in pratis copiose prouenit, et prima omnium sui generis, excerpta veronica serpyllifolia, floret. 2 Дубровочная вероника. Sobol.

16. VERONICA AGRESTIS. Floribus solitariis, foliis cordatis, petiolatis, pedunculo breuioribus, (caule procumbente, pedunculis axillaribus longis, calycibus quadrifidis basi gibbis, corolla saturate caerulefcente. Calycina foliola ovata aequalia.) (G.) Flor. dan. t. 449.

Habitat iu locis cultis, circa Pulkouo in montofis, et Pargelouii. ☉ Пашенная вероника. Sobol.

17. VERONICA ARVENSIS. Floribus solitariis, foliis cordatis sessilibus pedunculo longioribus. (Caule afcendente, floribus axillaribus subfessilibus pallide caeruleis, calycibus quadrifidis, foliolis lanceolatis inaequalibus.) (R. Sob.) et Fl. dan. t. 515.

Habitat in arvis Crasnofelii, Ligoui, et Murini. Floret Junio, Julio. ☉ Полевая вероника. Sob.

18. VERONICA HEDERAEFOLIA. Floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis (trilobisque, caule procumbente, calycibus quadrifidis, corolla pallide caerulea rubellaue, capsula loculis dispermis.) (R.) Fl. dan. t. 423.

Circa Petropolim in ruderatis, sed parce. Floret Junio, Julio. ☉ Бударолистная вероника. Sobol.

19. VERONICA TRIPHYLLOS. Floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce longioribus, (subtus rubellis, carnofis, aggregatis, caule procumbente, floribus solitariis longe petiolatis in folioforum capitulorum rosulis caeruleis.) (G.) Fl. dan. t. 627.

In insula Petri, et Basilii circa portum triremium, et circa fabricam pulveris pyrii Ochtemsem infrequens. Floret Junio, Julio. ☉ Трилистая вероника. Sobol.

20. VERONICA VERNA. Floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce brevioribus, (Calycibus quadrifidis, corolla caerulea; annulo viridi. Caule erecto stricto.) (Sob. R. B.) Fl. dan. t. 252.

In ficcis arenosis, et arvis. Floret primo vere. ☉ Весенная вероника. Sobol.

21. VERONICA ACINIFOLIA. Floribus solitariis pedunculatis, foliis ovatis grabris crenatis, caule erecto subpiloso. (minima, caule erecto, floribus caeruleis.) (B.) Воссон. мuf. 2. t. 102.

Habitat in montosis procliuibus prope Oranienbaum. Floret Junio et Julio. ☉ Тимьянолистная вероника. Sobol.

GRATIOLA. Calyx quinquepartitus; foliolis duobus exterioribus accesforiis patulis. Corollā inaequalis, refupinata quadrifida. Stamina quatuor, duo sterilia. Capsula bilocularis.

22. GRATIOLA OFFICINALIS. Foliis lanceolatis ferratis. Floribus pedunculatis. (Caulibus geniculatis, foliis, foliis oppositis subamplexicaulibus, floribus axillaribus, limbo quadripartito albo caerulescente.) (R.) Fl. dan. t. 863. Gratiola officinarum.

In pratis humidis circa Petropolim rarius occurrit. 24 Дикой авранъ. Russ. Благодать апшеркарская. Sobol.

UTRICULARIA. Calyx diphyllus aequalis. Corolla ringens calcarata, capsula unilocularis, globosa.

23. **UTRICULARIA VULGARIS.** Nectario conico, scapo paucifloro. (Foliis densis capillaribus, vesiculis purpurascensibus, floribus tribus aut quatuor racemosis, flavis, calyce purpurascensente, galea apice perforata.) (G.) Fl. dan. t. 138.

In paludibus insulae lapideae, et Catharinhoffii. Floret Julio et Augusto. 2 Волынчатка обыкновенная, Sobol.

LYCOPUS. Corolla quadrifida, lacinia unica superiore emarginata. Stamina distantia. Stigma bifidum. Semina quatuor retusa.

24. **LYCOPUS EUROPAEUS.** Foliis sinuato-ferratis, (interdum pinnatifidis, glabris villosis, floribus axillari-verticillatis albis, maculis purpureo-caeruleis. Eminus Mentham mentitur.) (G.) Sabbat. h. rom. 3, t. 53.

In fyluis subhumidis Strelinae, ac Peterhoffii copiosissime et Petropoli ad fossas et vias passim. 2 Волчья нога европейская. Russ. Sobol.

D I G Y N I A.

ANTHOXANTHUM. Calyx. Gluma bivalvis, uniflora, oblonga, valuula interiore majore. Corolla. Gluma bivalvis aristata, arista reflexa. Semen unicum, corollae glumae adnatum.

25. **ANTHOXANTHUM ODORATUM.** Spica oblonga ovata: flosculis sub pedunculatis arista

longioribus. (Culmi nodis tribus aut quatuor fuscis, foliis pilosis, panicula spicata, floribus quibusdam pedunculatis, aliis sessilibus, petalis inaequalibus, obtusis, a basi aristatis, antheris magnis vtrinque bifidis, luteis rubrisve.) (G.) Fl. dan. t. 666.

Im Campis et pratis syluosis passim. Floret Majo et Junio. 24 Колосокъ пахучій. Russ. Sobol.

C L A S S I S III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

• **VALERIANA.** Calyx nullus. Corolla monopetala quinquefida: basi hinc gibba. Semen vnicum, vel capsula (crusta non dehiscens) trilocularis. (Mira in hocce genere fructificationis partium diuersitas. In quibusdam calycis margo vix adest, in aliis quinquefidus; tubus corollae in aliis calcaratus, breuissimus in aliis; limbus in quibusdam bilabiatus. Stamina duo aut quatuor, vel sexus distinctus. Stigma vel trifidum vel globosum. Pericarpium vel nullum vel biloculare. Pappus vel adest vel non.)

26. **VALERIANA OFFICINALIS.** Foliis omnibus pinnatis dentatis, floribus triandris. (Dilute purpurascens, seminibus pappo plumoso. Variat: foliis ternis, foliis oblongis vtrinque dentatis,

foliis lanceolatis, latere inferiori dentatis, et utroque.) (G.) Fl. dan. t. 570.

In pratis laetioribus, et sylvis humidis umbrosis, circa viam Sarskofeliensem et Peterhoffianam, tum et Petropoli in infulis Nevæe fluvii, frequens. Floret Julio et Augusto. 2 Булдырянъ, sive Маунъ. Russ. Маунъ аптекарскій. Sobol.

IRIS. Corolla sexpartita, inaequalis, laciniis alternis geniculato-patentibus, majoribus. Nectarium, linea longitudinalis in vnguibus petalorum faepius barbata. Stigmata tripetaliformia, intus carinata, extus fulcata, cucullato-bilabiata, labio exteriori minore, interiore bifido.

27. **IRIS PSEUDACORUS** Foliis ensiformibus, corollis imberbibus, petalis interioribus stigmatibus minoribus, (luteis, antheris violaceis. Styli tripetaloides. Caules ramosi.) (G.) Fl. dan. t. 494. Acorus palustris officin.

In insula lapidea, tum in paludibus et stagnis ubique. 2 Косашикъ желшой, sive сабельникъ. Russ.

28. **IRIS SIBIRICA.** Caule subtrifloro tereti, foliis linearibus, germinibus trigonis, corollis imberbibus. (Petala caerulea reflexa fuscescentia admodum venosa, inde alba. Pollen album. Stigmata fimbriata.) (G.) Jacq. fl. austr. 1. t. 3.

Ad fluvium Volchow, supra pagum Tschortowo, semel visa. Ceterum in tota Ingria nusquam observata. Floret Junio, 2 Пъщушокъ, sive чистякъ. Sibiriae incolis. Косашикъ сибирскій. Sobol.

SCHOENUS. Glumae paleaceae univalves congestae.

Cor. nulla, semen unicum subrotundum inter glumas. (In Gen. dicit: glumam multifloram, bivalvem, petala sex, conniventia, persistentia imbricata, exterioribus brevioribus; germen ovato-triquetrum, stylum fetaceum, stigmate trifido.)

29. **SCHOENUS NIGRICANS** Culmo tereti nudo, capitulo ovato; involucris diphylli valvula altera subulata longa. (Stamina plerumque duo.) (G.) Scheuchz gramin. t. 7. f. 13. 15.

In paludibus circa vicum Marzinca, et in aliis locis similibus, sed parce. Floret Majo, Junio. 24 Веревочникъ чернѣющій. Russ. Sobol.

SCIRPUS. Glumae paleaceae undique imbricatae, squamis plano-inflexis. Cor nulla Semen unicum imberbe triquetrum, saepe villosum. (Spica rotunda.)

30. **SCIRPUS PALUSTRIS** Culmo tereti nudo, spica subovata terminali. (Folia basi ferruginea, spica imbricata setulis tribus aut quatuor.) (G.) Fl. dan. t. 273.

In ripis arenosis Nevae fluvii, et in paludibus copiose. Floret Majo, Junio. 24 Сипникъ, сине. комышъ. Комышъ болотный. Russ. Sobol.

31. **SCIRPUS CESPITOSUS.** Culmo striato nudo, spica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus squamula interstinctis. (Sob) Fl. dan. t. 167.

Crescit in palude nosocomii maritimi, nec non in aliis locis inundatis, cum Menyanthe trifoliata. Floret Majo, Junio. 24 Комышъ дернистый. Sobol.

32. SCIRPUS ACICULARIS. Culmo tereti nudo fetiformi, spica ovata bivalvi, feminibus nudis. (G.) Fl. dan. t. 287.

Ad ripam Nevae fluuii, circa infulam apothecariam, lapideam, et in stagnis copiose prouenit. Floret Majo. 2 Комышь булавчатый. Sob.

33. SCIRPUS LACUSTRIS. Culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus, (squamis bifidis, feminibus trigonis.) (G.) Lobel. ic. 25.

In aquis stagnantibus et ramis Nevae fluuii circa infulam lapideam, et basili ultra portum triremium frequentissimus est. Floret Majo, Junio. 2 Комышь постельный. Sob.

34. SCIRPUS SYLVATICUS. Culmo triquetro foliofo, umbella foliacea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis, (ovatis. Junco villoso similis.) (G.) Fl. dan. t. 307.

Ad rivulos et fossas sylvestres, tum circa Catharinhoffium in aquis stagnantibus, nec non in ripa rami Nevae fluvii, Carpowca vocati, in infula apothecaria. Floret Junio, Julio. 2 Комышь лѣсный. Russ. Sobol.

ERIOPHORUM. Glumae vndique imbricatae membranaceae laxae. cor. nulla. Sem. vnicum, villis spica longioribus, mollibus cinctum.

35. ERIOPHORUM VAGINATUM. Culmis vaginatis teretibus, spica scariofa, (globosa, terminali, pappo bombacino undique vestita.) (G.) Curtis Fl. Londin. t. 219.

Habitat in pratis cespitosis humidis, circa pagum Ochtam, ad monasterium Newsky, pro-

CLASS. III. TRIANDRIA MONOGYNIA. 13

pe montem Pulcova, et in aliis locis similibus parcius. Floret Majo. 2 Пушица одноголовчатая. Russ. Sobol.

36. ERIOPHORUM POLYSTACHYON. Culmistretibus, foliis planis, spicis pedunculatis, pendulis. (cernuum; pappo lanato.) (G.) Curtis Fl. Londin. t. 217.

In paludibus sylvosis insulae bafileenfis, et ubique copiosissime cum praecedente. Floret Majo. 2 In nostro spicae semper sunt quatuor, quarum tres pedunculatae, et vna sessilis. Пушица многоголовчатая. Russ. Sobol.

NARDUS. Calyx nullus. Corolla bivalvis, valvula exteriore longiore, amplexante, rachi alternatim denticulate infidens. Nectarium nullum. Semen vnicum, corolla tectum.

37. NARDUS STRICTA. Spica fetacea recta fecunda. (Folia plurima subulata cespitosa, spiculae quindecim, aut viginti, glumis exterioribus aristulaque rufis, vel violaceis.) (G.) Schreber. gram. 65. t. 7.

In pratis insulae apothecariae, bafileenfis, lapideae, et aliis locis arenosis ficcis. Floret Majo. 2 Бълоусъ vel Щетинница сожменная. Russ. Sobol.

D I G Y N I A.

PHALARIS. Calix duplex, uterque bivalvis, exteriore valvula carinata, corollam includente, interi-

ore lanceolata pubescente. Nectarium diphyllum.
Sem. unicum corollae adnatum.

38. PHALARIS ARUNDINACEA. Panicula oblonga ventricosa ampla. (G.) Leers. fl. herb. t. 7. f. 3.

In locis humidis, Murinae, et ad viam Peterhoffianam, aliisque similibus. Floret Junio, Julio.

☉ Канарейникъ простничный, vel Блеснецъ простничный. Russ. Sobol.

PANICUM. Calyx bivalvis, biflorus: flosculo altero hermaphrodito, altero (exteriore) neutro, five Masculo. (in gen. dicit: calyx gluma uniflora trivalvis, valvula tertia minima a tergo alterius. Corolla bivalvis.) Sem. unicum in sinu minoris calycis valvulae.

39. PANICUM VERTICILLATUM. Spica tereti; involucellis unifloris bifetis, retrorsum scabris, (culmis diffusis, racemulis quaternis. (Sob. et R. Curtis Flor. Londin. t. 260.

Ad margines agrorum in Ofinova Roschtza, et circa Petropolin rarius obseruatur. Floret Julio, et Augusto. ☉ Боровникъ, vel Боръ права, five Лросо боровое. Russ. Sobol.

PHLEUM. Calyx bivalvis, sessilis, linearis, truncatus, apice bicuspidato. Corolla inclusa, valvula exteriore amplexante interiorem. Antherae bifurcatae. Spica typhina.

40. PHLEUM PRATENSE. Spica cylindrica longissima ciliata. Culmo erecto nodis quatuor. (Spiculae superne corniculatae, praemorsa. Ad-

modum variat: foliis pilosis; culmo erecto, decumbenteve; petalo uno bifido, altero integro, antheris luteis vel purpurascensibus, etc.) (G.) Schreb. gram. 103. t. 14.

In pratis passim. Floret Junio, Julio. 2 Арженецъ луговой. Russ. Sobol.

41. PHLEUM NODOSUM. Spica cylindrica, culmo ascendente, foliis obliquis, radice bulbosa. (Spica glabra basi plerumque sterilis, glumis denticulatis acuminatis; antherae albae.) (Sob. R. et. B.) Flor. dan. t. 308.

Habitat in monte Pulkovo, et in sylva urbis Gatzinae, tum et Petropoli in pratis et hortis cultis passim. Floret Junio, Julio. 2 Арженецъ уловой. Russ. Sob.

42. PHLEUM ARENARIUM. Spica ovata ciliata, culmo ramoso. (Sob.) Pluckn. alm. t. 33. f. 8.

Habitat Petropoli in littore maris arenoso insulae basileensis, ad portum triremium, atque in aliis locis arenosis. floret Majo, Junio. ☉ Арженецъ песочный. Russ. Sobol.

ALOPECURUS. Calyx bivalvis. Corolla univalvis, marginibus basi coadunatis. Arista duplo longior geniculata. Nectarium nullum. Antherae bifurcatae.

43. ALOPECURUS PRATENSIS. Culmo spicato erecto: glumis villosis, corollis muticis. Spadix cylindrica, spiculis compressis, glumis albicantibus, lineis quinque viridibus, antheris flavis, dein ferrugineis. (Sob. R.) Schreb. gram, 133. t. 19.

Crescit ubique in pratis fertilibus. Floret Junio, Julio. 2 Лисій хвостъ луговой. Russ. Sobol.

44. ALOPECURUS GENICULATUS. culmo spicato infracto corollis muticis. (Glumis laeviusculis, antheris ochroleucis (Sob. et R.) Fl. dan. t. 564.

In pratis humidis, et in ductibus aquarum frequens est. Floret Junio, Julio. 2 Лисій хвостъ колѣнчатый. Russ. Sob.

45. ALOPECURUS AEQUALIS. Aristis gluma aequalibus (Sob.)

Habitat in locis uliginosis cum praecedente. Floret Junio, Julio. In lacubus natans est. 2 Лисій хвостъ ровный. Sobol.

MILIUM. Calyx bivalvis: valvulis ventricosis corollam brevissimam subexcedentibus, subaequalibus. Stigmata penicilliformia. Semen unicum nitens.

46. MILIUM EFFUSUM. Floribus paniculatis dispersis muticis. (Sob.) Curtis Fl. Londin. fasc. 43.

In fylis montosis et umbrosis circa Gatzinam, et ad Sarscofelium, rarius. Floret Majo, Junio. 2 Просо розсыпное. Russ. Sobol.

AGROSTIS. Calyx bivalvis, valvulis acutis corolla paulo brevioribus. Petalum exterius glabrum. Stigmata longitudinaliter hispida.

47. AGROSTIS SPICA VENTI. Petalis integris: exteriori arista recta stricta longissima, patula. panicula patula. (Panicula magna, petala saepius bifida.) Sob. Fl. danica. t. 853.

Crescit prope Murzincam, Pargelovium, Ofinova roščicza et Gatzinam ad margines fegetum, atque multis in locis graminosis siccis Petropoli. Floret Junio, Julio. ☉ Полевица вътренняя. Russ. Sobol.

48. AGROSTIS MILIACEA. Petalo exteriore arista terminali recta stricta mediocri. (Similis A. Spicae venti, sed arista flosculis longitudine tantum aequalis. Culmi e radice plures. Panicula minus ampla. Cultura etiam diversissima perstitit.) (Sob.)

Ad fegetes et sepes rusticorum prope Gatzinam degentium. Floret Julio. 2/ Полевица пшонная. Russ. Sobol.

49. AGROSTIS ARUNDINACEA. Culmo enodi, Panicula oblonga contracta: petalo exteriore basi villosa, arista e basi torta calyce longiore. (Sob.)

Habitat in locis humidis sylvestribus, praecipue Pargelovii Catharinhoffii et Murinae, ad viam quae ducit a Sarfco selo, ad Pavlovskoy, et Gatzinam. Floret Julio. 2/ Полевица тростничная. Russ. Sob.

50. AGROSTIS CALAMAGROSTIS. Panicula incrassata, petalo exteriore toto lanato apice aristato, culmo ramoso. Similis Agrosti arundinaceae, sed corolla tota valde hirsuta; arista recta non e basi, sed apice petali. Culmi ramosi. Panicula densa, viridi-argentea. (Sob.)

In iisdem et similibus locis cum praecedente.

Fl. Junio et Julio. 24 Полевица вѣтвистая.
Russ. Sobol.

51. AGROSTIS RUBRA. Paniculae parte inferiore prius florente patentissima, superiore contracta, petalo exteriori glabro: arista terminali tortili recurva. (Sob.)

Crescit in pratis verno tempore inundatis et aestate siccis, Catharinhoffii, in monte Poclonnaja, et infulis Nevae fluvii, nec non in aliis locis circa Petropolim. Floret Junio, Julio. 24 Полевица красная. Russ. Sob.

52. AGROSTIS CANINA. Calycibus elongatis, petalorum arista dorsali recurva, culmis prostratis subramosis. Panicula elongata saepius, ramulis coarctatis, purpurascens. Arista fetacea alba, flosculo duplo longiore, recta, medio notata geniculo fusco. (Sob.)

In pascuis herbofis humidis circa Petropolim. Floret Junio, Julio. 24 Полевица собачая. Russ. Sob.

53. AGROSTIS STOLONIFERA. Paniculae ramulis patentibus muticis, culmo repente foliis radicalibus brevior, folii supremi vagina ventricosa, calycibus aequalibus. (G.) Fl. dan. t. 564. Ad ripas fabulosas inundatas infulae apothecariae, et ad ductus aquarum ubique crescit copiose. Floret Julio. 24 Полевица ползучая. Russ. Sob.

54. AGROSTIS CAPILLARIS. Panicula capillari patente: Calycibus aequalibus subulatis hispidiusculis coloratis, flosculis muticis. (Panicula diffusa,

spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti) (G.) Fl. dan. t. 163.

In pratis et ad ductus aquarum frequens. Floret Iunio et Iulio 24 Полевица волосяная. Russ. Sobol.

55. AGROSTIS ALBA. Panicula laxa: calycibus muticis hispidiusculis aequalibus, culmo repente. (Rud.)

In paludosis montanis et sylvosis circa Petropolim rarius occurrit. Floret Iulio et Augusto. 24 Полевица бѣлая. Sobol.

AIRA. Calyx bivalvis, biflorus. Flosculi absque interjecto rudimento tertii. Antherae utrinque furcatae. Numerus florum variat, duo aut tres.

56. AIRA AQUATICA. Panicula patente. Floribus muticis laevibus calyce longioribus. Foliis planis. Culmi binodi, racemis paniculae capillaceis, spiculis spadiceo-viridibus. Calycibus vix flosculis brevioribus. Variat in loco sicco calycibus quinquefloris flosculis valde remotis. An Poa? (G.) Fl. dan. t. 381.

Habitat in udis insulae Basileensis et ad ripas Nevae fluvii. Floret Iunio, Iulio. 24 Молодочникъ водяной. Russ. Sobol.

57. AIRA SUBSPICATA. Foliis planis panicula spicata: flosculis medio aristatis; arista reflexa laxiore. Spica terminalis pauciflora vix paniculata, glumae violaceae virentes albescentesque; valvulis corollae subcaeruleis albidis, carinis antherisque bündis. (Sob.) Fl. dan. t. 228.

Crescit copiose in fylvis humidis montosis Gatschizinae et Duderhovii. Floret Junio, Julio. 24
Молодочникъ колосистый. Russ. Sobol.

58. AIRA CESPITOSA. Foliis planis, panicula patente: petalis basi villosis aristisque; arista recta brevi. Spiculae geminatae, petala apice denticulata, uno sessili, altero pedicellato. (G.)
El. dan. t. 240.

Crescit in pratis fertilibus ubique et inter segetes. Floret Junio, Julio. 24 молодочникъ дернистый Russ. Sob.

59. AIRA FLEXUOSA. Foliis fetaceis, culmis subnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuosis. Tota plus minusve rufescens, fuscescensve. (G.) Flor. dan. t. 157.

In fylvis et pratis humidis. Floret Junio et Julio. 24 Молодочникъ изгибистый. Russ. Sob.

60. AIRA ALPINA. Foliis subulatis, penicula densa: flosculis basi pilosis aristatis; arista brevi. (Sob.) Fl. dan. t. 961.

Habitat in montosis Pargelovii, et Ofinova rofcheza, rarius. Floret, Junio, Julio. Durationis incertae. Молодочникъ горной. Russ. Sobol.

61. AIRA CANESCENS. Foliis fetaceis, vaginis scabris: floribus paniculatis: aristis calycem non excedentibus. Folium summum spatha paniculam obvolvens. Panicula deflorata longius e vagina exit. (R.) Gaertn. de fr. et Sem. pl. cent. 1. t. 1 f. 7.

Crescit in arenosis circa urbem Sophiam, et Sarscofelo, parce. Floret Julio. 24 Молодочникъ сѣдой. Russ. Sobol.

MELICA. Calyx bivalvis, biflorus. Corpusculum pedicellatum inter flosculos. Nectarium monophyllum carnosum. Stamina basi dilatata. Corpusculum: rudimenta florum duorum trunculorum. Flores spicato paniculati.

62. **MELICA NUTANS.** Petalis imberbibus, panicula nutante simplici. Culmi quadrigoni, vaginis inferioribus purpureis; pedunculi superiores uniflori, secundi; glumae purpureae margine albo; petala exteriora viridia margine albo. (G.) Schreb. gram. 62. t. 6.

In insula Petri, tum in fylvis umbrosis ad viam a Sarscofelo ad Crasnoselo ducentem copiosissime invenitur. Floret Majo, Junio. 24 Перловникъ наклонный. Russ. Sob.

63. **MELICA CAERULEA.** Panicula coarctata; floribus cylindricis, culmo enodi. Aira caerulea. Racemi solitarii suberecti, spiculae muticae pedicello breviores, glumae triflorae aut quinqueflorae (R.) Fl. dan. t. 239.

Habitat in monte Poclonnaja ad viam fylvosam Wiburgensem, tum circa montem Duderowium, et Crasnoselium. Floret Junio. 24 Перловникъ синий Sob.

64. **MESICA ALTISSIMA.** Petalis imberbibus, panicula ramossissima, coarctata secunda. (Sob.) Gmelin. Fl. fibir. 1. t. 20.

Habitat in sylvis umbrosis humidis circa urbem Gatzuiam, et Sophiam alias nullibi adhuc observata. Floret Iunio, Iulio. 2 Перловникъ высокій. Russ. Sob.

POA. Calyx bivalvis multiflorus, spiculae ovaetae: compressae valvulis margine scariosis acutiusculis.

65. POA AQUATICA. Panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus, lanceolatis, multifloris; panicula subdiffusa maxima, petalo exteriore striato. Calyces 5-10 flori. Culmus sexpedalis. (Sob.) Fl. dan. t. 920.

Crescit in paludibus prope Catharinenhoff, ad viam Peterhoffianam, in lacu pagi Tentelevo, et in Infulae apothecariae rivulo ad infulam lapideam fluente. Floret Iunio, Iulio. 2 Мятлика, vel метелка водяная. Russ. Sob.

66. POA TRIVIALIS. Culmo erecto tereti; Panicula subdiffusa: spiculis trifloris basi pubescentibus, foliis planis: vaginis glabris; ligula brevi truncata. (Sob et Rud.) Curtis Fl. Londin. t. 90.

Crescit Petropoli circa Monasterium nobilium virginum, et in infulis Nevae fluvii, nec non ad vias sylvas Sarscoselii, et Wiburgi. Floret Iunio Iulio. 2 Мятлика vel метелка обыкновенная. Russ. Sob.

67. POA ANGUSTIFOLIA. Culmo erecto tereti. Panicula diffusa: spiculis quadrifloris pubescentibus, foliis radicalibus convolutis filiformibus; vaginis glabris; ligula brevi truncata. (Sob.) Leers Fl. herb. t. 6. f. 3.

Crescit in pratis amoenissimis et fertilissimis, ad rivulum Nevae fluvii Czornaja reczsa nominata, tum ad viam regiam Peterhoffianam, et passim in humidis depressis sabulosis. Floret Junio. 24 Мяслика vel мешелка узколистная. Russ. Sobol.

68. POA PRATENSIS. Culmo erecto tereti, panicula diffusa: spiculis subquinquefloris, foliis planis: vaginis scabris; ligula oblonga acuta. (Panicula amplissima, spiculis 2-3 floris lanugine nulla.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 841.

Crescit ubique in pratis. Floret Julio. 24 Мяслика vel мешелка луговая. Russ. Sob.

69. POA ANNUA. Culmo obliquo compresso, panicula diffusa patentissima; spiculis subquinquefloris, foliis planis: vaginis glabris; ligula brevi acuminata. Variat panicula rubra. (G.) Curtis Fl. Londin. t. 8.

Ubivis in pratis et in hortis atque ad vias. Floret tota aestate. ☉ Мяслика vel мешелка годовая. Russ. Sob.

70. POA PALUSTRIS. Panicula diffusa; spiculis subtrifloris pubescentibus, foliis subtus scabris. Calycibus aristatis, floribus villosis. (Sob. dein Rud.) Flor. dan. t. 750.

Habitat Petropoli, in regione Wiburgensi prope ecclesiam sti. Samsonii, circa cimiterium sti Iohannis et in multis aliis locis paludosis. Floret Julio. 24 Мешелка болотная. Russ. Sob.

71. POA COMPRESSA. Panicula coarctata secunda, culmo obliquo compresso. (Spiculae lanceolatae, triflorae aut octoflorae, antheris fulvis.) (R. Sob.) Fl. dan. t. 742.

In pratis siccis ex adverso insulae apothecariae ad ripam Nevae fluvii, et passim. Мешелка плоская. Russ. Sob.

72. POA NEMORALIS. Panicula attenuata florente patula: spiculis subbifloris mucronatis, scabris, culmo debili incurvo. (Sob.) Flor. dan. t. 749.

Habitat in pratis sylvosis fertilissimis insulae lapideae, et ad ripas Nevae fluvii in parte septentrionali, nec non in aliis locis similibus. Floret Julio. 2 Мяшлика, vel мешелка лѣсная. Russ. Sobol.

73. POA BULBOSA. Panicula secunda patentiuscula: spiculis quadrifloris. (Culmi foliaque radicalia basi bulbosa. Vivipara.) (Sob.) Vailant. Paris. t. 17. Krocker flor. silus. 1. tab. 25. Crescit in insulis, apothecaria, et lapidea, et passim in pratis apricis satis copiose. Glumae inaequales: aliae latae planae, aliae contractae longiores. Floret Majo, Junio. 2 Мяшлика vel мешелка луковчатая. Russ. Sobol.

BRIZA. Calyx bivalvis, multiflorus: spicula distichsa: Valvulis cordatis obtusis; interiore minore subrotunda.

74. BRIZA MEDIA. Spiculis ovatis: calyce flosculis brevioribus racemuli binati undulati, antheris fusco-rubris. (G.) Fl. dan. t. 258.

In pratis subhumidis sylvosis aestate ficcioribus, circa pagum Ostrowki, in monte Poclonnaja, Pargelovii, et Crasnoselii, satis copiose. Floret Junio. 2 Трясучка средняя. Russ. Sobol.

DACTYLIS. Calyx bivalvis multiflorus, valvis compresis, altero latere latioribus convexis semiovatis carinatis, altero angustis, valvula interiore majore. Corolla bivalvis, semen includens. Nectaria duo, basi gibba.

75. **DACTYLIS GLOMERATA.** Panicula secunda glomerata. (folia caulina plerumque trinervia, aut sexnervia, spiculae, triflorae aut quadriflorae, asperae, petala bifida; arista terminali. Antherae flavo-rubellae. (G.) Fl. dan. t. 743. In pratis, cultis, et ad margines viarum passim. Floret Majo; Junio. 2 Ежа сборная. Russ. Sobol.

CYNOSURUS. Calyx bivalvis multiflorus, aequalis. Corolla bivalvis, valvula altera concava longiore. Nectarium diphyllum. Receptaculum proprium unilaterale, foliaceum.

76. **CYNOSURUS CAERULEUS.** Bracteis integris, spicis subovatis, oblongis; corollis mucronatis. (Culmi caespitosi compressi enodes, spica densa caerulea, basi involucro diphylo aut triphylo, bracteis nigro violaceis; ex biglumis, gluma exteriori tricuspidata, violacea) (G.) Arduin. spec. 2. t. 6. f. 3. 4. 5.

Habitat in pratis uliginosis, et montosis Strelinae, sub juniperis frequens, sed in aliis locis raro

observatur. Floret Majo, Junio. 2 Собачій хвостъ, vel гребенникъ синій. Russ. Sobol.

FESTUCA. Calyx bivalvis, multiflorus. Spicula oblonga teretiuscula: glumis acuminatis.

77. **FESTUCA OVINA.** Panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. (Calyces flosculo breviores, petala bifida. Admodum variat; calycibus, tri-sex, aut septem floris, petalis interdum muticis; arista plus minus longa, glumis plus minusve coloratis; spiculis interdum viviparis et c.) (G.) Stillingfl. misc. t. 8.

In pratis montosis et ericetis pasfim. Floret Majo, Junio. 2 Занозка овечья. Sobol.

78. **FESTUCA ELATIOR.** Panicula secunda erecta: spiculis subaristatis, exterioribus teretibus. (Culmi sex aut quinquenodes, folia horizontaliter patentia, spiculae quinqueflorae aut novemflorae, glumis petalisque viridibus margine albo.) (G.) Schreb. gram. 34. t. 2.

In pratis fertilibus declivioribus insulae lapideae et alibi frequens est. Floret Majo, Junio. 2 Занозка высокая. Russ. Sobol.

79. **FESTUCA FLUITANS.** Panicula ramosa erecta: spiculis subsesilibus teretibus muticis. (Radiculi verticillati ad nodulos; glumae viridescentes, margine albo, decemflorae, antherae rubentes.) (G.) Fl. dan. t. 237.

In ductibus aquarum, et paludibus frequens. Floret tota aestate. 2 Занозка пловучая. Sob. vel манная трава. Russ.

BROMUS. Calyx bivalvis multiflorus. Spicula oblonga teres disticha; arista infra apicem valvulae majoris.

80. **BROMUS SECALINUS.** Panicula patente: spiculis ovatis, compressis; glumis nudis distinctis; aristis subulatis brevioribus subflexuosis. (Vaginae foliorum villosae, nodis fascia atrorubris, spiculis teretibus lanceolatis, petalo interno truncato ciliato.) (G.) Leers fl. herb. t. 11. f. 2.

Habitat in agris Pargelovii, Ofinovae Roschzae, et Ligovi, alii-que. Floret Junio, Julio. ☉ Овсецъ five космеръ, космеръ аржаный. Russ. Sob.

81. **BROMUS MOLLIS.** Panicula erectiuscula: spiculis ovatis pubescentibus, aristis rectis, foliis mollissime villosis. (Pilosulus; spiculae sexflorae aut decemflorae, glumae virides margine albo, antheris flavis. (Sob.) Schreb. gram. 60. t. 6.

Habitat ad sepes horti Nosocomialis petropolitani, et in arvis Pargelovii, aliisque. Floret Majo, Junio. ♂ Космеръ мяккй. Russ. Sobol.

82. **BROMUS SQUARROSUS.** Panicula nutante: spiculis ovatis; aristis divaricatis. (In spicula matura aristae divergunt.) (Sob.) Scheuchz. gram. t. 5. f. 11.

Crescit Pargelovii, Murinae, Ligovii, et Crasnoselii, ad vias agrorum satis copiose. ♀ Космеръ чешуйчатый. Russ. Sob.

83. **BROMUS ARVENSIS.** Panicula nutante, spiculis ovato-oblongis; glumae ventricosae, amplae. (Sob.) Fl. dan. t. 293.

In arvis prope Sarfcoje felo, ad montem Pulcovum, et circa Crafnoy cabac. Floret Junio, Julio.
 ♂ Косперъ полевой. Russ. Sobol.

84. **BROMUS TECTORUM.** Panicula nutante: spiculis linearibus, pedunculis pilosis. (R.) Leers fl. herb. t. 10. f. 2.

Habitat in montosis Pargelovii, Murzincae et Ribaczia, rarius. Floret Junio, Julio. ♂ Косперъ кровельный. Russ. Sobol.

85. **BROMUS GIGANTEUS.** Panicula nutante: spiculis quadrifloris; aristis brevioribus. (Folia longa lataque plana, racemi binati; aristae quatuor aut quinque crispatae albidae. Varietas glabra minor, villosa major. Spiculae saepius triflorae. Aristae capillares.) (Sob.) Schreb. gram. t. 11.

Habitat in monte umbroso Pulcovo, et in sylvis prope urbem Gatzinam atque in monte Dudero-vo. Floret Julio, Augusto. ♀ Косперъ великанский. Russ. Sob.

AVENA. Caryx bivalvis multiflorus: corolla oblonga, arista dorsali contorta geniculata.

86. **AVENA ELATIOR.** Paniculata, calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito submutico, masculo aristato. (R. Sob.) Fl. dan. t. 165. (Planta

polygama, ad Holcos a nonnullis recentioribus relata.)

Ad margines fylvarum ab agris remotarum prope Crafnoy cabac et Ligovo, occurrit rarius. Floret Julio. 24 Овесъ высокій. Russ. Sobol.

87. AVENA FATUA. Paniculata, calycibus trifloris: flosculis omnibus aristatis basi que pilosis. (Folia quinquenervia, glumae internae costis octo aut novem; arista longissima, antheris flavescens. (G.) Schreb. gram. t. 15.

Habitat inter segetes. Floret Junio, Julio. ☉ Овесъ дикій. Russ. five овесъ припороный. Sob.

AVENA PUBESCENS. Subspicata, calycibus subtrifloris basi pilosis, foiiis planis pubescentibus. (R. Sob.) Leers fl. herb. t. 9. f. 2.

In pratis humidis infulae lapideae, et circa montem Duderovium. Floret Junio. 24 Овесъ мохнашый. Russ. Sob.

89. AVENA PRATENSIS. Subspicata, calycibus quinquefloris. (Spiculis subsessilibus, flosculis basi minus pilosis (G.) Leers fl. herb. t. 9. f. 1. Prope viam Schliffelburgensem ad officinas lateritias in pratis argillaceis, et infula lapidea, nec non ad viam Wiburgensem. Floret Junio, 24 Овесъ луговой. Russ. Sob.

ARUNDO. Calyx bivalvis, multiflorus. Flosculi lana cincti, congesti, Semen 1. papposum.

90. ARUMDO PHRAGMITES. Calycibus quinquefloris, panicula laxa. (G.) Leers fl. herb. t. 7. f. 1.

In lacubus et fluviis ad ripas passim. Floret Julio, Augusto. 2/ Тростникъ простой. Russ. Sobol.

91. ARUNDO EPIGEJOS. Calycibus unifloris, panicula erecta, foliis subtus glabris, attenuatis subconvolutis. Floresculis confertis. Panicula spadiceo-viridi. (Sob.)

Habitat in locis elevatis arenosis et sylvosis passim. Floret Julio. 2/ Тростникъ земный. Russ. Sobol.

92. ARUNDO CALAMAGROSTIS. Calycibus unifloris, laevibus, corollis lanuginosis, culmo ramofo. (G.) Fl. dan. t. 280.

Ad ripas Nevae fluvii frequens est. Floret Julio. 2/ Тростникъ береговой. Russ. Sobol.

93. ARUNDO ARENARIA. Calycibus unifloris, foliis involutis mucronato pungentibus. (G.) Mart. Flor. rustic. t. 31. filiformis.

Habitat in ripa arenosa insulae Petri, et in insula basileensi prope portum triremium. Floret Julio. 2/ Тростникъ песочный.

LOLIUM. Calyx monophyllus, fixus, multiflorus; spiculae alternae.

94. LOLIUM PERENNE. Spica mutica: spiculis compressis multifloris. (Spica plerumque sexflora,

flore calyce longiore.) (G.) Fl. dan. t. 747.

Habitat in apricis et elevatis locis Murinae, Pargelovii et circa Sarfcoje felo, et Crafnoje felo. Floret Junio, Julio. 2 Плевель много-
лѣпный. Russ. Sobol.

95. **LOLIUM TEMULENTUM.** Spica aristata, spiculis compressis multifloris, radice annua. (Culmi erecti scabri, nodis tribus aut quatuor; folia apice marcido fufcescente, graminea lata; rachis subtortilis; spiculae quatuor aut novemflorae; semen fuscum latere altero gibbo.) (G.) Fl. dan. t. 160.

Habitat in agris inter hordeum et linum prope Sarfcofelo, et Crafnoje felo, atque Pargelovii. Floret Junio. ☉ Плевель пьяный. Russ. Sobol.

ELYMUS. Calyx lateralis, bivalvis aggregatus, multiflorus.

96. **ELYMUS ARENARIUS.** Spica erecta arcta: calycibus tomentosis flosculo longioribus. Foliis mucronato pungentibus, glaucis. (G.) Schreb. gram. t. 40.

Habitat in locis arenosis. Maxima in copia occurrit in ripa maritima Strelinae, Oranienbaumii, et in superiori regione Nevae fluvii supra cataractam. Floret Junio. 2 Волоснецъ песочный. Russ. Sobol.

97. **ELYMUS SIBIRICUS.** Spica pendula arcta, spiculis binatis calyce longioribus. (Sob.) Schreb. gram. t. 21. f. 1.

Habitat in quantitate in sylva umbrosa humidaque montis Pulcovi. Floret Julio. 2 Волоснецъ сибирскій. Russ. Sob.

98. **ELYMUS CANINUS.** Spica nutante arcta: spiculis rectis involucre destitutis: infimis geminis. (Involucre multifeta, spicae sex aut septemflorae, petala aristata, gluma longiora.) (G.) Leers fl. herb. t. 12. f. 4.

Habitat in sylvis montanis circa Duderovo, et in monte Pulcovo. Floret Junio, Julio, 2 Волоснецъ собачій. Russ. Sobol.

TRITICUM. Calyx bivalvis, subtriflorus, solitarius. Flos obtusiusculus subaristatus, acutus.

99. **TRITICUM REPENS** Calycibus quadrifloris subulatis acuminatis., foliis planis. Flosculi submutici, receptaculo glabro. Admodum variat spiculis trifloris aut octofloris: subquadrifloris; breviter aristatis, aut inermibus. Colore glauco. (G.) Flor. dan. t. 748. Gramen officinarum.

Ubique in hortis oleraceis, et ad vias frequens est. Floret Junio, Julio. 2 Пырей, Russ. пшеница ползучая. Sobol.

TRIANDRA TRIGYNIA.

MONTIA. Calyx diphyllus. Corolla monopetala, irregularis. Capsula unilocularis, bivalvis. Calyx saepe foliolis tribus. Stamina tria vel quinque.

100. **MONTIA FONTANA.** Foliis oblongo-ovatis subcarnosis, pedunculis unifloris, fructiferis deflexis. (G.) Fl. dan. t. 131.

In aquis stagnantibus circa fabricam pyriam ochtensem et ad rivulos, frequens est. Floret Majo, Junio. ○ Мокричникъ ручейный. Russ. Sob.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

GLOBULARIA. Calyx communis, imbricatus, proprius tubulatus, quadridentatus aut quinquedentatus, inferus. Corollulae labio superiore bipartito. Receptaculum paleaceum. Semen unicum superum nudum.

101. **GLOBULARIA VULGARIS.** Caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis: caulinis lanceolatis (Foliis imbricatis lanceolatis.) (G.) Gaertn. de fr. et fem. 3. t. 44. f. 11.

In pratis ficcis et arvis ad fluvium Lugam. Floret Majo, Junio. 24 Клубочникъ обыкновенный. Russ. Sobol.

SCABIOSA Calyx communis polyphyllus; proprius duplex superus. Receptaculum paleaceum vel nudum, duplicatum, lignosum, semen involvens.

102. **SCABIOSA SUCCISA.** Corollulis aequalibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. (Receptaculum paleaceum, aristulae quatuor nigricantes.) (G.) Fl. dan. t. 279.

Crescit in pratis humidis sylvosis argilloisque, ad montem Poclonnaja, circa fluvium Ochta ad fabricam pyriam; nullibi tamen majori in co-

pia, quam inter Strelinam et pagum Rjumca. Floret Julio, Augusto. 2 Отдышная шрава, Russ. свербѣжница подкушенная. Sob.

103. SCABIOSA ARVENSIS. Corollis radiantibus, foliis superioribus pinnatifidis, incisis, caule hispido. (Calyces decem-aristati, receptacula pilosa. Variat foliis pinnatis, seu bipinnatis, integris; floribus plus minusve purpurascensibus, caeruleiscentibusve, vel albis. G.) Fl. dan. t. 447.

In arvis et pratis elevatis ficcis ubique frequens est, praecipue in monte Poclonnaja, et Pulcova. Floret Junio, Julio. 2 Свербѣжница полевая. Russ. Sob.

104. SCABIOSA SYLVATICA. Corollulis quadrifidis radiantibus, foliis omnibus indivisis ovato-oblongis ferratis, caule hispido. Caules superne plerumque dichotomi; folia conjugata ampla, utrinque villosa, venosa, acumine longo terminato; pedunculi longissimi; flores purpurascens; antherae caeruleae; receptaculum villosum. Variat flore albo, simillima arvensi. (B. Sob.) Jacq. fl. austr. 4. t. 362.

Habitat in sylvis, et campis circa Oranienbaum, et Ošnova Koschca, sed parce. Floret Julio. 2 Свербежница лѣсная. Russ. Sobol.

ASPERULA. Corolla infundibuliformis, limbo tripartito aut quadripartito. Semina duo, globosa, suberosa, tecta.

105. ASPERULA LAEVIGATA. Foliis quaternis ellipticis enervibus laeviusculis, pedunculis di-

varicatis trichotomis, feminibus scabris. (Cum β Galio rotundifolio. Foliis ovatis quaternis, obtusis aculeato-ciliatis, feminibus hispida. Caulis procumbentes ramosissimi; folia trinervia, aspera, ciliata; flores paniculati, racemulis dichotomis, pedunculis capillaribus, albi.) (Sob.)
 Воскон. mus. t. II. f. 5. Iacq. fl. austr. I. t. 94. Galium rotundifolium. Gort.

Habitat in sylvis ficcioribus Pargelovii, et in monte Pulcovo, et passim in locis elevatis umbrosis. Floret Julio, et Augusto. 24 Шерошница гладколистая. Russ. Sob.

GALIUM. Corolla monopetala campaniculato-rotata, brevis quadripartita aut tripartita. Semina duo globosa, infera, suberosa, integumento tecta. (Floribus omnibus hermaphroditis, Galium est; floribus nonnullis masculis, Vaillantia.)

106. **GALIUM PALUSTRE.** Foliis quaternis obovatis inaequalibus, caulibus diffusis, (Caulis flaccidus, diffusus. Folia quatuor aut quinque subreflexa. Antherae nigrescunt.) (G.) Fl. dan. t. 428.

In sylvis humidis et paludibus. Floret Junio, Julio. 24 Подмаренникъ болотный. Russ. Sobol.

107. **GALIUM TRIFIDUM.** Foliis quaternis linearibus, caule procumbente scabro, corollis trifidis. Fl. dan. t. 48. (Stam. 3.)

In descriptione Gubernii Petropolitani celeb. Ge-

orgi dicitur crescere circa Petropolim, afferente clar. Rudolpho, quod hucusque verificare non contigit; adeoque dubito an hic datur, nam ceterum est planta canadensis secundum Lin. Spec. plant. 158. Подмаренникъ пройчатый. Russ. Sobol.

108. **GALIUM ULIGINOSUM.** Foliis fenis lanceolatis retrorsum ferrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. (Caulis erectus rigidus. Folia sex aut septem linearia, scabra.) (G.) Schrad. Spicil. fl. german. p. 17. t. 1. f. 1. Barrel. pl. rar. ic. 82.

Crescit ad rivulos prope viam a Sarcofelo ad Crasnoselium ducentem, et margines sylvarum, et in viciniis urbis Jamburgi Floret Junio, Julio.
24 Подмаренникъ ручейный. Russ. Sobol.

109. **GALIUM SPURIUM** Foliis fenis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis simplicibus, fructibus recurvatis. (Caulis crassiusculus pallidus flaccidus. Folia sex aut novem Fructus majusculi scabri reflexi.) (B. S.) Vailant. fl. paris. t. 4. f. 3. Affine Gal. Aparines, sed minus.

Inter segetes circa montem Duderovium et urbem Iamburgum. Floret Julio. ☉ Подмаренникъ пашенный. Russ. Sobol.

110. **GALIUM VERUM.** Foliis octonis linearibus fulcatis, ramis floriferis brevibus, (floribus parvis flavis.) Antherae odoratae fiunt fuscae. Folia nitida, margine revoluta, quoad diversum

in caule fitum numero variant. (G.) Blackw. herb. t. 435. Regn. bot. t. 23.

In patis elevatis Pargelovii, Ofinovae Roschczae, Crasnofelii, et ad fluvium Lugan, passim. Floret Junio, Julio. 2 Млекосбѣдъ five подмаренникъ настоящій. Russ. Sob.

111. GALIUM MOLLUGO. Foliis octonis ovato-linearibus subferratis patentissimis mucronatis, caule flaccido: ramis patentibus. (Folia obverse ovata, emarginata, apice rotundata, spinoso denticulata: caulis ramosissimus.) (G.) Fl. dan. t. 455.

Crescit in insula lapidea, et rotunda, tum in monte Poclonnaja et passim in montosis sylvaticis. Floret Junio, Julio. 2 Подмаренникъ мягкій. Russ. Sob.

112. GALIUM GLAUCUM. Foliis verticillatis linearibus, pedunculis dichotomis, caule laevi. (Caules flexuosi, supra nodos incrassati, trichotomi, ramis ultimis flores tres aut quinque albos umbellatim gerentibus. Folia verticillata, sex aut octo superne, ad ramos, duo, facie glaberrima. (G.) Jacq. flor. austr. 1. t. 81.

Habitat in pratis elevatis ficcioribus, apricis ad montem Pulcovum et in similibus locis inter Polytricha. Floret Julio. 2 Подмаренникъ сизый Russ. Sobol.

113 GALIUM BOREALE. Foliis quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule erecto, feminibus hif-

pidis. (Folia subtus scabra. Paniculae rami diphylli, floribus albis. Tota planta subaspera est.) (G.) Sowerb. engl. bot. t. 105.

In pratis ficcis infulae rotundae in monte Poulonnaja, Pargelovij, atq. in monte Pulcovo, passim. Floret Junio, Julio. 2 Подмаренникъ северный. Russ. Sob.

114. GALIUM APARINE. Foliis octonis lanceolatis: carinis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis. (Floribus paniculatis, fructibus hispidis.) (G.) Fl. dan. t. 495.

Ad fluvium Lugam circa pagum Howskaja, circa pagum Ribaczia, et passim in hortis Strelinae et Petropoli. Floret Junio. ☉ Подмаренникъ шероховатый, vel царанница. Russ. Sob.

PLANTAGO. Calyx quadrifidus. Corolla quadrifida: limbo reflexo. Stamina longissima. Capsula bilocularis, circumscissa, supera.

115. PLANTAGO MAJOR. Foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. (Folia septemnervia; flores rubelli, lana ferruginea; capsula trilocularis; trisperma.) (G.) Flor. dan. t. 461.

Ad viat passim, unde Russice Попушникъ dicitur. Floret tota aestate. 2 подорожникъ vel попушникъ большой. Sob.

116. *PLANTAGO MEDIA*. Foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. (Capsula monosperma. β Varietas hirsuta, minor.) (G.) Flor. dan. t. 581.

In fylva infulae apothecariae, tum in aliis pratis fylvosis, argillofis, uti in monte Pulcovo, et ad Sarscotelium, sed parce. Floret Majo, Junio. 24 Попутникъ vel подорожникъ средній. Russ. Sob.

117. *PLANTAGO LANCEOLATA*. Foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. (Folia septemnervia, antherae albae.) (G.) Fl. dan. t. 437.

Ubique in pratis, et ad ductus aquarum et vias copiose provenit, Floret Junio, Julio. 24 Попутникъ vel подорожникъ узколистый. Russ. Sobol.

118. *PLANTAGO MARITIMA*. Foliis semicylindricis integerrimis basi lanatis, scapo tereti. (Folia canaliculata.) (G.) Fl. dan. t. 243.

Habitat ad ripam sabulosam maritimam finus Cronstadiensis 17, veritas ab urbe, et prope Peterhoffium atque Oranienbaum. Floret Junio, Julio. 24 Попутникъ vel подорожникъ приморскій. Russ. Sob.

CENTUNCULUS. Calyx quadrifidus. Corolla quadrifida rotata patens. Stamina brevia. Capsula unilocularis circumscissa.

119. CENTUNCULUS MINIMUS. (Foliis alternis ovatis. Corolla brevissima albida.) (P.) Fl. dan. t. 177.

In locis verno tempore inundatis, arenosis aestate ficcis, in parte Wiborgenſi et Catharinhofii. Floret Julio. ☉ Сошенникъ малѣйшій. Russ. Sobol.

CORNUS. Involucrum tetraphyllum saepius, five nullum. Calyx quadridentatus, deciduus. Petala supera quatuor. Drupa succulenta, infera bilocularis: officula folitaria.

120. CORNUS SUECICA. Herbacea, ramis binis. (G.) Fl. dan. t. 6.

Habitat in sylva circa ostium Lugae fluvii. Floret Julio. 2 Деревъ травчатый. Russ. Sobol.

ALCHEMILLA. Calyx octofidus. Corolla nulla. Stylus ad basim germinis. Semen unicum, vel duo calyce vestita.

121. ALCHEMILLA VULGARIS. Foliis lobatis, (lobis dentatis. Stigma rotundum, splendens.) (G.) Fl. dan. t. 693.

Ubivis in pratis et sylvis cultis copiosissime. Variat. ³ minor. in pratis et pascuis ficcioribus montosis. Floret Junio, Julio. 2 Лъвиная лапа, vel росникъ обыкновенный. Russ. Sobol.

TETRANDRIA DIGYNIA.

CUSCUTA. Calyx quadrifidus aut quinquefidus. Corolla monopetala quadrifida, ovata. Capsula bilocularis, circumscissa. Semina Gemina.

122. **CUSCUTA EUROPAEA.** Floribus sessilibus quadrifidis, (congestis, caule tetragono.) (G.) Fl. dan. t. 199. Planta parasitica.

Habitat in sylvis umbrosis, circa viam Strelinae, et Catharinhofii, Lupulum, Urticam aliasque plantas obvolvens. Floret Julio. ☉ Повилица, five крапивная малина. Russ. повилица европейская. Sobol.

TETRANDRIA TETRAGYNIA.

POTAMOGETON. Calyx nullus. Petala quatuor. Stylus nullus stigmata obtusa. (Drupae quatuor uniloculares Semina quatuor uncinato-acuminata gibba.

123: **POTAMOGETON NATANS.** Foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. (G.) Mill. illustr. icon.

In stagnis Catharinhofii, insulae lapideae et ramis minoribus fluvii Nevae. nec non in paludibus. Floret Junio. 24

P. β Varietas; foliis lanceolato oblongis petiolis longioribus. (Sob.) Invenitur in lacu prope

montem Duderovium, et in initio canalis Ligo-
vii. Floret Junio. 24 Рдесѣъ, vel жалга пло-
вущая. Russ.

124. POTAMOGETON PERFOLIATUM. Foliis
cordatis amplexicaulibus. (G.) Flor. dan. t. 196.

Ubivis in locis vadofis Nevae fluvii et finis
Cronstadiensis. Floret Junio. 24 Рдесѣъ vel
жалга сквозьлистная. Russ. Sob.

125. POTAMOGETON LUCENS. Foliis longiffi-
me lanceolatis sessilibus, superioribus oppositis.
(Folia pellucida venosa.) (G.) Flor. dan. t. 195.

Habitat in ramis fluvii Nevae, praecipue in ra-
mis ejus leni et fluentibus. Floret Junio, Julio.
24 Рдесѣъ, vel жалга блестящая. Russ. Sob.

126. POTAMOGETON CRISPUM. Foliis lanceo-
latis alternis oppositisve undulatis serratis. (Cau-
lis compressus dichotomus.) (G.) Fl. dan. t. 927.

Crescit cum Potamogetone perfoliato in ramis
Nevae fluvii. Floret Junio. 24 Рдесѣъ, vel
жалга кудрявая. Russ. Sobol.

127. POTAMOGETON GRAMINEUM. Foliis li-
neari-lanceolatis alternis sessilibus stipula latioribus.
(G.) Flor. dan. t. 222.

In fluvio Luga ad pagum Howskaja, et in rivulo
prope Goreloy cabac fluente. Floret Junio, Julio.
☉ Рдесѣъ, vel жалга узколистая. Russ.
Sobol.

128. PETAMOGETON PUSILLUM. Foliis linearibus oppositis alternisque distinctis basi patentibus, caule tereti. (G.) Vaill. fl. paris. t. 32. f. 4.

Habitat in paludibus prope officinas lateritias, et in fluviis Ochta, atque Lupa ad fabricam pyriam Ochtemsem profluentibus. Floret Majo, Iunio. ☉ Рдесць, vel жалга маленькая. Russ. Sobol.

SAGINA. Calyx tetraphyllus. Petala quatuor. Capsula unilocularis, quadrivalvis, polysperma. Variat petalis nullis.

129. SAGINA PROCUMBENS. Ramis procumbentibus. (Petala calyce multo minore, fugacissima. Capsula saepius quinquevalvis, tum styli quinque, semper quadrilocularis.) (G.) Curtis fl. Londin. t. 158.

In pratis montosis et fylvis. Pargelovii, Ofinovae roschczae et ad segetes Ligovi, et Crafnoselii copiose crescit. Floret Iunio, Iulio. ♀ Жируха лежащая. Russ. Sobol.

130. SAGINA ERECTA. Caule erecto subunifloro. (Foliis lineari-lanceolatis. Calyx clausus, foliolis lanceolatis acuminatis. Capsula ovata unilocularis, univalvis, ore plerumque decemdentato.) (Sob. B.) Flor. dan. t. 845.

Habitat ad ripam lacus Pargelovii, ad rivulos Dranici, tum circa urbem Iamburgum, et multis

44 CL. IV. TETRANDRIA TETRAGYNIA.

aliis locis humidis declivibus. Floret Iunio. ☉
Жируха стоячая. Russ. Sobol.

C L A S S I S V.

P E N T A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

MYOSOTIS. Corolla hypocrateriformis, quinquefida, emarginata: fauce clausa squamulis fornicatis. Nuces quatuor imperforatae.

131. MYOSOTIS PALUSTRIS. Seminibus laevibus. calycibus obovalibus obtusis glabris, corollae tubum aequantibus, foliis lanceolatis, (subtus glabris, subligulatis, calycibus patulis.) (Sob.) Knorr. del. hort. 1. tab. 1.

Habitat in insula apothecaria ad ripas Nevae fluvii et passim ad ductus aquarum. Floret Majo, Iunio. 2/ Мышье ушко. Russ. болошное. ♀ Sobol.

132. MYOSOTIS ARVENSIS. Seminibus laevibus calycibus ovalibus auminatis hirsutissimis tubo corollae longioribus clausis, foliis ovato-lanceolatis. (Caulis tetragonus uniflorus, ramosissimus. Flores utriusque, olim Myosoti scorpioidi, carneo-caeruleove albidi, folia apice callosula.

Variat, calycibus patulis.) (G. Sob.) Fl. dan. t. 58.

Crescit ubique in agris et arvis, tum in hortis oleraceis in parte Peterburgenfi et ad sepēs hortorum. Floret Majo, Iunio. ☉ Мышье ушко полевое. Russ. Sob.

133. MYOSOTIS LAPPULA. Seminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis pilosis. (Caule elongato basi piloso, tereti paniculato scabro. Floribus subsessilibus.) (G.) Elor. dan. t. 692.

In ruderatis a parte Peterburgenfi circa portum Gagarinum, et ad sepēs hortorum parce occurrit. Sobol Floret Majo, Iunio. ☉ Мышье ушко репейчатое. Russ. Sobol.

LITHOSPERMUM. Calyx quinquepartitus. Corolla infundibuliformis, tubo longo gracili, fauce perforata nuda. Stigma bifidum. Nuces quatuor lapideae, imperforatae.

134. LITHOSPERMUM OFFICINALE. Seminibus laevibus, corollis vix calycem superantibus, foliis lanceolatis. (Flores albi, axillares, vix pedunculati, ad basin angulorum foveola.) (B. R.) Gaertn. de fr. et Sem. Cent. 5. t. 67. Lithospermum officinarum.

Habitat ad vias agrorum circa Petropolim parce. Floret Iunio. 2 Воробейникъ vel Каменное семя аптекарское. Russ.

135. LITHOSPERMUM ARVENSE. Seminibus

rugosis, corollis vix calycem superantibus. (Radix rubra, flos albus, flauicans, solitarius in racemo terminali foliofo.) (G.) Flora dan. t. 456.

Habitat inter fegetes et ad vias agrorum in Koirowa, et prope montem Duderovium. atque Pargelovii. Floret Junio. ☉ Воробейникъ полевый. Russ. Sobol.

ANCHUSA. Corolla infundibuliformis, fauce clausa squamulis fornicatis, tubo basi subprismatico. Nuces quatuor uniloculares, basi perforatae.

136. **ANCHUSA OFFICINALIS.** Foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. (Calycibus quinquepartitis.) (G.) Flor. dan. t. 572. Buglossum officinarum.

In locis ruderatis et hortis passim. Floret Iunio, Iulio. 24 Воловий языкъ. Russ. sive Воловикъ аптекарский. Sobol.

137. **ANCHUSA ANGUSTIFOLIA.** Racemis subnudis conjugatis. Calycibus quinquefidis. (B.) Morif. hist. plant. 3. t. 26. f. 4.

In arvis arenosis circa Jamburgum. Floret Majo, Iunio. 24 Воловикъ узколистный. Russ. Sobol.

138. **ANCHUSA TINCTORIA.** Tomentosa, foliis lanceolatis obtusis, staminibus corolla brevioribus. Corolla lutea. (B.) Regn. bot. t. 34. Alcanna spuria, offic.

Habitat rarius in pratis ficcis arenosis circa Jamburgum. Floret Iunio, Iulio. 24 Воловикъ красильный. Russ. Sobol.

CYNOGLOSSUM. Corolla (plurimis) infundibuliformis: fauce clausa squamis fornicatis. Semina depresso, interiore tantum latere stylo affixa. Nuces quatuor depressoae, imperforatae. Receptaculum subulatum.

139. **CYNOGLOSSUM OFFICINALE.** Staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis, tomentosis sessilibus. (Caule ramoso, capsulis echinatis.) (G.) Blackw. herb. t. 249. Cynoglossum officinar.

Habitat in monte Duderovo, et in ejus viciniis herbosis, montosis. Floret Junio, Julio. ☉ Собачий языкъ. Russ. vel собачникъ аптекарский. Sob.

PULMONARIA. Corolla infundibuliformis, fauce pervia, villis conniventibus. Calyx prismatopentagonus, aut abbreviatus. Stigma plerumque bifidum.

140. **PULMONARIA OFFICINALIS.** Foliis radicalibus ovato-cordatis scabris, (decurrentibus maculis demum albis. Folia caulina ovato-oblonga.) (G.) Fl. dan. t. 482. Pulmonaria maculosa officinarum.

Crescit in sylvis Pargelovii, Osinovae volchczae, Murzincae, et copiosissime in monte Duderovo. Floret Aprili, Majo. ☽ Медуница аптекарская. Russ. Sob.

SYMPHITUM. Corolla infundibuliformis, superne ventricosa, fauce clausa, radiis conicis fistulosis

extus sub limbo foramine hiantibus. Nuculae quatuor perforatae. Stamina, paleas inter patentes, antheris fagittatis.

141. SYMPHITUM OFFICINALE. Foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. (Caule alato, corollis rubris, five violaceis.) (G.) Fl. dan. t. 664. Consolidida mojar offic.

Ad fluvium Wolchow supra pagum Tschortovo nihil hac planta copiosius alias nusquam visa. Floret Iunio, Iulio, Augusto. ♀ Лошаково ухо, vel сальной корень. Russ. сальница аптекарская. Sob.

LYCOPSIS. Corolla infundibuliformis, tubo incurvato: fauce clausa squamis quinque. Noces quatuor perforatae.

142. LYCOPSIS ARVENSIS. Foliis lanceolatis hispida, calycibus florentibus erectis. (Folia undulata denticulata hispida, flores caerulei, calycem excedentes.) (G.) Blackw. herb. t. 234. Habitat inter segetes ad Goreloy Cabac, et Crasnojefelo, nec non in ripa arenosa Navae fluvii in insula basileensi. Floret Majo. ☉ Кривошейка полевая. Russ.

ECHIUM. Corolla irregularis, quinquesida, fauce nuda. Noces quatuor giganteae, scabrae imperforatae. (Stamina inaequalia.)

143. ECHIUM VULGARE. Caule tuberculato hispido, maculato, foliis caulinis lanceolatis hispida, floribus spicatis lateralibus, (axillaribus.) (G.) Fl. dan. t. 445.

Habitat in districtu coporiensi, ad vias et passim inter segetes Crasnofelii. Admodum variat. Floret Iunio, Iulio. ♂ Румянка обыкновенная. Russ. Sob.

ANDROSACE. Involucrum umbellulae. Corollae hypocrateriformis tubus ovatus: ore glanduloso. Capsula unilocularis, globosa, apice quinquefariam dehiscens, polysperma.

144. **ANCROSACE MAXIMA.** Perianthiis fructuum maximis. (Rosulae foliorum supra medium ferratulorum. Scapi nudi pedunculis umbellatis; folia involucri coriacea, acuminata, flores albi, limbo flavido.) (B.) Jacq. Fl. austr. V. 4. t. 33r.

Habitat in agris cultis circa urbem Narvam. Floret Aprili; Majo. ☉ Твердочашечница большая. Russ. Sobol.

145. **ANDROSACE SEPTENTRIONALIS.** Foliis lanceolatis dentatis glabris, perianthiis angulatis corolla brevioribus. (Scapi elongati, umbellae breves.) (G.) Fl. dan. t. 7.

Habitat in monte Pulcovo, et in montosis fluvii Narvae ripis. Floret Aprili, et Majo. ☉ Твердочашечница северная. Russ. Sobol.

PRIMULA. Involucrum umbellulae. Corollae tubus cylindricus: ore patulo. Stigma globosum. Capsula unilocularis, apice decedentato, dehiscens, polysperma. (Calyx tubulatus pentagonus.)

146. **PRIMULA OFFICINALIS.** (Primula officinarum). Foliis dentatis rugosis, scapis multifloris, floribus omnibus nutantibus, corollarum limbo concavo. (G.) Fl. dan. t. 433.

Habitat in sylvis umbrosis, insulae Petri, Pargelovii, Paedii Murzincae, Montis Pulcovi, et co.

piofiffima in monte Duderovo. Floret Majo. 2
 Буквица белая. Russ. vel первоцветъ апте-
 карскій. Sobol.

MENVANTHES. Corolla hirsuta, cylindrico-infun-
 buli-formis. Nectaria quinque ad basin germinis.
 Stigma bilobum. Capsula unilocularis.

147. **MENVANTHES TRIFOLIATA.** Foliis ter-
 natis, corollae laciniis margine integris, superne
 barbatis. (G.) dan. t. 541.

Crescit in insula apothecaria et ubivis in palu-
 dibus vulgatissima planta est. Floret Majo, Iunio.
 2 Трилисточникъ водяной, vel Вахта. Russ.
 вахта трилистная. Sobol. Trifolium fibri-
 num officinar.

HOTTONIA. Corolla hypocrateriformis. Stamina
 tubo corollae imposita. Stigma globosum. Cap-
 sula unilocularis.

148. **HOTTONIA PALUSTRIS.** Pedunculis verti-
 cillato-multifloris. (Scapus fistulosus, folia 5-6
 fetacea pinnata verticillata, sub aqua; calycis
 laciniis angustissimis. Corollae albae.) G.) Fl.
 dan. t. 487.

Crescit copiosissime in insulae lapideae fossis,
 et circa Petropolim in palustribus umbrosis.
 Floret Majo, Iunio. 2 Готтонка болотная.
 Russ. Sobol.

LYSIMACHIA. Corolla rotata plana. Stylus per-
 fistens, stigmatе obtuso. Capsula globosa mucro-
 nata, unilocularis, 5-10 valvis, polysperma.

149. **LYSIMACHIA VULGARIS.** Paniculata: racemis terminalibus. (Pedunculis multifloris. Stamen unum caeteris longius, basi omnia connata. Corolla glandulosa, Folia lanceolata, opposita bina terna, quaterna, patentia. Admodum variat.) (G.) Fl. dau. t. 689. *Lysimachia lutea*. officinar.

Habitat in nemoribus umbrosis et proventu herbarum fertilissimis, uti in insula lapidea, atque Catharinhofii. Floret Iunio, Iulio. 2 Вербейникъ, five Лизимахія, Russ. Вербейникъ обыкновенный. Sob.

150. **LYSIMACHIA THYRSIFLORA.** Racemis lateralibus pedunculatis. (Densissimis. Flores congesti. flavi, rubromaculati.) (G.) Flor. dan. t. 517.

Nulla palus facile invenitur ubi haec non copiose proveniat, tam circa Petropolim, quam ad fluviam Wolchow. Crescit etiam ad ripas Nevae fluvii in insula apothecaria. Floret Iunio, Iulio. 2 Вербейникъ мешелкоцветный. Russ. Sobol.

151. **LYSIMACHIA NUMMULARIA.** Pedunculis unifloris foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. (Caulis tetragonus, foliolis calycis erecti-cordatis.) (G.) Flor. dan. t. 493. *Nummularia officin.*

Habitat in sylvis humidis umbrosis; Catharinhofii. Strelinae, in insula basileenfi, ad ductum aquarum Ladogensium, et ad fluvium Wolchow. Floret Iunio, Iulio. 2 Полушечная трава five

Луговой чай. Russ. Вербейникъ полусечный.
Sob.

CONVOLVULUS. Corolla campanulata, plicata. Nectarium corona germen basi ambiens. Stigmata duo. Capsula 2-3 locularis; loculis dispermis.

152. **CONVOLVULUS SEPIUM.** Caule volubili, foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris. (Folia ore fusca; ambitus nectarium quinqueidentatus, corolla nivea, calyce arctiori, bracteato.) (G.) Fl. dan. t. 458. Bractee duae magnae.

Ad fluvium Lugam circa ostium Rossinae in ripis frequentissima planta est; alias usquam obvia. Floret Iunio, Julio. 24 Повилица seu повилычныя колокольчики. Russ. обвивальница заборная. Sobol.

POLEMONIUM. Corolla quinquepartita, rotata, fundo clauso valvis staminiferis. Filamenta basi dilatata, membranacea. Stigma trifidum. Capsula trilocularis, univalvis, supera. Semina angulata. (Planta dubia.)

153. **POLEMONIUM CAERULEUM.** Foliis pinnatis, floribus erectis, calycibus tubo corollae longioribus. (Variat floribus albis; stigmatibus bifido vel trifido.) (G.) Fl. dan. t. 255.

Habitat in sylvis, circa Strelina, et copiosissima in monte Duderovo. Floret Majo, Iunio. 24

Грецкой буддырянь. Russ. Брань синяя.
Sobol.

CAMPANULA. Corolla campanulata fundo clauso valvis staminiferis. Filamenta basi dilatata, fornicata. Stigma trifidum. Capsula infera tri, quinquelocularis, poris lateralibus dehiscens.

154. CAMPANULA UNIFLORA. Caule unifloro, calyce corollam aequante. Caulis solitarius erectus, foliis laevibus. (G.) Flor. Lappon. t. 9. f. 5. 6.

Habitat in prato amoenissimo ad fluvium Wolchow. (Folia lanceolata, levissime crenata, numero quatuor. Flos nutans.) Floret Junio, Julio.
24 Колокольчикъ одноцвѣтный. Russ. Sobol.

155. CAMPANULA ROTUNDIFOLIA. Foliis radicalibus reniformibus, caulinis 2-3 floris, late campanulatis. (Varietates: minor et linifolia quae: foliis subhirsutis: radicalibus obovatis subrotundis serratis, caulinis confertis linearibus integerrimis, dentibus calycinis fetaceis, flore nutante — a plerisque species habetur. Variat saepius spica secunda.) (G.) Curt. fl. Lond. t. 226.

In pratis sylvosis elevatis passim, sed a, multo copiosior. Floret Julio. 24 Колокольчикъ круглолистный. Russ. Sobol.

156. CAMPANULA PATULA. Foliis strictis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula patula. (Caulis angulatus, scaber: folia villosula crenata.

Segmenta calycis erecta, dentata.) (G.) Fl. dan. t. 373.

In pratis humidis ad ramum Nevae fluvii Tschornaja retschka in regione Viburgensi, et passim. Floret Junio, Julio. ♂ Колокольчикъ розсыпной. Russ. Sobol.

157. CAMPAMULA PERSICIFOLIA. Foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis. (Tota glabra, caule paucifloro nunc angulato, nunc tereti, corolla dilute caerulea, ampla, laciniis patentibus, germine hirto. Ludit scabritie, glabritie, caulibus florumque magnitudine. Folia sessilia, inferiora ligulata, ferraturae albae.) (G.) Bulliard. herb. Franc. t. 367.

Habitat in pratis ad fluvium Wolchow, et in sylva insulae apothecariae paulo supra ostium rami Carpowca dicti. Item copiose in pratis ab utraque parte viae quae Petropoli Peterhovium tendit 18, verstis ab urbe; tum in monte Pulcovo, et Duderovo. Floret Junio. ♀ Колокольчикъ персиколистный. Russ. Sobol.

158. CAMPANULA RHOMBOIDEA. Foliis rhomboidibus serratis, spica secunda, calycibus dentatis. Capsulis glabris venosis. (G.) Boccon. mus. t. 61. Variat floribus caeruleis et albis; planta tota subsperma et glabra.

Habitat in sylvis umbrosis Pargelovii, Ofinovae Roschzae, montis Pulcovi, et in monte Duderovo copiosissime, cum suis varietatibus. Floret Junio, Julio. ♀ Колокольчикъ углашолыстный. Russ. Sobol.

159. **CAMPANULA LATIFOLIA.** Foliis ovato-lanceolatis, caule simplicissimo tereti, floribus foliariis pedunculatis, fructibus cernuis. (Lom.) Flor. dan. t. 782.

Habitat ad fabricam rudicentem, in monte Pulcovo et Duderovo sed parce. Floret Julio. 24 Колокольчикъ широколистный. Russ. Sobol.

160. **CAMPANULA RAPUNCULOIDES.** Foliis cordato-lanceolatis, ferratis, caule ramofo, floribus secundis sparsis, calycibus reflexis. Variat floribus minoribus secundis. Folia sessilia. (G.) Moris. hist. pl. 2. t. 4. f. 32.

In pratis sylvosis, cultis, prope fluvium Strelina. Floret Julio. 24 Колокольчикъ рѣпчатый. Russ. Sob.

161. **CAMPANULA TRACHELIUM.** Caule angulato, foliis cordato-lanceolatis, petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. (axillaribus; calycibus hispidis. Corolla intus villosa. Variat pedunculis unifloris.) (G.) Bulliard. herb. Franc. t. 319.

Habitat in pratis montosis, Pargelovii, Strelinae et in aliis locis similibus maxima in copia. Floret Julio. 24 Колокольчикъ жесткій. Russ. Sobol.

162. **CAMPANULA GLOMERATA.** Caule angulato simplici, floribus sessilibus, capitulo terminali. (axillaribus que. Folia ovato-lanceolata ferrata cauleque pericarpio que villosa. Flores terni erecti conglomerati.) (G.) Herm. parad. bot. t. 235.

Per totum gubernium in pratis sylvaticis montosis vulgaris planta est. Floret Julio. 2/ Примочная права. Russ. Колокольчикъ сборный. Sobol.

163. CAMPANULA CERVICARIA. Hispida, floribus sessilibus, capitulo terminali, foliis lanceolato-linearibus undulatis, (hispidis: capitulis axillaribus terminalique. Caulis angulosus, elongatus. Bractee cordatae. Flores laterales ut plurimum tres, in fasciculo sessili terminali, sex aut octo in capitulo hemisphaerico.) (G.) Fl. dan. t. 787.

Habitat in pratis argillofis et arenosis circa officinas lateritias, in tractu Schliffelburgensi, prope pagum Ribaczija, et sylvis montosis Strelinae. Floret Junio, et Julio. 2/ Колокольчикъ олений. Russ. Sobol.

LONICERA. Corollâ monopetala, tubulosa, irregularis, laciniis revolutis, una profundius separata. Stigma obtuso-capitatum. Bacca polysperma, uni-trilocularis, infera.

164. LONICERA XYLOSTEUM. Pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus. (Corollae albae filamentis styloque villosis. Flores exalbidi.) (G.) Flor. dan. t. 808.

In sylvis ad Fabricam pyriam Ochtensem, circa pagum Murino, Strelina et passim. Floret Majo, Junio. 1/ Жимолость обыкновенная, sive жимолосшникъ обыкновенный. Russ. Sob.

165. LONICERA CAERULEA. Pedunculis bifloris, baccis coadunatis globosis, styli indivisis.

(Folia opposita, paribus decussantibus plerumque, gemmis subulatis rubentibus; perianthium quadridentatum fetis duabus; corollae ochrolevae basi bigibbosae, limbo sub bilabiato, baccae nigro-caeruleae maculis lateralibus fuscis. (Sob.) Jacq. flor. austr. v. 5. opp. t. 17.

Habitat in sylvis montosis, circa vicum Hostilitza in quantitate. Floret Majo, Junio. † Жимолость синяя. Russ. Sobol.

VERBASCUM. Corolla rotata, subaequalis. Stamina declinata, inaequalia, villosa. Stigma obtusum. Capsula bilocularis, bivalvis, dissepimento alato, polysperma.

166. **VERBASCUM THAPSUS.** Foliis decurrentibus utrinque tomentosus, caule simplici, stigmatе globofo. (Spica longissima densissima; bracteis floribus aequantibus.) (G.) Flor. dan. t. 361.

Habitat ad ductum aquarum Ladogenium et circa montem Duderovium in locis arenosis. Floret Julio. ♂ Царскій скипетръ, five медвѣжье уxo. Russ.

167. **VERBASCUM NIGRUM.** Foliis cordato-oblongis petiolatis. (Caule ramisque laxe denesque spicatis, foliis utrinque villosis, corollis maculis rubris, filamentis villo purpureo. Variat foliis basi lyratis. (G.) Zorn pl. med. ic. 1. t. 25.

Habitat in monte Duderovo et ejus viciniis umbrosis subhumidis, tum in ripis Nevae fluvii su-

pra cataractam frequens est. Floret Junio, Julio.
 2 Царскій скипепрб черный. Russ. Sobol.

HYOSCYAMUS. Corolla infundibuliformis, obtusa, irregularis, femiquinquefida, lacinia unica latiore. Stamina inclinata. Stigma capitatum. Capsula bilocularis, operculata, circumscissa, operculo dehiscente. Semina plurima reniformia. (Calyx ventricoso-tubulosus persistens.)

168. **HYOSCYAMUS NIGER.** Foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. (Caulis tomentosus viscidulus. Corolla livide flavescens, venis atropurpureis, extus hirtella.) (G.) Blackw. herb. t. 550.

In ruderatis et cultis Petropoli, passim occurrit, tum prope pagos Tosna, Ribaczija, copiose. Floret Junio, Julio. ♂ Белена, five Блекотá. Russ. Белена черная. Sobol.

SOLANUM. Corolla rotata. Antherae subcoalitae, apice poro gemino dehiscentes. Bacca bilocularis.

169. **SOLANUM DULCAMARA.** Caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis, (dichotomis, nutantibus, corollis violaceis, maculis duabus viridibus. Variat: caule erecto, suffruticoso; foliis ovatis.) (G.) Curtis Fl. Londin. t. 4. Dulcamara officin.

In locis humidis sylvosis et fossis, circa Strelinam, et Pargelovium, tum circa Murzincam.

Floret Majo, et Junio. † Сладка и горка. Russ.
Пасленъ сладко-горкій. Sobol.

170. SOLANUM NIGRUM. Caule inermi herba-
ceo, foliis ovatis dentato-augulatis, racemis dif-
tichis nutantibus. (Caulis asper angulatus.) (L.)
Fl. dan. t. 460. Solanum officin.

Habitat in cultis et ruderatis insulae bafileenfis
et raffim. Floret Junio, Julio. ⊙ Пасленъ. Russ.
Пасленъ черный. Sobol.

RHAMNUS. Calyx tubulosus: squamis stamina
munientibus. Corolla nulla. (Petala minima ligu-
lata.) Drupa subrotunda, subtrilocularis.

171. RHAMNUS. CATHARTICUS. Spinis termi-
nalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis,
caule erecto. (fruticoso. Flores albidis, stylo tri-
sev quadrifido, bacca rotunda, tetrasperma. Co-
rolla quadrifida tetrandra.) (G) Fl. dan t. 850.
Spina cervina. Officinar.

Habitat circa cataractas Nevae fluvii. Floret
Junio. † Придорожная иголка. Russ.

172. RHAMNUS FRANGULA. Inermis floribus
monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis.
(Calyx quadrifidus, petala bifida, stigma trifi-
dum, bacca rubra, demum nigrescens. Drupa
clausa officulis quatuor.) (G.) Fl. dan. t. 278.
Frangula officinar.

Ubique in sylvis subhumidis, uti in monte Рос-
лоннаја, et Pulcova, et in insulis apothecaria,
lapidea aliisque frequens occurrit. Floret Majo.
† Крушина. Russ.

EVONYMUS. Calyx patens. Corolla pentapetala. Stamina tuberculis conicis viridibus. Capsula succulenta, colorata, pentagona, quinquelocularis, quinquevalvis. Theca antrofa. Semina arillo baccato obvoluta.

173. EVONYMUS EUROPAEUS. Floribus plerisque quadrifidis, foliis sessilibus acutis. (Rami laeves, pedunculi compressi, stigmata subulata.) (G.) Bulliard. herb. Franc. t. 135.

Habitat in sylvis montosis circa fluvium Luga. Floret Majo, Junio. † Бересклетъ, sive Жигалокъ. Russ. Бересклетъ Европейскій. Sobol.

RIBES. Petala quinque et stamina calyci inferta. Stylus bifidus. Bacca polysperma, infera, unilocularis.

174. RIBES RUBRUM. Inerme, racemis glabris pendulis, floribus pluriusculis. (L.) Schmidt österr. allg. Baumz. II. t. 93. Ribes rubrum officin.

Habitat in sylva umbrosa ad Crasnoj cabac tum circa Murinam, atque Ochtam, et passim in sylvis vastissimis subhumidis, Floret Majo. † Смо-родина красная. Russ.

175. RIBES ALPINUM. Inerme racemis erectis, bracteis flore longioribus. (Foliis magnis lucidis dorso glabris, facie subpilosis: petala minima flavicantia, baccae glutinosae. Racami declinati. Flores saepissime dioici steriles.) (G.) Jacq. Flor. austr. v. I. t. 47.

Habitat in monte Duderovo, tum circa Gatzinam, et Sivoritzam, aliisque in locis montosis. Floret Majo, Junio. † Смородина горная. Russ. Sob.

176. RIBES NIGRUM. Inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. (Petala conniventia. Calyx reflexus.) (G.) Fl. dan. t. 556. *

Habitat in insula rotunda, in insula Bafileenfi, tum circa Murinam et Ochтам; ad Goreloy sabac, aliisque in locis sylvosis humidis, copiose. Floret Majo. † Смородина черная. Russ.

DIGYNIA.

CHENOPODIUM. Calyx quinquefidus, quinquedentatus, costatus, laciniis concavis. Corolla nulla. Semen unicum lenticulare, superum, horizontale, calyce connivente tectum. (Variat floribus mere foemineis.)

* Foliis angulosis.

177. CHENOPODIUM URBICUM. Foliis triangularibus subdentatis, racemis confertis strictissimis cauli approximatis longissimis. (G.) Buxb. fl. hal. t. 1.

Ad vias et sepes Petropoli, tum circa pagos in hortis oleraceis, Ofinovae Roschczae, et Duderovii. Floret Junio. ☉ Гусиная нога городская. Sobol.

178. CHENOPODIUM RUBRUM. Foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis

erectis compositis subfoliosis caule brevioribus.
(Racemi rubicundi. Folia finuata fissa.) (Sob. R.)
Moris. hist. plant. 2. t. 31.

In ruderatis et hortis oleraceis regionis Petro-
politanae atque circa pagos rarius occurrit. Flo-
ret Junio, Julio. ☉ Гусиная нога красная.
Russ. Sobol.

179. CHENOPODIUM ALBUM. Foliis rhomboi-
deo-triangularibus erosius posterioribus integris: sum-
mis oblongis, racemis erectis. (Diameter trans-
versalis foliorum longitudinali major.) (G.) Cur-
tis Flor. Londin. t. 92.

Ubique ad vias et fepes, in ruderatis et hortis
oleraceis. Floret Junio, Julio. ☉ Дикая лебеда.
Russ. Бѣлая гусиная нога. Sobol.

180. CHENOPODIUM VIRIDE. Foliis rhomboi-
deis dentato-sinuatis, racemis ramosis subfoliatis,
(glomeratis, calycibus argute pentagonis, foliis
praecedentibus, subtus farina tectis, longioribus.
Caulis angulis purpurascens.) (G.) Curtis fl.
Londin. t. 103.

In hortis oleraceis frequentissima planta. Floret
Junio, Julio. ☉ Зеленая гусиная нога. Sob.

181. CHENOPODIUM HYBRIDUM. Foliis cor-
datis angulato-acuminatis, racemis ramosis nu-
dis. (Odore narcotico, viroso.) (Sob.) Curtis Fl.
Londin. t. 248.

Habitat in hortis oleraceis et variis locis cultis,
sed rase. Floret Junio. ☉ Гусиная нога выро-
дочная. Russ. Sob.

182. **CHENOPODIUM GLAUCUM.** Foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis. (Sob.) Tabern. Kraeuterb. ic. p. 427.

Crescit in urbe Petropoli ad vias, sepes, ductus aquarum et ubique in hortis oleraceis. Floret Junio, et Julio. ☉ Гусиная нога сизая. Russ. Sobol.

Foliis integris.

183. **CHENOPODIUM POLYSPERMUM.** Foliis integerrimis ovatis, caule suberecto, decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus, calycibus fructus patulis. (Folia oris rubella.) (G.) Curt. Fl. Lond. t. 115.

Crescit in hortis oleraceis, et locis cultis Petropoli, et ad vicum Sarfcoje selo. Floret Junio, Julio. ☉ Гусиная нога многосъмянная. Russ. Sobol.

184. **CHENOPODIUM MARITIMUM.** Foliis subulatis femicylindricis. (L.) Flor. dan. t. 489.

Occurrit passim in arena maris littorali, quae ab aquis inundatur, a Catharinhoffio, usque ad Oranienbaumium. Floret Julio. ☉ Гусиная нога приморская. Russ. Sobol.

ULMUS. Calyx quinquefidus, interne coronatus, emarcescens. Corolla nulla. Capsula supera, unilocularis, foliaceo-compressa, alata. Semen foliatarium. Stamina quatuor aut quinque.

185. **ULMUS CAMPESTRIS.** Foliis duplicato-feratis: basi in aequalibus; floribus subsessilibus conglomeratis. (Dentes calycini duo lobulis lateralibus minores.) (G.) Flor. dan. t. 632.

Habitat in fylvis ad fluvium Lugam, Wolckow, et circa Vicum Hostilitza. Floret Majo. ♪ Илемб. Russ. илемб полевой. Sobol.

GENTIANA. Calyx monophyllus. Corolla monopetala, persistens, tubulosa inferne. Receptacula duo longitudinalia. Capsula bivalvis unilocularis. Semina parva valvis inferta. (Vel unam quintam partem excludit, vel unam tertiam addit; corolla admodum variat.)

186. **GENTIANA PNEUMONANTHE.** Corollis quinquefidis campanulatis, acutis, oppositis pedunculatis, foliis linearibus. (Connatis, interdum radicalibus lanceolatis longissimis fasciculatis. Flores axillares, antherae connatae.) (G.) Flor. dan. t. 269.

Habitat in pratis montosis humidis Ofinovae Roschczae et prope Jamburgum circa segetes. Floret Julio, et Augusto. ♪ Стародубка, sive горчавка, Russ. Стародубка воздухоцвѣтная. Sobol.

187. **GENTIANA CENTAURIUM.** Corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. (Flores corymbosi, albido-purpurei, tubo flavo, denticulis nullis. Antherae defloratae contortae.) (G.) Fl. dan. t. 617.

Habitat in montosis sylvaticis humidis Pargelovii, Crasnoselii, et passim ad fluvium Lugam. Floret Julio. ⊙ Centaurium minus officin. Стародубка меньшая, sive Золотоштысячникъ, Russ. Золотоштысячникъ аптекарскій. Sobol.

188. **GENTIANA CAMPESTRIS.** Corollis quadrididis, fauce barbatis; calycis laciniis duabus majoribus. (G.) Flor. dan. t. 367.

In patis elevatis apricis Strelinae, alibi que frequens est. Floret Junio, Julio. ☉ Шародубка полевая. Russ. Sobol.

189. GENTIANA CRUCIATA. Floribus verticillatis sessilibus, corollis quadrifidis imberbibus. (Radix saepissime cruciatim fissâ; folia ovato-lanceolata, nervosa, vaginantia: flores inodori axillares terminalesque; perianthio pallido profunde inciso, corolla extus purpureo-caerulea, denticulis bifidis.) (G.) Jacq. fl. austr. 4. t. 372.

Habitat in monte Duderovo, et ejus viciniis montosis sylvosisque. Floret Junio, Julio, et Augusto. ♀ Соколей перелѣвъ. Russ. Шародубка крестовая. Sobol.

DAUCUS. Corollae subradiatae, omnes, ut plurimum, hermaphroditae. Involucrum universale pinnatifidum, umbella fructifera connato-connivens. Semina subrotunda, fetis rigidis longitudinalibus hispida.

190. DAUCUS CAROTA. Seminibus ad angulos quatuor distantes hispidis, petiolis subtus nervosis. (Flosculus centralis atropurpureus; petala exteriora majora.) (G.) Fl. dan. t. 723.

In sylvis circa urbem Narvam frequens est. Floret Junio, Julio. ♂ Морковь. Russ.

CONIUM. Involucella dimidiata, subtriphyllo. Fructus ovatus, (subglobosus) gibbus: costis quatuor compressis ante maturitatem undulatis. (Flores flosculosi fertiles; petala cordata.)

191. **CONIUM MACULATUM.** Seminibus iner-
mibus, (striatis), Caule ramosissimo maculato
glabro. (Radix dauci sapore ingrata; caulis hali-
tu glauco, maculis sanguineis; folia multiplicato-
pinnata, costa foliosa; pinnulae atrovirentes,
duodecim aut octodecim; involucrium univ-
ersale folium unicum, partiale unicum, membra-
neo-albidum. Petala alba patentissima, linea me-
dia protuberante; fructus fufcescit. Odor muri-
nis interdum deest.) (G.) Jacq. fl. austr. 2. t.
156. Cicuta, officin.

In fylva paludosa, umbrosa, insulae apothecariae
prope fabricam pyriam, et passim in locis simi-
libus. Floret Iunio, Julio. ♂ Омерб. Russ. Омерб
пестрый. Sobol.

SELINUM. Involucrium reflexum, partiale poly-
phyllum, Petala cordata aequalia. Semen par-
vum, ovali-oblongum, alis membranaceis
quinque, lateralibus maximis.

192. **SELINUM SYLVESTRE.** Radice fufiformi
multiplici, stylis erectis, corollis explicatis. (Ra-
dix laesa lactescit; caulis basi et ad nodos san-
guineus, superne subramosus; folia multiplicato-
pinnata, pinnulis linearibus confluentibus. Invo-
lucrium univ-ersale octo aut decaphyllum. Peta-
la alba patentissima. Semina ovali-oblonga: ful-
cis tribus elevatis obtusis, approximatis, ante
maturitatem rubescentia.) (Sob. R. B.) Jacq. fl.
austr. 2. t. 152.

Crescit circa Petropolim in fylvis inundatis, pa-
ludosis. Floret Junio, Julio. ♀ Гирча лѣсная.
Russ. Sobol.

193. SELINUM PALUSTRE. Caule laevi sublaetefcente, radice simplici, foliis quadruplicatopinnatis linearibus. (Caulis solitarius fulcatus. Folia terminalia elongata. Petala involuta, styli dein divergunt.) (F.) Flor. dan. t. 257.

In paludibus Catharinhofii, aliisque frequens est. Floret Junio, Julio. 2 Гирча болошная. Russ. Sobol.

ATHAMANTA. Involucellum umbellulae aequale. Petala inflexo-emarginata, Fructus ovato-oblongus, striatus. (Flosculi fertiles.)

194. ATHAMANTA LIBANOTIS. Foliis bipinnatis planis, umbella hemisphaerica, feminibus hirsutis. (Caulis profunde fulcatus; angulis angustioribus. Umbella densissima, radiis villosis, foliis involucelli subulatis. Petala pallide Ochroleuca, styli tandem purpurei. (G.) Flor. dan. t. 754.

Habitat in monte Duderovo, et in sylvis circa urbem Narvam, atque in Oainova Roschcza. Floret Junio, Julio. 2 Порбзная шрава. Russ. Порбзб горный. Sobol.

195. ATHAMANTA CERVARIA. Foliis duplicatopinnatis; foliolis oblongis obtusis trilobis dentato-ferratis; ferraturis mucronatis, feminibus nudis. (Radix nigra capillata, succo glutinoso flavicante; caulis flexuosus ad geniculos purpurascens; folia radicalia tripinnata, caulina bipinnata, argute ferrata, dorso glauca; vaginae oliviferae. Involucrum universale foliolis decem.

Umbellae convexissimae, albae, rarius purpureae. Tota odorata.) Jacq. fl. austr. I. t. 69.

Habitat in montosis, circa urbem Jamburgum. (B.) Floret Iulio, Augusto. 2 Горѣзъ оленій. Russ. Sobol.

PAUCEDANUM. Involucra brevissima. Umbella universalis longissima, petalis luteis. Fructus ellipticus, substriatus, lenticulari-compressus. (Elores flosculosi abortivi.)

196. PEUCEDANUM OFFICINALE. Foliis quinques tripartitis filiformibus linearibus. (G.) Gaertn. de fr. et sem cent. 2. t. 21. f. 7. Peucedanum officinar.

Habitat ad margines sylvarum, inter fluvium Russiam et sistam, tum circa Sarsojeselo, et ad viam Wiburgensem ultra montem Poclonnaja. Floret Iunio, Iulio. 2 Горичникъ, five хвостовая трава. Russ. Горичникъ аптекарскій. Sob.

197. PEUCEDANUM SALAUS. Foliolis pinnatifidis: laciniis oppositis; involucro universali diphylo, stylis deflexis. (Laciniae angustolanceolatae, spinula alba mucronatae; involucrum universale aut unicum aut nullum; parziale foliis radiis aequantibus; petala flavescenti-albida, rubellave. Semina alis quatuor.) (G.) Jacq. fl. austr. I. t. 15.

Crescit copiose in pratis et sylvis humidis circa fabricam pyriam Ochtensem ad viam Wiburgensem, Peterhoffianam, et Sarsofeliensem atque.

in plurimis locis similibus. Floret Iunio, Iulio.
 2 Горичникъ луговой. Russ. Sobol.

HERACLEUM. Involucrum caducum; parziale polyphyllum. Corolla difformis: petalis inflexo-emarginatis. Semina foliaceo-compressa, glabra, margine membranaceo angustissimo cincta.

198. **HERACLEUM SPHONDYLIIUM.** Foliolis pinnatifidis laevibus, floribus uniformibus, (foliis amplissimis pinnatis: extimo palmato; florum radiis majoribus, stylis retrorsum flexis.) (G.) Blackw. herb. t. 540.

Habitat in montosis nemoribus, et ubique in hortis. Floret Iulio. ♂ Борщъ. Russ. Борщъ широкій. Sobol.

199. **HERACLEUM ANGUSTIFOLIUM.** Foliis cruciato-pinnatis: foliolis linearibus, corollis flosculosis. (Caule plerumque purpurascente; foliis ternatis, foliolo extimo quinquefido, laciniiis oblongis acuminatis, glabris, dorso pallidioribus. Umbellae radii quindecim; flores virides, antheris flavis.) (Sob. B.) Jacq. fl. austr. 2. t. 173.

Habitat in monte Pulcovo, et Duderovo, et in aliis locis montosis herbofis. Floret Iulio. ♂ Борщъ узкій. Russ. Sobol.

ANGELICA. Corolla aequalis, petalis incurvis, lanceolatis. Styli reflexi. Fructus subrotundus, angulatus, alis marginalibus duris dorso lineis tribus. (Umbella globosa.)

200. ANGELICA ARCHANGELICA. Foliis supra-decompositis, foliorum impari lobato, lobis lateralibus angustioribus. Caulis lineatus glaber. (Radii 66. Petala pallide viridia, semina angulata.) (G.) Flor. dan. t. 206. Angelica fativa officin.

In fylvis circa fluvium Nevam, et in pratis montosis circa Murzincam, copiose provenit. Floret Julio, Augusto. 2 Дягильникъ five дягиль. Russ. Дягиль аптекарский. Sobol.

201. ANGELICA SYLVESTRIS. Foliolis aequalibus, ovato-lanceolatis serratis ellipticis. (G.) Sabb. h. rom. 4. t. 85.

Habitat ubique in fylvis et pratis humidis, praecipue ad fossas et margines sylvarum. Floret Julio, Augusto. 2 Дягиль лѣсный. Russ. Sobol.

SISON. Involucra subquadriphylla. Fructus ovatus, striatus, stylis deflexis. (Umbella inaequalis depauperata.)

202. SISON INUNDATUM. Repens, foliis submersis capillaribus; emerfis pinnatis, umbellis bifidis. (Involucrum universale nullum.) (G.) Flor. dan. t. 89.

Habitat in aquis stagnantibus circa ductum aquarum Ladogenium, et in ripa parvae nevae saepe inundata, ex adverfo insulae basileensis, tum Catharinhofii, et in aliis locis similibus. Floret Julio, Augusto. ☉ Пепрушечникъ наводненный. Russ. Sob.

PELLANDRIUM. Involucella heptaphylla, longitudine umbellae. Flosculi disci minores. Fructus ovatus, laevis, calyce et pistillo coronatus.

203. **PELLANDRIUM AQUATICUM.** Foliorum ramificationibus divaricatis, (caule dichotomo.) (G.) Blackw. herb t. 570.

In ramis Nevae fluvii minoribus, circa insulas, lapideam, crucis et apothecariam copiose provenit. Floret Julio. ♂ Конский укроб. Russ. Sobol.

CICUTA. Umbella universalis et partialis subrotunda, involucellis polyphyllis, fetaceis. Flores flosculofi, fertiles, subaequales, petalis planiusculis. Fructus subovatus costatus.

204. **CICUTA VIROSA.** Umbellis oppsitifoliis, petiolis marginatis obtusis. (Involucrum partiale polyphyllum, laciniae pedunculos longitudine adaequant.) (G.) Flor. dan. t. 208. Cicuta aquatica, officin.

In aquis praecipue stagnantibus insulae lapideae, ad ductus aquarum Catharinhoffii, et ad viam regiam Peterhoffianam frequens est. Floret Junio, Julio. ♀ Бшеница водяная. Russ. Sobol.

AETHUSA. Involucella dimidiata, triphylla, deflexa. Fructus subglobosus, profunde sulcatus, (fere octogonus.)

205. **AETHUSA CYNAPIUM.** Foliis conformibus, fructibus subglobosis, (octogonis. Umbellae radii quinque vel sex. Folia bipinnata, pinnulis subtus lucidis.) (G.) Gaertn. de fr. et fem. Cent. 2. t. 22. f. 3.

Habitat inter fluvium Ruffiam et Siftam in fylvis et Petropoli in hortis oleraceis. Floret Iulio. ☉
Собачая пепрушка. Russ.

CHAEROPHYLLUM. Involucrum (partiale) reflexum, concavam. Petala inflexo-cordata. Fructus nitens, (ut plurimum) laevis, oblongus, rostratus, varius. (Flosculi disci abortivi.)

206. **CHAEROPHYLLUM SYLVESTRE.** Caule laevi striato: geniculis tumidiusculis. (Caulis sulcatus, hirsutus: ramis glabris. Folia multiplicatopinnata, costis fistulosis; foliolis serrato-incisis, atrovirentibus dorso pallidioribus. Umbellae planiusculae, radiis septemdecim aut octo minores ut plurimum duae intra dichotomiam prius maturescunt. Involucrum partiale hexaphyllum. Petala alba, extimo majore, antherae ochroleucae. Radix apii odore, sapore ingrato.) (G.) Iacq. fl. austr. 2. t. 149.

Crescit in fylvis insulae lapideae, apothecariae et ubique in hortis copiosissime. Floret Iunio. 2
Кервель five болиголовъ. Russ. Кервель лѣс-
ный. Sobol.

207. **CHAEROPHYLLUM AROMATICUM.** Caule aequali, foliolis ferratis integris, seminibus bibriftatis. (Radix apii sapore. Caulis inferne plerumque flexuosus, purpura maculatus; folia omnia subbiternata, pinnulis oblongo-ovatis, ferratis, atrovirentibus. Rami extremi umbellis erectis, radiis duodecim aut octodecim. Involucrum partiale hexaphyllum aut decaphyllum. Petala nivea, antheris sulphureis.) (G.) Iacq. flor. austr. 2. t. 150.

Habitat inter pagos Voroneschscaja et Novaburia ad marginem sylvae. Floret Junio, Julio. 2
 Кервель пряный. Russ. Sobol.

SESELI. Involucellum foliolo uno alterove. Umbellae globosae. Fructus ovatus, striatus. Styli deflexis.

208. **SESELI ANNUUM.** Petiolis rameis membranaceis ventricosis emarginatis. (Radix acris, nauseosa, quodam sapore Apii Petroselinii. Caulis varius purpureus; petioli valde vaginantes, striati, virentes aut sanguinei; pinnulae lanceolato-lineares. Umbella convexa. Petala alba, rubellave, antheris flavis.) (G.) Jacq. fl. austr. I. t. 55.

In Flora ingrca Gorteri locus crescendi non est indicatus: Quaerendum est in pratis ficcioribus. Floret Julio, Augusto. ☉ Чистецъ годовый. Russ. Sobol.

PASTINACA. Petala involuta, integra. Semina elliptica, foliatio-compresfa, glabra: margine tenui angusta.

209. **PASTINACA SATIVA.** Foliis simpliciter pinnatis foliolis incisis. (Floribus flavis, styli divaricatissimis, seminibus viridibus, convexis.) (Involucrum universale tetra aut penta-phyllum foliolis inaequalibus oblitteratis.) (G.) Blackw. herb. t. 379. Pastinaca. officinar.

Habitat in sylvis circa urbem Narvam, et Petro-poli circa fossas viarum atque in hortis oleraceis copiose, nec non ad pagos circa montem Dedurovium. Floret Julio, Augusto. ♂ Пастернакъ. Russ. Пастернакъ садовый. Sobol.

CARUM. Involucrum saepius monphyllum. Petala carinata, inflexo-emarginata. Fructus ovato-oblongus, ellipticus, gibbus, teretistriatus.

210. **CARUM CARVI.** Folia bipinnata, foliolis primis in costa verticillatis, ad vaginae basin stipulis multifidis praedita. (Involucrum tetra aut penta-phyllum. Umbellae rarae, radiis duodecim, pedunculis viginti, germina vertice flavicantia.) (G.) Jacq. austr. 4. t. 393. Carvi. officin.

Crescit in insulis, Apothecaria, lapidea, Petri, crucis et ubique in pratis cultis, et ad vias, copiosissime. Floret Iunio, Iulio. ♂ Тимонъ. Russ. шимонъ душистый. Sob.

PIMPINELLA. Umbellae juniores nutantes. Petala inflexa. Styli recti. Stigmata subglobosa. Fructus exigui, ovato-oblongi: striis quinque elevatis, superne angustiores.

211. **PIMPINELLA SAXIFRAGA.** Caule striato glabro, foliis radicalibus subrotundis argute dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. (Caeteris villosior, foliis rotundioribus, caule plerumque aphyllō ramosiore, umbellis minoribus, petalis semper albis.) (G.) Jacq. fl. austr. 4. t. 395. Pimpinella alba, officin.

Habitat in pratis ficcioribus elevatis, in monte Poclonnaja, in insula lapidea et Apothecaria, et passim copiosè. Floret Iunio, Iulio. 2 Бедринецъ. Russ. Бедринецъ каменистый. Sobol.

AEGOPODIUM. Umbella convexa, umbellulis planis. Petala cordata. Fructus ovato-oblongus, striatus, utrinque attenuatus.

212. AEGOPODIUM PODAGRARIA. (Foliis ovato-lanceolatis denticulatis subtus villosis, inferioribus biternatis, summis ternatis; petalis albis. Styli reflexi. (G.) Flor. dan. t. 670. Podagra-ria officinar.

Crescit in pratis sylvosis, tum ad fepes, et in hortis oleraceis aliisque copiosissime. Floret Iunio, Julio. 2 Снимъ five дяглица. Suss. Снимъ подагрическая. Sob.

TRIGYNIA.

VIBURNUM. Calyx quinquepartitus, superus. Corolla quinquefida. Styli nulli. Drupa unilocularis clausa, monosperma.

213. VIBURNUM OPULUS. Foliis lobatis, petiolis glandulosis. (Folia trilobata; flores magni, steriles; stylus brevis ex tribus connatus.) (G.) Fl. dan. t. 661.

Habitat ubique in sylvis humidis, praecipuae ad viam Wiburgensem et circa fabricam pyriam Ochtemsem, usque ad fluvium Wolchow. Floret Majo, Iunio. † Калина. Russ.

ALSINE. Calyx pentaphyllus. Petala quinque aequalia bifida. Capsula unilocularis, trivalvis, (aut sexvalvis.) Calyce tecta.

214. ALSINE MEDIA. Petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis, (apice glandula rubella terminatis, petiolis ciliatis, ciliis decurrentibus; floribus triandris aut pentandris.) (G.) Curtis flor. Londin. t. 70. Alfine officinar.

Crescit ubique in hortis oleraceis, ad sepes et vias passim. Floret tota aestate. ☉ Мокрица. Russ. мокрица средняя. Sob.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA. Calyx quinquepartitus. Petala quinque. Nectaria quinque cordata, ciliata: apicibus globosis. Stylus nullus, ejus loco foramen. Stigmata quatuor obtusa. Capsula quadrivalvis unilocularis. Receptaculum parietale. Semina membranacea, marginata.

215. **PARNASSIA PALUSTRIS.** Nectariis simplicibus. (Caulis in medio folium perfoliatum. Petala alba, ovata, lineata. Stamina persistencia.) (G.) Fl. dan. t. 584. Hepatica alba. officin.

Habitat in udis muscosis ad viam Wiburgensem, ad fluuium Strelnaja, et passim ad ductus aquarum, et margines sylvarum. Floret Iulio, Augusto. 2/ Золошникова шправа. Russ. Золошничка болотная. Sobol.

LINUM. Calyx pentaphyllus. Petala quinque. Capsula quinquevalvis, decemlocularis. Semina folitaria.

216. **LINUM CATHARTICUM.** Foliis oppositis ovauo-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. (Calyces aristati patuli, pedunculis nutantibus. Flores albidi, ante anthesim penduli. Stamina quinque sterilia.) (G.) Flor dan. t. 851. Linum Catharticum. offic.

In aruis et pratis succulentis, circa Crasnoje Selo, Sarsoje Selo, et passim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Ленъ проносный. Russ. Sob.

DROSERA. Calyx quinquepartitus. Petala quinque. Capsula unilocularis, apice quinquevalvis. Semina plurima, parietalia.

DROSERA ROTUNDIFOLIA. Scapis radicatis, foliis orbiculatis. (G.) Flor. dan. t. 1028. Ros folis officinar.

In paludibus fylvofis apricis, circa cimiterium Sancti Ioannis, Pargelovii ad ripas lacuum et passim in locis similibus. Floret Iunio, Iulio. ☉ Солнечная роса. Russ. Солнечная роса круглая. Sob.

218. **DROSERA LONGIFOLIA.** Scapis radicatis, foliis obovali-lanceolatis, (in petiolum decurrentibus.) (G.) Flor. dan. t. 1093.

Habitat in paludibus muscosis cum praecedente. Floret etiam Iunio, Iulio. ☉ Солнечная роса долголишная. Russ. Sobol.

P O L Y G Y N I A .

MYOSURUS. Calyx pentaphyllus, basi adnatus, coloratus, deciduus. Petala quinque unguiculata, oblique aperta sive Nectaria, (quorum vides poro nectarifero insuper sunt instructi.) Receptaculum subulatum, capsulis imbricatim tectum. Capsula bivalvis. Semina numerosa, corticata, pendula.

219. **MYOSURUS MINIMUS.** (Foliis integerrimis linearibus, flavo-viridibus; petala decidua. (G.) Flor. dan. t. 406.

Habitat in agris et arvis, ad fabricam pyriam Ochtensem, circa pagos Ligovo, et Goreloy ca-

bas, atque Petropoli in hortis. Floret Majo, Junio.

○ Мышій хвостъ. Russ. мышій хвостъ малыйшій. Sob.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

ALLIUM. Spatha multiflora, arida. Umbella congesta. Corolla hexapetala, patens, petala tria staminifera. Capsula supera trilocularis.

ALLIUM OLERACEUM. Staminibus simplicibus, foliis scabris semiteretibus subtus fulcatis. (Spatha diphylla, umbella depauperata.) (G.) Hall. all. n. 26. f. 2.

Habitat in monte Duderovo et viciniis urbis Gatzinae. Floret Junio, Julio. 2 Чеснокъ огородный. Russ. Sobol.

221. **ALLIUM SCHOENOPRASUM.** Scapo nudo adaequante folia teretia subulato filiformia, (fistulosa; spatha diphylla; petalis conniventibus, bulbo composito. Varietas β major. (G.) Murray comm. gott. 1775. p. 33. t. 4.

Crescit in insula rotunda, et in littore humido insulae lapideae a parte occidentali et meridionali, cum sua varietate, tum circa montem Duderovium. Floret Junio, Julio. 2 Лучокъ мелкій. Russ. Sobol.

ORNITHOGALUM. Corolla infera hexapetala erecta, persistens, supra medium patens. Filamenta alterna basi dilatata. Capsula supera, trilocularis, trivalvis.

222. **ORNITHOGALUM LUTEUM.** Scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus, (inaequalibus, floribus flavis. Radix bulbosa, stipulis maximis hirsutis. Folia radicalia graminea: caulina spathaeformia. Stamina quatuor five octo.) (Sob.) Flor. dan. t. 378.

Habitat parce in hortis, et in sylvis insulae apothecariae atque insulae lapideae. Floret Majo. 24 Пшичье млеко желтое. Russ. Sobol.

223. **ORNITHOGALUM MINIMUM.** Scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis ramosis. Fl. dan. t. 612.

Habitat circa fluvium Strelnaja ad margines sylvarum. (G.) Floret Majo. 24 Пшичье млеко малѣйшее. Russ. Sobol.

CONVALLARIA. Corolla infera sexfida. Bacca immatura maculata, supera, trilocularis. Semina duo solitaria

224. **CONVALLARIA MAJALIS.** Scapo nudo, femitereti, floribus spicatis nutantibus. (Subcaulis, bifolia, foliis ellipticis; flores globose-campaniformes secundi.) (G.) Flor. dan. t. 854. Liliium Convallium. officin.

Grescit vbique in sylvis umbrosis ut et in insulis Nevae fluvii. Floret Majo, Junio. 24 Ландышь майскій. Russ. Sobol.

225. CONVALLARIA POLYGONATUM. Foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. (Caule octangulo.) (G.) Flor. dan. t. 377. Sigillum Salomonis. officin.

Habitat ubique in fylvis. Floret Iunio. 24 Купено, five Саломонова печать. Russ. Ландышъ многоколѣнчатый. Sobol.

226. CONVALLARIA MULTIFLORA. Foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. (bi five trifloris.) Stamina hirta. Flores ut plurimum terni, summi gemini.) (R.) Flor dan. t. 152.

Crescit Pargelovii in fylvis montosis a sinistra parte viae Wiburgensis, et circa Sarsoje felo. Floret Majo, Iunio. 24 Ландышъ многоцѣнный. Russ. Sobol.

227. CONVALLARIA BIFOLIA. Foliis cordatis, floribus tetrandris. (Flores quadrifidi.) (G.) Flor. dan. t. 291. Bifolium officin.

Ubivis in fylvis umbrosis ficcis, ut et in insula apothecaria, vulgaris planta est. Floret Iunio. 24 Ландышъ двулистый. Russ. Sob.

IUNCUS. Gluma floralis, bivalvis. Calyx hexaphyllus, persistens. Corolla nulla. Capsula supera, trilocularis, trivalvis, polysperma, vel unilocularis trisperma.

* Culmis nudis.

228. IUNCUS CONGLOMERATUS. Culmo stric-
to, capitulo laterali; floribus triandris ovatis

obtusis. (Capitulum densum, globosum, sessile; Capsulae acutae trigonae.) (Sob. R.) Fl. dan. t. 1094.

Crescit ubique in uliginosis, praecipue in fossis ad viam Wiburgensem, et in insulis Nevae fluvii. Floret Iunio, Iulio. 2 Сипникъ клубчатый. Russ. Sobol.

229. IUNCUS EFFUSUS. Culmo stricto; panicula laterali laxa, floribus triandris ovatis obtusis. (Panicula sparsa, squamae duae rubellae, subaristatae, antheris luteis. Capsula obovata.) (G.) Fl. dan. t. 1095.

Crescit passim in paludibus. Floret Iunio. 2 Сипникъ розсыпный. Russ. Sobol.

230. IUNCUS FILIFORMIS. Culmo incurvo filiformi, panicula laterali pauciflora simplici (G.) Schmidt Spicil. t. 3.

In paludibus quae aestate exsiccantur, non raro occurrit, uti circa semeterium Sti. Iohannis. Floret Iunio, Iulio. 2 Сипникъ нишчатый. Russ. Sobol.

231. IUNCUS SQUARROSUS. Culmo rigido, foliis setaceis, panicula terminali aphylla. (Totus rigens foliis patentibus squarrosis distichis, culmo nudo subcorymbofo.) (Sob. R.) Flor. dan. t. 430.

In paludibus circa Murinam et in aliis locis similibus frequens est. Floret Iunio. 2 Сипникъ чешуйчатый. Russ. Sobol.

** Culmis foliosis.

232. IUNCUS ARTICULATUS. Foliis nodoso-articulatis, petalis obtusis. (G.) Flor. dan. t. 1095.

Ad ripas fluvii Tschornaja in regione Wiburgensi, et passim in paludibus aestate exsiccatis. Floret Junio. 2 Ситникъ суставчатый. Russ. Sobol.

233. IUNCUS BULBOSUS. Culmo indiviso subcompressio, foliis linearibus canaliculatis, panícula terminali bractea sua breviori, calycibus capsulisque obtusis. (G.) Flor. dan. t. 431.

Crescit in paludosis cum precedente passim. Floret Junio. 2 Ситникъ луковчатый. Russ. Sobol.

234. IUNCUS BUFONIUS. Culmo dichotomo, floribus solitariis sessilibus, calycis foliolis lanceolatis mucronatis, capsula ovata longioribus. (Culmus fetaceus.) (G.) Fl. dan. t. 1096.

Nascitur caespitose in ripis Nevae fluvii, quae aquis alluuntur, et in aquis ipsis, subulariaeque inseparabilis comes, uti ad ripam parvae Nevae in regione Wiburgensi. Floret Majo, Junio. ☉ Ситникъ жабный. Russ. Sobol.

235. IUNCUS PILOSUS. Foliis planis pilosis, corymbo ramoso. (Pedunculi uniflori terminales; flores quaterni in culmo) (G.) Flor. ean. t. 441.

Habitat in sylvis humidis circa fabricam pyriam Ochtensem et Murinam satis frequens Floret Junio, Julio. 2 Ситникъ волосатый. Russ. Sobol.

236. IUNCUS CAMPESTRIS. Foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque. sexflo-

ris aut duodecim floris) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 140.

Habitat in campis apricis passim. Floret Majo, Junio. 2 Сипшикъ полевой. Russ. Sobol.

PEPLIS. Calyx campanulatus, ore 12-fido. Petala nulla aut sex, calyci inserta. Capsula bilocularis, supera, polysperma.

237. **PEPLIS PORTULA.** Floribus saepius apertalis. (Caulibus repentibus. subquadrangularibus, foliis obovatis, conjugatis; floribus axillaribus oppositis. Folia suprema tandem in rosulas accumulata. Petala fugacissima, dilute rosea.) (Sob. R. B.) Flor. dan. t. 64.

Habitat in fossis circa Nofocomium maritimum, et in sylvis paludosis. Floret Majo, Junio. ☉ Спорышъ водяной. Russ. Sobol.

TRIGYNIA.

RUMEX. Calyx triphyllus. Petala tria conniventia. Semen unicum triquetrum in corolla connivente.

238. **RUMEX CRISPUS.** Floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. (Folia cordato-oblonga.) (G.) Curtis Fl. Lon. t. 104.

Habitat in agris circa Slavjanka, et Petropoli in pratis humidis et hortis. Floret Junio, Julio. 2 Щевель кудрявый. Russ. Sobol.

239. **RUMEX ACUTUS.** Floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato oblongis acuminatis. (Valvularum dentes utrinque

plures, inaequales longitudine diametri ipsius valvulae.) (G.) Blackw. herb. t. 491. *Lapathum acutum* officin.

Habitat in pratis humidis et locis succulentis in regione Wiburgensi, et in hortis passim. Floret Iunio, Iulio. 2 Щевель конский. Russ. five щевель оспролисый. Sobol.

240. RUMEX OBTUSIFOLIUS. Floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis, obtusiusculis crenulatis. (Sob.) Curtis flor. Lond. t. 168.

Habitat in pratis humidis fabricae pyriae Ochtenfis, tum ad fossas viarum et fere ubique in hortis oleraceis. Floret Iunio, Iulio. 2 Конский щевель. Russ. Щевель шуполисый. Sobol.

241. RUMEX AQUATICUS. Floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. Semina pappis ferrugineis coronata.) (G.) Blackw. herb. t. 490. *Lapathum aquaticum* officin.

Crescit copiose ad ductus aquarum et paludes, atque in sylvis humidis. Floret Iunio, Iulio. 2 Шевель водяной. Russ. Sobol.

242. RUMEX ACETOSA. Floribus dioicis, foliis oblongis, sagittatis, (caulinis sessilibus, segmentis oblique truncatis, pedunculis articulato-coarctatis.) (G.) Knorr. del. hort. 2. t. A. 13. *Acetosa* officinar.

In insula apothecaria et ubique in pratis vulgaris planta est. Floret Majo, Iunio. 2 Щевель Russ. Щевель кислый. Sobol.

243. RUMEX ACETOSELLA. Floribus dioicis, foliis lanceolato-natis, (petiolatis.) (G.) Knorr. del. hort. 2. t. A. 14.

Habitat in pratis cultis ficcioribus. Floret Iunio.
 2 Щевель мѣлкій. Russ. Sobol.

SCHEUCHZERIA. Calyx sexpartitus. Corolla nulla. Styli nulli. Capsulae tres vel sex inflatae, compressae, monospermae.

244. SCHEUCHZERIA PALUSTRIS. (G.) Flor. dan. t. 76.

Crescit in paludibus muscosis circa montem Duderovium, in Osinova Roszczca, et in aliis locis similibus. Floret Majo. 2 Сипница болотная. Russ. Sobol.

TRIGLOCHIN. Calyx triphyllus. Petala tria calyciformia, stamina recondentia. Stigmata plumosa tria vel sex, petala mentientia. Capsula basi dehiscens.

245. TRIGLOCHIN PALVSTRE. Capsulis trilocularibus sublinearibus, (spica dimidiata. Radix fibrosa.) (Flor. dan. t. 411.

Habitat in ripis arenosis Nevae fluvii, circa fortalitium Sti. Petri et Pauli, et ubique in paludosis circa fluvios. Floret Junio. ♂ Тривострица болотная. Russ. Sobol.

P O L Y G Y N I A.

ALISMA. Calyx triphyllus. Petala tria, unguibus staminiferis. Capsulae plures, coriaceae, compressae, receptaculo communi affixae. Semina plura, conduplicata.

246. **ALISMA PLANTAGO.** Foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis. (Panicula magna laxa, racemis verticillatis, petalis albis. (G.) Flor. dan. t. 561. Plantago aquatica. officin.

In paludibus et fossis vulgatissima planta est. Floret Junio. Julio. 24 Попушникъ въдяный. Russ. five. Частуха водяная. Sobol.

C L A S S I S VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

TRIENTALIS. Calix heptaphyllus. Corolla septem-partita, plana, aequalis. Bacca five theca exfuc- ca, supera, globosa, univalvis, unilocularis. Se- mina depressa, angulata. (Numerus variat.)

247. **TRIENTALIS EUROPAEA.** Foliis ovalibus integerrimis. (Flos Alfinis. Tota plantula et ma- gis in foliorum marginibus glandulis, uti in Me- sembryanthemis, oblecta.) (G.) Fl. dan. t. 86. a. Varietas, eadem biflora.

Habitat in fylvis montosis, et umbrosis, ubique, tum in insulis Apothecaria, lapidea et Basileenfi copiosissime. Floret Majo, Junio. 24 Троечница Европейская. Russ. Sobol.

C L A S S I S V I I I .

O C T A N D R I A

M O N O G Y N I A .

EPILOBIUM. Calyx tetraphyllus, deciduus. Petala quatuor. Capsula infera, longissima, quadrilocularis, quadrivalvis, cylindracea. Receptaculum liberum coloratum. Semina plura apice pappo coronata.

* *Staminibus declinatis.*

248. EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM. Foliis sparsis lineari-lanceolatis, floribus inaequalibus. (Foliis glabris, venosis, petalis ellipticis integerrimis, pistillo, declinato.) (G.) Flor. den t. 289.

Habitat in fylvis montosis; uti Pargelovii, et Sarcoselii, tum que in insula petri, et in multis hortis, oleraceis copiose. Floret Junio, Julio. 2 Кипрей. Russ. Кипрей усколистый. Sobol.

** *Staminibus erectis, corollis regularibus, petalis bifidis.*

249. EPILOBIUM HIRSUTUM. Foliis oppositis ovato-lanceolatis, serratis, hirsutis, semiamplexicaulis, caule ramosissimo villosa. (Floribus saepe difformibus, petalis emarginatis; calyces mucronati, capsulae longissimae, pistillis declinatis. (G.) Flor. dan. t. 327.

Ad vias et ductus aquarum: prope montem Pulcova, et Sarfoje felo vulgaris planta est. Floret Iulio. 24 Кипрей мохнапый. Russ. Sobol.

250. EPILOBIUM PARVIFLORUM. Foliis lanceolatis subpetiolatis pubescentibus, caule villoso simplicissimo. (Sob. R.) Flor dan. t. 347.

Crescit in monte Pulcovo et Ofinova Roshcza, gaudet locis elevatis ficcioribus. Floret Maio, Iunio. 24 Кипрей мѣлкоцвѣтный. Russ. Sob.

251. EPILOBIUM MONTANUM. Foliis oppositis, ovatis, dentatis. (Petala bifida. Caulis simplex, racemi foliosi.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 195.

Habitat in montosis, umbrosis, uti in monte Pulcova, et ad ripas arenosas Nevae fluvii. Floret Iunio, Iulio. 24 Кипрей горный. Russ. Sobol.

252. EPILOBIUM PALUSTRE. Foliis oppositis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. (Foliis linearibus, racemis laxis.) (G.) Tabernaemont. Kraeuterb. p. 856. Fl. dan. t. 347?

Habitat in paludibus et locis humidis passim. Floret Iunio, Iulio. 24 Кипрей болотный. Russ. Sobol.

VACCINIUM. Calyx quadridentatus superus. Corolla monopetala, quadrifida. Filamenta basi germinis inserta. Antherae bicornes, medio aristatae. Bacca quadrilocularis, aut quinquelocularis, polysperma, infera umbilicata.

* Foliis annotinis f. deciduis.

253. VACCINIUM MYRTILLUS. Pedunculis unifloris, foliis ferratis ovatis, caule angulato. (Calyx saepe integerrimus, corolla quinquefida, stamina 5-10, stigma concavum, margine denticulatum, fructus niger, ut plurimum quinquelocularis.) (G.) Schkuhr, bot. Handb. p. 330. t. 107. Myrtillus officin.

Habitat in sylvis humidis, circa pagum Ochta et passim. Floret Majo. † Черница vel черника. Russ.

254. VACCINIUM ULIGINOSUM. Pedunculis unifloris, foliis integerrimis obovatis obtusis laevibus. (Frutex procumbens diffusus, ramis fuscis, radicanibus, foliis subtus reticulato-venosis, pedunculis rubellis, solitariis, flore carneo, fructu caeruleo. Tenella folia basi ciliata.) (G.) Fl. den. t. 231.

Habitat ubique in sylvis humidis umbrosis, uti circa Ochta et ad Cimeterium Sti. Iohannis. Floret Majo. † Голубица, Голубика, пьяница et Гонобобель. Russ.

** Foliis sempervirentibus.

255. VACCINIUM VITIS IDAEA. Racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis, (baccis rubris.) (G.) Fl. dan. t. 40. Vitis idaea officinarum.

Habitat in montosis apricis et sylvis ubique. Floret Iunio. † Брусница f. Брусника. Russ.

256. VACCINIUM OXYCOCCUS. Foliis ovatis integerrimis revolutis, caulibus filiformibus, repentibus nudis. (Corolla demum reflexa, ut in

cyclamine, rubella, pedunculo terminali longo filiformi.) (G.) Flor. dan. t. 80. (Schollera oxycoccus. Roth. Germ. Ob corollam quadripetalam revolutam, filamenta conniventia et Antheras tubulosas, bipartitas.) Охыцoccus, officinar.

Crescit ubique in paludibus inter Sphagnum. Floret Majo. 2/ Клюква, five Журавлина. Russ.

ERICA. Calyx tetraphyllus, inferus, foliolis coloratis persistentibus. Corolla quadrifida. Filamentata receptaculo inserta. Antherae apice bifidae, pertusae. capsula quadrilocularis, quadrivalvis, polysperma, dissepimentis cum futuris coeuntibus.

257. **ERICA VULGARIS.** Antheris inferne fetis duabus acutis dentato-ferratis, foliis oppositis sagittatis, (quadrifariam imbricatis, calycibus duplicibus, corollis subaequalibus campanulatis spicatis, antheris ferrugineis.) (G.) Flor. dan. t. 677. Erica officin.

In montosis et sylvis sterilibus, ficcioribus turfaceis vulgaris planta est. Floret Majo, Iunio. 1/2 /3 variet. flore albo. Cum priori occurrit sed parce, uti circa Sarcoje felo, et Pargelovium, Верескb. five Вересб. Russ. Вересбb обыкновенный. Sobol.

DAPHNE. Calyx (plurimis) nullus. Corolla monopetala, regularis, quadrifida, infundibuliformis. Stamina alterna inferiora. Drupa baccata, supera, unilocularis. (Stylus nullus.)

258. **DAPHNE MEZEREUM.** Floribus sessilibus ternis caulinis. baccis globosis, foliis lanceolatis

deciduis. (Gemis enneaphyllis, floribus purpurascens, stigma rotundato albido, bacca rubra.) (G.) Flor. dan. t. 268. Mezereum, officinar.

Habitat in infula crucis, et passim in fylvis montosis. Floret Aprili, Majo. † Ягѳдки, five Волчій перецъ. Russ.

TRIGYNIA.

POLYGONYM. Calyx nullus. Corolla quinquepartita, calycina, segmentis tot, quod stamina. Semen unicum angulatum, nudum ut plurimum.

259. **POLYGONUM BISTORTA.** Caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. (Floribus saepius digynis, in spica densa ovato-cylindrica.) (G.) Flor. dan. t. 421. Bistorta, officin.

Ad ductum aquarum Ladogenium inter Nassium et Lavam fluvium in maxima copia. Floret Julio. † Горецъ five песникъ. Russ. Горецъ аншекарскій. Sobol.

260. **POLYGONYM VIVIPARYM.** Caule simplicissimo monostachyo, foliis lanceolatis. (superioribus lanceolatis, spica laxa. Flores digyni aut trigyni, albi, spica trigona, semina rotunda.) (Spicae flores inferiores in bulbos transeunt saepe viviparos.) (G.) Fl. dan. t. 13.

Habitat in pratis humentibus circa Sarsoje felo, Crasuoje felo, et in insulis Lapidea, et Camennoj nos satis in magna copia. Floret Majo, Junio. † Горецъ живородный. Russ. Sobol.

261. POLYGONUM AMPHIBIUM. Floribus pentandris semidigynis, spica ovata. (Caule repente geniculato. In aquis foliis lanceolatis, petiolatis glabris, in arvis foliis acutioribus scabris variat: floribus utrisque purpureis, staminibus corolla longioribus.) (G.) Fl. dan. t. 282.

Habitat in paludibus et stagnis uti in infulis, apothecaria, lapidea, et in aliis similibus. Floret Junio, Julio. ☉ Горецъ водоземный. Russ. Sobol.

262. POLYGONUM HYDROPIPER. Floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis, (ciliatis, floribus spicatis, spicis laxis nutantibus, caule erecto. Spicae elongatae cernuae. Folia subundulata.) (G.) Blackw. herb. t. 119.

Habitat in uliginosis pratensibus, et ad fossas viarum frequens. ☉ Горецъ водоперечный, Russ. Sobol.

263. POLYGONUM PERSICARIA. Floribus hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. (Cauce dichotomo, spicae densae interruptae saepius. Variat caule nodoso, foliis maculatis et puris, subtus incanis.) (G.) Flor. dan. t. 702. Persicaria, officin.

Habitat passim in locis cultis, ruderatis et ubique in fossis humidis. Floret Junio, Julio. ☉ Почечуйникъ. Russ. Горецъ почечуйный. Sobol.

264. POLYGONUM AVICULARE. Floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente, (ramosissimo interdum erecto, vaginis laceris coloratis glaucescentibus, ca-

lycibus inermibus, albo-rubellis.) (G.) Flor. dan. t. 803. Centinodium officinarum.

Crescit ubique ad vias et fepes, in cultis, ruderratis. Floret Junio, Julio. ☉ Спорышъ. Russ. Горецъ пшчій. Sobol.

265. POLYGONUM CONVULVULUS. Foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus planiusculis obtufatis. (Flores digyni aut trigyni, albi, antheris rubris. Calyx fructus subfarinaceus, femina obtuse trigona.) Flor. dan. t. 344.

In agris et hortis frequens est. Floret Junio, Julio. ☉ Горецъ обвилчнй. Russ. Sobol.

TETRAGYNIA.

PARIS. Calyx tetraphyllus. Petala quatuor angustiora. Antherae medio filamentorum utrinque adnatae. Bacca quadrilocularis globosa.

266. PARIS QVADRIFOLIA. (Caulis simplex, foliis sessilibus ellipticis verticillatis quatuor aut quinque, bacca nigra, fusco-violacea. Flor. dan. t. 139. Paris officinar.

Habitat in insulis, apothecaria, lapidea, et sylvis umbrosis passim. (G.) Floret Majo, Junio. 2/ Вороній глазъ. Russ.

ADOXA. Calyx bipartitus aut quinquepartitus, inferus. Corolla quadrifida five quinquefida. Bacca quadrilocularis aut quinquelocularis, cum calyce coalita. (Corolla lateralis decandra saepius.)

267. ADOXA MOSCHATELLINA. (Flore terminali octandro trifido, lateralibus decandris quin-

quefidis. Odorem gratum spirant. Folia terna: duo opposita, uno latere semel incisa; solitarium trilobatum vel quadrilobatum. Flores pallide virides.) (L.) Fl. dan. t. 94.

Habitat in sylvis subhumidis apricis, uti in insula Camennoy Nos vocata, et in viciniis Sarscofelii. Floret Majo. 2/ Мускашница. Russ. Sobol.

ELATINE. Calix triphyllus aut tetraphyllus. Petala tria aut quatuor. Capsula tri-vel quadrilocularis, tri-aut quadrivalvis, depresso.

268. **ELATINE HYDROPIPER.** Foliis oppositis, floribus alternis. (Caulis ramosus geniculatus repens.) (G.) Flor. dan. t. 156.

Crescit in ripis Nevae fluvii et in fossis ex ficatis. Велвошъ. Russ. Велвошъ водоперечный. Sobol.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA

HEXAGYNIA.

BUTOMUS. Involucrum simplex, triphyllum. Petala sex. Capsulae sex polyspermae, introrsum dehiscentes. Semina parietalia.

269. **BUTOMUS UMBELLATUS.** (Pedunculi viginti et ultra ex summo culmo; petala ovata ex albo rubroque varia.) (G.) Flor. dan. t. 604.

Habitat in paludibus aquosis, circa fluvium Wolchow, et ductum aquarum Ladogensium, in stag-

nis Strelinae, Lacubus Ligovi, in fossis aquaticis circa viam Peterhoviaenam ad Uljancam, Catharinhoffii, et Petropoli in littore parvae Nevae fluvii e regione Wiburgensi: Floret Julio. 2 Сусакъ. Russ. Сусакъ пучкоцвѣтный. Sob.

C L A S S I S X.

D E C A N D R I A

M O N O G Y N I A.

MONOTROPA. Calyx nullus, nisi petala quinque exteriora. Petala decem, horum quinque exteriora basi excavata mellifera, gibba. Capsula quinquevalvis polysperma. (Quinta pars numeri in lateralibus excluditur.)

270. **MONOTROPA HYPOPITHYS.** Floribus lateralibus octandris, terminali decandro. (Scapus squamis carneis, floribus decem magnis spicatis, nutantibus, flavis genistoideis. Staminibus sex aut decem villosis.) (L.) Flor. dan. t. 232.

Habitat in sylvis umbrosis, annosis humidiusculis arenosis, uti non procul a Catharinhoff; in monte Duderovo, et Ofinova Roszczca, ad radices pini abietis et sylvestris atque ligna putrida. Floret Julio. Parasitica. 2 Уединенница подсосонная. Russ. Sobol.

LEDUM. Calyx quinquefidus. Petala quinque, patentia, plana. Capsula quinquelocularis, quinquefarium dehiscens.

271. **LEDUM PALUSTRE.** Foliis linearibus, staminibus decem corolla longioribus. (Foliis sparsis, margine revolutis, subtus hirsutis, rubiginosis, rosmarinoideis; floribus terminalibus corymbosis, albo-luteolis.) (G.) Fl. dan. t. 1031. Rosmarinus sylvestris, officinar.

In paludosis, turfosis, circa monasterium Alexandro-Newsky, in monte Poclonnaja et passim in quantitate occurrit. Floret Aprili, Majo. † Баронъ болотный. Russ. Sobol.

ANDROMEDA. Calyx quinquepartitus, coloratus, minimus. Corolla campanulata quinquefida, magis minusve ovata. Capsula quinquelocularis, dissepimentis valvis contrariis. Semina pauca. (Antherae nutantes, bicornes, muticae vel aristatae.)

272. **ANDROMEDA POLIFOLIA.** Umbellis terminalibus paucifloris, corollis ovatis nutantibus, foliis alternis lineari-lanceolatis revolutis. (Fruticulus caule purpureo repente, foliis subtus incanis; floribus umbellatis terminalibus, pedunculis nutantibus, albo-incarnatis corollis rubellis.) (G.) Flor. dan. t. 54.

In sylvis humidis circa cimiterium Sti. Iohannis, et in insulis Nevae fluvii frequens est. Floret Majo, Junio. † Безплодница гладколистая. Russ. Sobol.

273. **ANDROMEDA CALYCVLATA.** Racemis fecundis foliaceis, corollis subcylindricis, foliis alternis lanceolatis obtusis punctatis. (Antherae muticae bifidae.) (G.) Vuxb. comment. Petropol. I. t. 8. f. 1.

Habitat in fylvis umbrosis humidis circa Muri-
nam, et cum priori. Floret Majo, Junio, et
Augusto. † Безплодница шочколистная. Russ.
Sobol.

ARBUTUS. Calyx quinquepartitus. Corolla ovata,
ore quinquefido basi pellucida. Filamenta subu-
lato-ventricosa. Bacca quinquelocularis, supera,
poly sperma.

274. **ARBUTUS UVA URSI.** Caulibus procum-
bentibus, foliis oblongo-ovatis integerrimis sub-
tus reticulatis. (Floribus paucis decem aut un-
decem, bacca rubra. Folia glabra, subtus super-
ficialiter punctato-reticulata.) (G.) Flor. dan. t.
33. Uva ursi officinarum.

Habitat in pratis montosis, in monte Poclonnaja,
Pargelovii in Pinetis, in superiori regione Nevae
fluvii et ad Lugam locis flexilibus. Floret. Majo.
† Медвѣжьи ягоды. five Толокнянка. Russ.

PYROLA. Calyx quinquepartitus. Petala quinque.
Antherae nutantes, sursum bicornes. Capsula
quinquelocularis, angulis dehiscens, dissepimen-
tis contrariis. Semina arillata plurima.

275. **PYROLA ROTUNDIFOLIA.** Stamina ad-
scendentibus, pistillo declinato, oblique trunca-
to (Tubo incurvo.) (G.) Flor. dan. t. 110 pyro-
la officin.

Ubique in nemoribus umbrosis frequens. Floret
Junio, Julio. † Грушовка. Russ. Грушовка кру-
глолистная. Sobol.

276. **PYROLA MINOR.** Floribus racemosis disper-
sis, staminibus pistillis que rectis. (Foliis subro-

tundis obsolete crenulatis, dentibus calycis maculatis, petalis dorso rubellis. Pistillum rectum crassum staminibus dimidio longius, stigma virescens pentagonum.) (G.) Flor. dan. t. 55.

Habitat in sylvis cum priori, sed parcius. Floret Junio, Julio. 2 Грушовка меньшая. Russ. Sobol.

277. PYROLA SECUNDA. Racemo unilaterali, (foliis ellipticis acuminatis, dentibus calycinis puris. Corolla ut plurimum clausa. Pistillum exsertum. Filamenta geniculata.) (G.) Flor. dan. t. 402.

Habitat in insula apothecaria et passim in sylvis. Floret Junio, Julio. 2 Грушовка односторонная. Russ. Sobol.

278. PYROLA UMBELLATA. pedunculis subumbellatis. (G.)

Circa ostium Nevae fluvii in pineto, aridis locis frequens. Floret Julio, Augusto. 2 Грушовка Пучкоцвѣтная. Russ. Sobol.

279. PYROLA UNIFLORA. Scapo unifloro. (Foliis subrotundis, calyce albo. Bractea majuscula. Antherae basi cornutae, cornibus incurvis. Stigma quadrifidum,) (G.) Flor. dan. t. 8.

Habitat in insula Basileenfi, circa fluvium tſchor-naja, alibi nusquam obvia. Floret Julio, Augusto. 2 Грушовка одноцвѣтная. Russ. Sobol.

DIGYNIA.

CHRYSOSPLENIUM. Calyx superus, coloratus, quadri five quinquefidus. Corolla nulla. Capsula bi-

rostris, unilocularis, polysperma, infera, femibivalvis. (Stamina interdum octo in floribus lateralibus.)

280. CHRYSOSPLENIUM ALTERNIFOLIUM. Foliis alternis. (Petiolis decurrentibus, floribus corymbosis, flavis. Calyx interdum quadrifidus; tum stamina octo. Capiulae maturae a se invicem dimovent, his facile ruptis, semina copiosa, spadicosa, acarorum adinstar conspiciuntur.) (G.) Fl. dan. t. 366.

Habitat in sylvis humidis umbrosis ubique. Floret Majo. 2/ Золополицшникъ круглолистный. Russ. Sobol.

SAXIFRAGA. Calyx quinquepartitus. Corolla quinquepetala. Capsula infera, birostris, bilocularis, polysperma, inter stylos foramine dehiscens. (Stamina persistencia alterna longiora.)

281. SAXIFRAGA HIRCULUS. Foliis caulinis lanceolatis alternis nudis inermibus, caule erecto. (Caulis simplex, saepe biflorus. Calix reflexus. Flores nutantes. Petala flava, nervosa. ab ungue ad dimidium punctis croceis maculata.) (L.) Flor. dan. t. 200.

Habitat in pratis humidis sylvosis ad Crasnoy cabac, item in paludosis circa Catharinhoffium, et prope Ligova. Floret Junio, Julio. 2/. Камено-сѣкѣ козлий. Russ. Sobol.

SCLERANTHUS. Calyx monophyllus, inferus, femiquinquefidus. Corolla nulla. Semen unicum calyce inclusum, collo coarctato.

282. **SCLERANTHUS ANNUUS.** Calycibus fructus patulis inermibus. (Staminibus plerumque quinque brevissimis; calyces acuti. Stigmata capitata flava. Foliis linearibus.) (G.) Flor. dan. t. 504.

Habitat in arvis circa montem Pulcovum, et in insula apothecaria aliisque locis ficcis ad vias passim. Floret Junio. ☉ Дивала годовая. Russ. Sobol.

283. **SCLERANTHUS PERENNIS.** Calycibus fructus clausis, (obtusis. Flore majore. Stigmata simplicia alba.) (Sob. R.) Flor. dan. t. 563.

Crescit copiose ad vias Pargelovii, et ad montem Pulcovum. Floret Junio, Julio. 2 Дивала многолетняя. Russ. Sobol.

GYPSOPHILA. Calyx monophyllus, campanulatus, angulatus. Petala quinque ovata sessilia. Capsula globosa, unilocularis, quadri-aut quinquevalvis.

284. **GYPSOPHILA MURALIS.** Foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule multiplicato-dichotomo ramosissimo, petalis crenulatis. (Calycibus plerumque aphyllis; petalisque primo albis dein incarnato rubellis lineis saturatioribus.) (G.) Mentz. pag. t. 7. f. 4.

Crescit in pratis ficcis et inter segetes prope Ligo et Goreloy сабаc. Floret Junio, Julio. ☉ Алабастренникъ стѣнный. Russ. Sobol.

DIANTHUS. Calyx monophyllus, tubulosus, cylindricus, basi squamis duabus aut octo. Petala quin-

que unguiculata. Capsula cylindrica, unilocularis, apice quadrifariam dehiscens.

285. **DIANTHUS DELTOIDES.** Squamis calycinis binis, corollis crenatis. (Petala dentata rubra, basi linea concentrica maculisque albis piliferis instructa.) (G.) Flor dan. t. 577.

Crescit in insulis, apothecaria, lapidea, et ubique in pratis exsuccis. Floret Junio, Julio. 2 Гвоздичка sive Травьянка Russ. Гвоздичка полевая. Sobol.

286. **DIANTHUS PLUMARIUS.** Squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis multifidis, fauce pubescentibus. (Calycibus longissimis. Odoratus.) (G.)

Crescit circa ostium Nevae fluvii una cum Pyrola umbellata et in littore arenoso maris inter Peterhoffium et Oranienbaumium. Floret Junio, Julio. 2 Гвоздичка перистая. Russ. Sobol.

TRIGYNIA.

CUCUBALUS. Calyx inflatus. Petala quinque (rarius plura) bifida (ut plurimum) absque corona ad faucem. Capsula trilocularis.

287. **CUCUBALUS BACCIFERUS.** Calycibus campanulatis, petalis distantibus, pericarpis coloratis, ramis divaricatis. (Caulis flaccidus. Calyx quinquepartitus. Petala ad faucem nunc nuda, nunc ut in filenis coronata. Bacca ex succa unilocularis, nigra.) (G.) Gmelin. act. Petropol. 1759. t. 17. f. 1.

Habitat in salicetis supra ostium Rossonae et Lugam fluvium cum Narova jugentis, inde inferio-

ra versus ad ostium usque Lugae fluvii frequens. Caeterum neque in Sibiria, neque hic in Ingria usquam observata est. Floret Julio. 2 Пузырникъ ягодный. Russ. Sobol.

288. CUCUBALUS BEHEN. Calycibus subglobofis glabris, reticulato-venosis, corollis subnudis. (Calyces venis viginti, capsulae sexvalves, pleurumquae.) (G.) Flor. dan. t. 857.

Habitat inter segetes et in pratis sylvosis Pargelovii, tum Petropoli in insulis apothecaria, lapidea et petri. Floret Junio, Julio. 2 Пузырникъ гладкій. Russ. Sobol.

289. CUCUBALUS TATARICUS. Petalis bipartitis, floribus secundis decumbentibus, pedunculis oppositis solitariis erectis, caule simplicissimo. (Folia lanceolata, in eriora petiolata, superiora sessilia et amplexicaula. Calyx uno latere purpurascens.) (G.)

Habitat in ripa septentrionali et elatiori Nevae fluvii supra pagum Ostrovki dictum, et in ripa meridionali circa pagum Ribaczia. Floret Junio, Julio. 2 Пузырникъ яматарскій. Russ. Sobol.

SILENE. Calyx ventricosus. Petala quinque unguiculata, saepe bifida, ad faucem coronata denticulis duobus. Capsula uni-five trilocularis.

290. SILENE NOCTIFLORA. Petalis bifidis, calycibus decemangularibus, dentibus tubum aequantibus, caule dichotomo. (Capsula unilocularis.) (R.) Cam. hort. t. 34.

Habitat circa Petropolim in sylvis montosis. Floret Junio, Julio. ☉ Смолянка ночноцвѣтная. Russ. Sobol.

291. **SILENE ACAULIS.** Acaulis depresso petalis emarginatis, capsula cylindrica. (Foliis tenuissime spinulosis, calycibus decagonis glabris fusco-rubris. Dentibus calycinis margine albidis.) (G.) Flor. dan. t. 21.

Habitat in summitate montis Duderovii, et circa Crasnofelium. Floret Iunio, Iulio. 2 Смo-
лянка безстебельная. Russ. Sobol.

STELLARIA. Calyx pentaphyllus patens. Petala quinque ut plurimum bipartita. Capsula unilocularis polysperma.

292. **STELLARIA NEMORUM.** Foliis cordatis petiolatis, panícula pedunculis ramosis. (Stolonibus reptantibus radicanibus, pedunculis dichotomis folitariis, petalis albis. Variat caulibus filiformibus, procumbentibus erectisque, internodiis rubris, petalis bifidis.) (G.) Flor. dan. t. 271.

Ad ripas umbrosas Nevae fluvii in insulis, apothecaria, lapidea et in nemoribus frequentissima est. Floret Iunio. 2 Жвззочница лбсная.
Sobol.

293. **STELLARIA HOLOSTEA.** Foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bifidis. (Semibifidis, foliis plerumque lineari-lanceolatis, glabris, glaucis.) (G.) Flor. dan. t. 698.

Habitat ubique in sylvis humidioribus. Floret Majo, Iunio. 2 Звззочница мягкая. Russ.
Sobol.

294. *STELLARIA GRAMINEA*. Foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. (G.) Mill. illustr. ic.

In fruticetis et dumetis ubique intra hupnum et Polytrichum frequens occurrit. Floret Majo, Junio. 2 Звѣздочница правнистая. Russ. Sobol.

295. *STELLARIA CRASSIFOLIA*. Foliis ovato-lanceolatis crassiusculis, pedunculis unifloris ex dichotomia caulis, floribus erectis: corolla calycem superante, capsulis reflexis. (R. Sob.) Erhart Hannöv. Mag. 1784. n. 8. p. 117.

Occurrit in monte Pulcovo et in sylvis circa Petropolim, rarius. Floret Majo, Junio. Durationis incertae. Звѣздочница толстолистная. Russ. Sobol.

296. *STELLARIA DILLENIANA*. Foliis linearilanceolatis, caule flaccido, pedunculis terminalibus bifloris. (Sob.) Moenc. fl. haff. n. 364.

Habitat in pratis humidis sylvosis. Floret Junio. 2 Звѣздочница дилленіева. Russ. Sobol.

ARENARIA. Calyx pentaphyllus patens. Petala quinque integra. Capsula unilocularis, tri- aut sexvalvis, apice dehiscens, polysperma.

297. *ARENARIA PEPLOIDES*. Foliis ovatis acutis carnofis. (Glandulae in receptaculo.) (G.) Flor. dan. t. 624.

In ripis arenosis circa Strelina et Oranienbaum, frequens est. Floret Majo, Junio. 2 Пѣщанка остролистная. Russ. Sobol.

298. **ARENARIA TRINERVIA.** Foliis ovatis nervosis petiolatis. (G.) Flor. dan. t. 329.

In sylvis humidis frequens occurrit. Floret Majo, Junio. ☉ Пѣщанка трижилыстая. Russ. Sobol.

299. **ARENARIA SERPYLLIFOLIA.** Foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. (Tota villis hispida, ramosissima, capsula basi pentagona.) (Folia subconnata luci obversa punctata.) (G.) Curtis fl. Londin. fasc. 45.

Habitat in arvis ficcis et ad vias, uti ad viam regiam prope Strelina. Floret Junio, Julio, Augusto. ☉. Пѣщанка точколыстая. Russ. Sobol.

300. **ARENARIA RUBRA.** Foliis filiformibus oppositis internodiis duplo brevioribus, caulibus prostratis, calycibus capsulis aequalibus. (G.) Loes. fl. pruss. t. 63.

In ripis arenosis Nevae fluvii et ad margines sylvarum in montosis uti Pargelovii, in monte Poclonnaja atque Petropoli in ambulacris hortorum saepius occurrit. Floret Junio, Julio. ☉ Пѣщанка красная. Russ. Sobol.

P E N T A G Y N I A.

SEDUM. Calyx quinquefidus. Corolla monopetala aut pentapetala. Squamae nectariferae quinque ad basin germinis. Capsulae quinque, discretae, leguminosae introrsum dehiscentes.

301. **SEDUM TELEPHIUM.** Foliis planiusculis ferratis, corymbo folioso, caule erecto. (Folia ovata; corymbus ternus, trifido-ramosus.) (G.) Flor. dan. t. 686.

Habitat in pratis circa Catharinenhoff, et in montosis Pargelovii, Ofinova Roschca, atque in monte Pulcovo, aliisque in locis ficcis arenosis. Floret Iunio, Augusto. 2/ Заячая капуста. Russ.

302. SEDUM ACRE. Foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. (Foliis sparsis ovatis inferioribus minoribus, cyma bifida. Sapore equidem haud acre. Folia in ramis junioribus congesta.) (G.) Knoz del. hort. 2. t. S. 12. f. 1.

In montosis arenosis, ubique uti in monte Poclonnaja, Pulcovo, Pargelovii, et in pratis ficcis insulae lapideae aliarumque vulgaris planta est. Floret Iunio, Iulio. 2/ Молодило. Russ.

OXALIS. Calyx profunde quinquepartitus. Petala quinque unguibus connexa, subcampanulata, saepius contorta. Filamenta interdum in cylindrum connata, quinque longiora externe dente erecto. Capsula quinquevalvis. pentagona, angulis dehiscens.

303. OXALIS ACETOSELLA. Foliis ternatis obcordatis pilosis, scapis unifloris. Acaulis. (Radix squamosa articulata; petala alba macula flava ad unguem.) (G.) Zorn pl. med. ic. t. 9.

In sylvis umbrosis subhumidis ubivis frequens est. uti in insulis apothecaria, lapidea et basileensi. Floret Aprili, Maio, et Iunio. 2/ Кислица щевельная. Russ. Sobol.

AGROSTEMMA. Calyx monophyllus, coriaceus, tubulosus, quinque dentatus. Petala quinque un-

guiculata; limbo obtuso, patente, plerumque indiviso. Capsula unilocularis, quinquevalvis. Receptacula libera tot, quot femina, interiora gradatim longiora.

304. AGROSTEMMA GITHAGO. Hirsuta, calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis. (Dentes calycini corolla longiores.) (G.) Curtis fl. Londin. t. 209.

Inter segetes circa Ligovo et ubique vulgaris planta est. Floret Iunio. ☉ Куколь. Russ.

LYCHNIS. Calyx monophyllus oblongus membranaceus, quinquedentatus, laevis. Petala quinque, unguiculata; limbo ut plurimum, fisso; fauce (saepius) coronata. Capsula uni-tri-seu quinquelocularis, quinquevalvis, subovata.

305. LYCHNIS FLOS CUCULI. Petalis quadrididis, fructu subrotundo. (Foliis apicibus rubellis, petalis roseis. Capsula unilocularis quinquedentata.) (G.) Fl. dan. t. 590.

Habitat in pratis humidis circa Crafnoje felo, et passim. Floret Iunio, Iulio. 2 Дрема. Russ. Дрема Кокушкина. Sobol.

306. LYCHNIS VISCARIA. Petalis subintegris, Capsula quinqueloculari. (Petalis rubris, caule ad geniculos viscidos rubro.) (G.) Flor. dan. t. 1082.

Crescit ubique in pratis montanis sylvosis, uti in insulis apothecaria, Lapidea, et montibus Poclonnaja et Pulcovo. Floret Iunio, Iulio. 2 Смолевка. Russ. Дрема смолистая. Sobol.

307. **LYCHNIS DIOICA.** Floribus dioicis. (Squamis quinque in faemina. Capsula unilocularis. Variat flore rubro.) (G.) Fl. dan. t. 792.

Habitat pratis et cultis ubique, varietas rubra occurrit in Strelina ad margines sylvarum. Floret Majo. Iunio. 2 Дрема двудомная. Russ. Sobol.

CERASTIUM. Calyx pentaphyllus. Petala bifida. Capsula unilocularis, apice dehiscens decemdentata.

308. **CERASTIUM VULGATUM.** Foliis ovatis, petalis calyci aequalibus, caulibus diffusis. (G.) Curtis Flor. Londin. t. 130.

Crescit parce ad vias, in agris et hortis Petropoli. Floret Majo, Iunio. ☉ Роговикъ. Russ. Роговикъ обыкновенный. Sobol.

309. **CERASTIUM VISCOSUM.** Erectum, villosiflosum. (B.) Curtis Fl. Londin. t. 79.

Occurrit rarius circa Petropolim ad agrorum limites, et vias, uti in Ligovo, et Goreloy cabac. Floret Majo. ☉ Роговикъ клейкий. Russ. Sobol.

310. **CERASTIUM SEMIDECANDRUM.** Floribus pentandris, petalis integris, (profunde emarginatis, calyce brevioribus.) (Caespitosum parvum subviscosum, foliis ovatis cauli adpressis, calycibus conicis ut plurimum clausis. Variat staminibus quinque et decem; in posteriori casu quinque prius apparent, his effoetis quinque alia observantur.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 122-

In insulis apothecaria, basileensi et ubique ad ductus aquarum et in pratis copiose provenit.

Floret Majo, Junio. ☉ роговикъ полудесятиный.
Russ. Sobol.

311. CERASTIUM AQUATICUM. Foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, capsulis pendulis, obtuse septangulis. Affinis stellariae nemorum. (Caulis diffusus decumbens, flaccidus, apice viscosus. Folia undulata. Flores gemini, petalis lineis prominentibus. Capsula inflata quinque-valvis; valvulae reflexae bifidae. Variat stylis quatuor aut quinque.) (Sob.R.) Curt. fl. Lond. t. 130.

Habitat in humidis circa Petropolim, uti ad ripas lacuum Pargelovii, et Ofinovae Roschskae, circa Sarfcoselium in sylvis et in locis similibus. Floret Junio, Julio. ☿ роговикъ водяной Russ. Sobol.

SPERGULA. Calyx pentaphyllus. Petala quinque integra. Capsula ovata, unilocularis, quinquevalvis. Semina margine emarginato cincta.

312. SPERGULA ARVENSIS. Foliis verticillatis, floribus decandris. (Foliis nitidis teretiusculis, panicula laxa dichotoma, stamina quinque aut decem.) (G.) Flor. dan. t. 1033.

In arvis et hortis oleraceis ac locis arenosis frequens. Floret Junio. ☉ шорица. Russ. шорица полевая. Sobol.

313. SPERGULA NODOSA. Foliis oppositis subulatis laevibus, caulibus simplicibus, (unifloris, petalis albis, stylis tribus aut quatuor.) (G.) Flor. dan. t. 96.

Habitat in pratis montosis, uti in monte Pulcovo Pargelovii, et ad radices montis Duderovii, cir-

ca urbem, Sophiam et Gatzinam, atque ad ripam fluvii Ochtae prope fabricam pyriam. Floret Junio, Julio. 2 торица узловатая. Russ. Sobol.

314. SPERGULA LARICINA. Foliis oppositis subulatis ciliatis fasciculatis. (Folia rigida, setacea, basi connata ciliata. Corolla nivea, magnitudine stellariae Holosteeae, pedunculi filiformes. Stamina decem: quorum quinque breviora.) (Sob.) Flor. dan. t. 858.

Habitat circa Petropolim in pratis humidis argillofis duris, uti prope Ligovo, Goreloy cabac, et in urbe circa Nosocomium terrestre et maritimum. Floret Junio, Julio. 2 Торица лишвенничная. Russ. Sobol.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA

MONOGYNIA.

ASARUM. Calyx superus trifidus aut quadrifidus, coloratus laciniis apice inflexis. Corolla nulla. Filamenta duodecim. Capsula coronata, coriacea sub sexlocularis evalvis, dissepimentis ad axim solutis.

315. ASARUM EUROPAEUM. Foliis reniformibus obtusis binis. (Hexagyna, pedunculo unifloro nudo inter petiolos binos.) (G.) Flor. dan. t. 633. Asarum officin.

Habitat in fylvis circa Sarcofelium, in monte pulcovo et Duderovo, et ad fluvium Wolchow. Floret Majo. 2 Поддѣсникъ five копышень. Russ. Копышень поддѣсный. Sobol.

LYTHRUM. Calyx sex-aut duodecim fidus, striatus, denticulis alternis minoribus. Corolla hexapetala, petalis calycis incisuris insertis. Filamenta sex aut duodecim. Capsula bilocularis tecta polysperma.

316. **LYTHRUM SALICARIA.** Foliis cordato-lanceolatis, oppositis floribus spicatis dodecandris, (verticillis sub octodecimfloris, capsula triloculari.) (G.) Flor. dan. t. 671. Lyfimachia purpurea, officin.

Crescit copiose in paludibus Catharinhoffii, et ad fossas passim. Floret Junio, Julio. 2 Вербовникъ, five плакунъ. Russ. Плакунъ вербовный. Sobol.

D I G Y N I A.

AGRIMONIA. Calyx quinquedentatus, superus, altero calyce obvallatus. Corolla pentapetala. Filamenta septem, aut duodecim. Semina duo in fundo calycis indurati pericarpii loco.

317. **AGRIMONIA EVPATORIA.** Foliis caulinis pinnatis, ferratis: impari petiolato, fructibus hispидis. (Fructibus decemfulcatis, fetis uncinatis erectis.) (G.) Flor. dan. t. 588.

Habitat in Strelina ad margines fylvarum, sed non admodum frequens in aliis locis occurrit: frequentissima est in monte Duderovo. Floret

Julio, Augusto. 2/ Variet. ^β Odorata, ibidem occurrit. Репникъ. Russ. five Репешникъ, five кошка, репникъ благовонный. Sob.

TRIGYNIA.

EUPHORBIA. Calyx monophyllus ventricosus, ore quadridentato aut quinquedentato. Corolla petalis quatuor vel quinque, calyci alternatim impositis, crassis, truncatis. Stamina decem ad viginti quinque. Germine pedicellato. Capsula tricocca, triloculari.

318. **EUPHORBIA PEPLUS.** Umbella trifida, dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis, (Petala bicornia lunata, ciliata. Capsulae trigonae: anguli rugosi margine quasi dehiscentes.) (G.) Bulliard herb. Franc. t. 79.

Habitat in locis cultis passim, et circa montem Duderovium. Floret Iunio, Julio, et Augusto.

⊙ Волчье молоко. Russ. Едкомлечникъ плащевый. Sobol.

319. **EUPHORBIA HELIOSCOPIA.** Umbella quinquefida, trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ferratis. (Petalis integris fusco-viridibus, fructibus laevibus.) (G.) Flor. dan. t. 726.

Habitat passim inter segetes praecipue circa govo, et Pulcovo. 2/ Едкомлечникъ со-
ный. Russ. Sobol.

320. **EUPHORBIA PALUSTRIS.** Umbel-
fida, subtrifida, bifida, involucellis ovatis

lanceolatis, ramis sterilibus. (Radice tuberosa, cruribus longissimis, caulibus erectis, ascendendo hirsutis, flore centrali pentapetalo sterili, reliquis tetrapetalis obtusissimis, integris, calyce pilis albis, stamina lutea, Capsula verrucosa. Lac. acre.) (G.) Flor. dan. t. 866. Esula, officinarum.

Habitat in pratis paludosis insulae lapideae ad ripam occidentalem fluvii, et circa montem Duderovium, atque in pratis prope urbem Narvam Floret Junio, Julio. 24 Едкомлечникъ болотный. Russ. Sobol.

D O D E C A G Y N I A.

SEMPERVIVUM. Calyx sex partitus aut duodecim partitus. Petala sex ad duodecim. Stamina sex ad duodecim. Germinibus sex ad duodecim, capsulis totidem in orbem positis leguminosis introrsum dehiscentibus.

321. **SEMPERVIVUM TECTORUM.** Foliis ciliatis, propaginibus patentibus. (G.) Curtis flor. Londin. t. 160. Sempervivum majus, officin.

Circa ostium pristannoj rutchej in Lugam fluentis ad radicem collis magna copia crescit. Floret Julio, Augusto. 24 Дикой чеснокъ .Russ. живучка кровельная. Sobol.

C L A S S I S XII.

I C O S A N D R I A

M O N O G Y N I A.

PRUNUS. Calyx quinquefidus, inferus. Petala quinque. Stamina viginti ad triginta. Drupae unilocularis superne clausae nux futuris prominulis.

322. **PRUNUS PADUS.** Floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis. (Arbor cortice rubente fusco, foliis venis atris, floribus odoratissimis, fructus pulpa viridis officulo pedunculato, semine sapore perfici.) (G.) Flor. dan. t. 205.

Habitat in insulis, lapidea, cruris, rotunda, et ubivis in sylvis. Floret. Majo, Junio. † Черемха. Russ.

D I G Y N I A.

CRATAEGUS. Calyx superus quinquefidus. Corolla pentapetala. Stamina viginti. Bacca carnosa infera umbilicata monosperma aut polysperma, unilocularis.

323. **CRATAEGUS OXYACANTHA.** Foliis obtusis subtrifidis ferratis. (Foliis venis nervisque notabilioribus villosis, superne obsolete trilobis, calycis laciniis nunquam reflexis. Stylus interdum

unus. Numerus styliorum et feminum duo ad quatuor.) (Sob.) Flor. dan. t. 634.

Habitat in sylvis ad fluvium Lugam ꙗ Боярешникъ Russ.

T R I G Y N I A.

SORBUS. Calyx superus quinquefidus. Petala quinque. Stamina viginti. Bacca infera, superne aperta, tri-vel quinque locularis, tri-aut pentasperma.

324. **SORBUS AUCUPARIA.** Foliis pinnatis utrinque glabris. (Arbor frondosa. Calyx laciniis quinque carnofis, flores racemosi subumbellati, albi, petalis patentissimis, fructus ruberrimi minimi, pomiformes, pentaspermi.) (G.) Flor. dan. t. 1034.

Habitat passim in sylvis. Floret Junio. ꙗ рябина. Russ. рябина ппичничья. Sobol.

P E N T A G Y N I A.

PYRUS. Calyx quinquefidus, superus. petala quinque. Stamina viginti. pomum inferum quinqueloculare polyspermum.

325. **PYRUS MALUS.** Foliis serratis, umbellis sessilibus, unguibus calyce brevioribus. Styliis glabris. (pedunculis brevioribus, calyce magis prominente, fructu sphaerico quinqueloculari.) (Sob.) Blackw. herb. t. 178.

Habitat in sylvis vicinis circulo Careliensi. Floret Majo, Junio: ꙗ Яблонь. Russ. Яблонь дикая. Sob.

SPIRAEA. Calyx quinquefidus, inferus. Petala quinque. Stamina viginti et ultra. Capsulae polyspermae quatuor vel plures, uniloculares, bivalves. Semina futurae internae affixa.

326. **SPIRAEA FILIPENDULA.** Herbacea, foliis interrupte-pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis interrupte serratis, glaberrimis, floribus cymosis, (odoratis, albis, maculis sanguineis, interdum hexapetalis, calyce reflexo, stamina quatuordecim ad quinquaginta.) (Sob.) Flor. dan. t. 635. Filipendula, officin.

Crescit in pratis circa Lugam fluvium. Floret Julio. 24. Таволга нишковислая. Russ. Sobol.

327. **SPIRAEA ULMARIA.** Herbacea foliis interrupte pinnatis, foliolis ovatis biferratis subtus canis, floribus cymosis, (odoratis, puris, reflexis. Stamina triginta. Capsulis contortis. Foliis subftipulatis.) (G.) Flor. dan. t. 547. Ulmaria, officin.

Habitat passim in sylvis umbrosis humidis praefertim ad ripas Nevae fluvii, in insula apothecaria, lapidea et ubique. Floret Junio, Julio. 24 Царица луговъ. Russ. Таволга илемная. Sob.

POLIGYNIA.

ROSA. Calyx quinquefidus, urceolatus, carnosus, collo coarctatus, demum baccatus, coloratus. Petala quinque. Antrum, five Bacca duplicata unilocularis superne aperta, pericarpis ossibus intus nidulantibus. Semina copiosa, hispida, calycis interiori lateri affixa.

328. ROSA SPINOSISSIMA. Germinibus globosis glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatissimis. (Foliolis novem acute ferratis, spinulis rubescentibus, pedunculis germinibusque carmesinis concoloribus, calycibus indivisis coloratis, flore rubello. Variat petalis albis, odorata.) (G.) Flor. dan. t. 398.

Habitat in montosis et locis apricis sylvestribus, uti in monte duderovo, et Pargelovii. Floret Julio. Шиповникъ колючій. Russ. Sobol.

329. ROSA CANINA. Germinibus ovatis pedunculis que glabris, caule petiolisque aculeatis. (Calycibus femipinnatis, bracteis duabus oppositis ciliatis, petalis bilobis, niveis, carneis, rubris odoratis. Variat pedunculis unifloris et bifloris, calycibus ovatis et subglobosis.) (Sob.) Flor. dan. t. 555. Rosa canina. officin.

Habitat in sylvis montosis circa jamburgum et in monte Duderovo. Floret Junio, Julio. Шиповникъ проспый. Russ. Sobol.

RUBUS. Calyx quinquesidus Corolla pentapetala. Drupae congregatae uniloculares, receptaculo conico baccanti superimpositae.

330. RUBUS IDAEUS. Foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. (Costa plerumque inermi, foliis subtus albis. Stamina sexaginta, fructu rubro et villoso.) (G.) Flor. dan. t. 788. Rubus idaeus, officin.

Ubique insylvis prope urbem Petropolim copiosissime provenit: uti Catharinhofii, in insulis, apothecaria et Lapidea et Cameanoj Nos; atque in

monte poclonnaja. Floret Majo, Iunio. ♂ Малина. Russ. Variat fructu albo, in hortis. Малина бѣлая. Russ.

331. RUBUS FRUCTICOSUS. Foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis, (spinosissimis, floribus racemosis, calyce reflexo, bacca nigra, acinis quatuordecim.) (G.) Regn. bot. t. 394.

Habitat in sylvis humidis umbrosis, ad viam Wiburgensem in monte poclonnaja, in Ofinova Roszczu, et prope Narvam. Floret Iunio, Iulio. ♀ Ежевика. Russ.

332. RUBUS SAXATILIS. Foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis. (Staminibus triginta, aut quadraginta. Foliis rugosis, obovatis, inaequaliter ferratis, non in canis. Flores leviter odorati; fructus aciduli.) Flor. dan. t. 134.

In sylvis copiose provenit, uti in insulis, apothecaria, lapidea, et passim. Floret Iunio. ♀ Каменика, sive Костяница. Russ.

333. RUBUS ARCTICUS. Foliis ternatis, caule inermi unifloro. (Flore purpureo, fructu rubro.) (G.) Flor. dan. t. 468. Rubus arcticus, officin.

Habitat in insula apothecaria, prope cimiterium, et in sylvis humidis passim inter Petropolim et Peterhovium, atque ad viam Wiburgensem, Floret Iunio. ♀ Княжница. Russ.

334. RUBUS CHAMAEMORUS. Foliis simplicibus lobatis, caule inermi unifloro, floribus dioicis. (Herba dioica, vel Radix Maris et feminae unita subterra in monoica.) (G.) Flor. dan. t. 1. Chamaemorus, officio.

Crescit in fylvis paludosis, circa pagum Murinam, nec non Monasterium Newskoj, et Ozerki, et passim, fatis copiose. Floret Iunio. 24 Моршкa. Russ.

FRAGARIA. Calyx decemfidus, laciniis alternis exterioribus minoribus reflexis. Petala quinque. Stamina viginti in ordine uno disposita, Semina nuda glabra, Receptaculo ovato baccanti, decido, colorato, superimposita.

335. **FRAGARIA VESCA.** Foliis omnibus ternatis, flagellis reptantibus. (G.) Knorr. del. hort. 1. t. E. 1. Fragaria, officin.

Crescit in fylvis Sterilibus, et montosis passim. Floret Majo, Iunio. 24 Земляника. Russ.

POTENTILLA. Calyx decemfidus, laciniis alternis minoribus reflexis. Petala quinque. Stamina viginti. Semina subrotunda nuda, rugosa, receptaculo parvo exsucco fungoso, tuberculato affixa.

336. **POTENTILLA ANSERINA.** Foliis pinnatis ferratis, caule repente, pedunculis unifloris. (Folia interrupte pinnata, subtus alba, stolonones repentes rubri.) (G.) Flor. dan. t. 544.

In pratis et ad vias nihil frequentius est. Floret Iunio, Iulio. 24 Гусиная трава. Russ. Могушикъ Гусоный. Sobol.

337. **POTENTILLA ARGENTEA.** Foliis quinatis cuneiformibus incisus subtus tomentosus, caule erecto. (Caule firmo decumbente saepius, petalis sulphureis exiguis.) (G.) Flor. dan. t. 865.

Habitat in montosis ficcis fabulosis; in monte Poconnaja, Pulcova, et in insula lapidea, aliisque in locis similibus. Floret Junio, Julio. 24 Серебреникъ feu. пятилистникъ. Russ. Могущикъ серебряный. Sobol.

338. *POTENTILLA REPTANS*. Foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. (Radiculis ex geniculis, floribus luteis.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 29. Quinquefolium, officin.

Ad ductus aquarum circa viam Peterhavianam frequens est. Floret Junio, Julio. 24 Могущикъ пятилистный. Russ. Sobol.

339. *POTENTILLA NORVEGICA*. Foliis ternatis, caule dichotomo, pedunculis axillaribus. (F. Sob.) Flor. dan. t. 171.

Habitat in sylvis prope Sarfcoje felo, Pargelovii, in Murina et Ofinova Roschca, tum Petropoli in hortis oleraceis et ruderatis. Floret Junio, Julio. ☉ Могущикъ норвежский. Russ. Sobol.

TORMENTILLA. Calyx octofidus, laciniis exterioribus minoribus obcordatis. Petala quatuor. Stamina sexdecim, Semina octo subrotunda, nuda, receptaculo parvo exfusco affixa.

340. *TORMENTILLA ERECTA*. Caule erectiusculo, foliis sessilibus, (quinatis, radicalibus longopetiolatis, ternatis.) (G.) Flor. dan. t. 598. Tormentilla officin.

Habitat in pratis apricis sylvosis satis copiose, uti in regione Wiburgensi ultra Nofocomia, circa cimiterium Sti Iohannis, in insula apothecaria,

et passim. Floret Junio, Julio. 2 Завязной корень. Russ. Завязникъ стоячій. Sobol.

GEUM. Calyx decemfidus laciniis exterioribus minimis. Petala quinque, stamina viginti. Styli terminales. Semina arista geniculata. Receptaculum columnare, calyci reflexo impositum.

341. **GEUM URBANUM.** Floribus erectis, fructibus globosis villosis, aristis uncinatis nudis, foliis lyratis, (pinnis rhomboideis, flore luteo.) (G.) Flor. dan. t. 672. Caryophyllata, officin.

Habitat in sylvis umbrosis circa fabricam pyriam Ochtensem, in Strelina, ad viam Peterhovianam et passim. Floret Junio. 2 Гравилапъ s. Гребенникъ. Russ. Гвоздичникъ аптекарскій. Sobol.

342. **GEUM RIVALE.** Floribus nutantibus, fructu oblongo, aristis plumosis tortis. (Folia pinnis frequentioribus, extrema semitrifida, calyce profunde partito lanuginoso purpureo, petalis rubris, lineis sanguineis interne. Stamina nonaginta quinque.) (G.) Flor. dan. t. 722.

Habitat in pratis humidis et ripis Nevae fluvii, in insulis apothecaria, lapidea, Samennoy Nos et ad ductus aquarum passim. Floret Majo, Junio. 2 Гравилапъ, seu Гребенникъ. Russ. Гравилапъ ручейный. Sobol.

COMARUM. Calyx decemfidus, persistens, laciniis alternis inferioribus minoribus coloratis. Petala quinque calyce minora. Semina nuda glabra. Receptaculum carnosum, globosum, villosum, persistens.

343. **COMARUM PALUSTRE.** Foliis pinnatis, petalis calyce minoribus. (Caulibus prostratis erectis que, foliis hirsutis, petalis calyce odorato minoribus rubris, staminibus viginti rubris.) (G.) Flor. dan. t. 686.

Habitat in paludibus frequens. Floret Iunio. 2/ Сабельникъ раменный. Russ. Пяшилистникъ болотный. Sobol.

C L A S S I S XIII.

P O L Y A N D R I A

M O N O G Y N I A.

ACTAEA. Calyx tetraphyllus. Stamina viginti ad triginta. Bacca unilocularis unifulca. Semina femiorbiculata, ordine gemino.

344. **ACTAEA SPICATA.** Racemo ovato, fructibus baccatis. (Foliis duplicato-pinnatis, serratis, pinnula extrema biloba. Calyx lacteus, purpura coloratus. Corollae petala nivea, ligulata, stigma oblique depresso, bacca globosa coriacea.) (G.) Flor. dan. t. 498. Christophoriana officin.

Habitat in monte Pulcovo, et Duderovo, atque in aliis sylvis umbrosis montosis. Floret Majo, Iunio. 2/ Воронежъ, five Христофорова шрава. Russ.

CHELIDONIUM. Calyx monophyllus. Stamina triginta. Siliqua unilocularis, cylindracea, subbi-

valvis. Receptaculum lineare inter valvas futurae instar circumambientis fenestrale, feminibus hilo auctis repletum.

345. CHELIDONIUM MAJUS. Pedunculis umbellatis. (Siliqua matura nodosa unilocularis, brevissima, caule piloso.) (G.) Flor. dan. t. 542. Variat foliis quernis. Flor. dan. t. 676. Chelidonium majus, officin.

In ruderatis et cultis Petropoli, et in sylvis humidis Strelinae, ad Staraja Ladoga alibique copiose provenit. Floret Junio, Julio. Чистякъ, sive Чистотѣлъ большой. Russ.

PAPAVER. Calyx diphyllus. Corolla tetrapetala. Stigma peltatum, radiatum, crenatum. Capsula submultilocularis, sub stigmate persistente poris dehiscens. Stylus nullus. (Pori dehiscentes, in Pap. somnifero.)

346. PAPAVER SOMNIFERUM. Varietas, effluens. Capsulis globosis glabris minoribus, poris dehiscentibus majoribus, floribus albis, semine nigro. (Sob.)

Habitat spontaneum in hortis oleraceis, tum praecipue in hortis ruralibus et ad segetes prope Goreloy cabac, et Ribaczja, et in pluribus aliis locis. Floret Julio. ☉ Макъ бѣгунъ. Russ. (Sob.) ita vocatur, quia semina ejus cito e capsula effluunt, unde colligi nequeunt, vel raro.

NYMPHAEA. Calix tetra- aut pentaphyllus, inferus magnus, supra coloratus. Filamenta septuaginta saepe. Stigma peltato-sessile. Bacca multilocu-

laris (10-15 locularis) truncata, coronata, corticosa, polysperma.

347. NYMPHAEA LUTEA. Foliis cordatis integerrimis, calyce pentaphyllo majore. (Fructu pyriformi.) (G.) Flor. dan. t. 603.

In stagnis paludosis et fluviis lente currentibus copiose provenit, et in insula apothecaria atque lapidea, et Catharinhoffii occurrit passim. Floret Junio, Julio. ♀ Кушинчики. Russ. кушинчикъ желмый. Sobol.

348. NYMPHAEA ALBA. Foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. (Fructus globosi, flores saepius pleni.) (G.) Flor. dan. t. 602. Nymphaea officin.

Habitat in aquis stagnantibus cum praecedente. Floret eodem tempore. ♀ Кушинчикъ бѣлый. Russ. Sobol.

TILIA. Calyx quinquepartitus deciduus. Corolla pentapetala. Stamina triginta et ultra. Bacca five capsula globosa, quinquelocularis, corticosa, quinquevalvis, basi dehiscens.

349. TILIA EUROPAEA. Floribus nectario deftitutis, baccis quadrilocularibus. (Foliis cordatis, ferratis acuminatis.) (G.) Flor. dan. t. 553. Tilia officin.

Habitat ad fluvium Lugam, et passim in sylvis. Floret Iunio, Iulio. ♀ Липа. Russ. Липа Европейская. Sob.

CISTUS. Calyx pentaphyllus, foliolis duobus alternis inferioribus minoribus. Capsula unilocularis vel decemlocularis, trivalvis aut decemvalvis.

350. **CISTUS HELIANTHEMUM.** Caulis procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis. (Caulis longi rubentes. Calyx venis fanguineis, stipulis calyce longioribus.) (G.) Fl. dan. t. 101. Observ. si filamenta basi irritentur, in primis tempore matutino seu aëre humido, mox ad petala se reclinant tanta vi, ut antherae pistillo superfedeant.

Habitat in collibus circa urbem Gatzinam, et in Kojrova. Floret Iunio, Iulio. † Буда. Russ. Буда солнцѣвѣшная. Sobol.

TRIGYNIA.

DELPHINIUM. Calyx nullus. Corolla pentapetala, aut hexapetala, supremo cornu coronato. Nectarium bifidum, pone cornutum. Stamina quindecim ad triginta. Capsulae leguminosae subternae, receptaculo communi affixae introrsum dehiscentes, polyspermae.

351. **DELPHINIUM CONSOLIDA.** Nectariis monophyllis, caule subdiviso. (Flore caeruleo, interdum albo.) (G.) Fl. dan. t. 683. Consolida regalis, officin.

Habitat in agris inter segetes, uti in Ligova, et Crafnoje felo. Floret Iunio, Iulio. ⊙ Кавалерскіе шпоры. Russ.

ACONITUM. Calyx nullus. Petala quinque, supremo galea fornicato, lateribus conniventibus: nectariis duobus pedunculatis, reconditis, recurvis, squamulis sex. Capsulae leguminosae tres aut quinque, receptaculo communi affixae, introrsum dehiscentes. Seminibus arido-baccatis.

352. **ACONITUM LYCOCTONUM.** Foliis villosis palmatis multifidis, laciniis brevibus obtusifusculis, nectariis rectiusculis. (Foliis glabris, variis, laciniis lanceolatis, petalo supremo apice dilatato, cylindraceo, flore luteo vel ochroleuco. Stamina viginti sex.) (G.) Jacqu. Fl. austr. 4. t. 380. Variat flore caerulefcente.

Habitat ad fluvium Wolchow fugra pagum Czertovo. Floret Julio. 2 Волчій корень. Russ. Волкобой. Sobol.

P E N T A G Y N I A.

AQUILEGIA. Calyx nullus. Petala quinque. Nectaria quinque inferne corniculata intra petala. Stamina triginta ad quadriginta. Paleae decem germen involventes. Capsulae quinque leguminolae, receptaculo communi affixae, introrsum dehiscentes.

353. **AQUILEGIA VULGARIS.** Nectariis incurvis, petalo subaequalibus, caule folioso multifloro, foliolis omnibus petiolatis. (Lobis omnibus subrotundis obtusissimis divergentibus. Variat, flore simplici, pleno, caerulefcente, albo, roseo, rubro.) (Sob.) Flor. dan. t. 695.

Habitat in sylvis herbosis circa vicum Strelina, ubi dantur plures ejus varietates. Floret Junio, Julio. 2 Голубки, павлинные очки. Russ. Водосборъ обыкновенный. Sobol.

H E X A G Y N I A.

STRATIOTES. Spatha diphylla. Perianthium trifidum aut triphyllum. Petala tria. Flores inter-

dum dioici. Bacca sexlocularis, hexagona, intra spatham tecta, infera.

354. STRATIOTES ALOIDES. Foliis ensiformi-triangularibus ciliato-aculeatis. (G.) Flor. dan. t. 337.

In aquis stagnantibus Catharinhoffii et passim Floret Iunio. 2 Тѣлорѣзъ большой. Russ. Sobol.

P O L Y G Y N I A.

ANEMONE. Calyx plurimis nullus. Petala quinque ad undecim, in duobus aut tribus ordinibus. Receptaculum excavato-punctatum. Capsulae plures mucronatae aut caudatae stylum retinentes.

355. ANEMONE HEPATICA. Involucro triphylo calyciformi, foliis trilobis integerrimis. (Stamina quadraginta sex. Styli triginta sex. Variat: flore caeruleo, simplici albo et duplici.) (G. Flor. dan. t. 610. Hepatica nobilis, officin.

Habitat in monte Pulcovo, et Duderovo, ac passim in sylvis montosis fruticosis lapidosisque. Floret sub finem Aprilis, et initio Maji. 2 Трилистникъ чистой. Russ. Вѣпреница печеночная. Sob.

356. ANEMONE VERNALIS. Pedunculo involu-crato, foliis pinnatis, pinnis inciso-lobatis, scapo unifloro, hirsutissimo, flore subnutante subtus rubro caerulefcente, supra albo, hexapetalo. (B.) Flor. dan. t. 29.

Habitat in montosis circa urbem Narvam. Floret Mayo. 2 Вѣпреница весенная. Russ. Sobol.

357. ANEMONE PULSATILLA. Pedunculo involucrato, foliis bipinnatis, petalis rectis. (Flo-
re pendulo, purpureo coeruleove diluto.) (G.)
Flor. dan. t. 153. Pulsatilla officin.

Ad ostium Narovae fluvii in pineto locis aridis
copiose provenit. Floret Majo. 24 Проспръль.
Russ. Вѣшреница проспръльная. Sob.

358. ANEMONE NEMOROSA. Caule unifloro,
foliolis incisfis, seminibus acutis. (Foliis ternis ni-
tidis, incisfis petiolatis pedunculo brevioribus.
Stamina sexaginta ad octoginta; antheris et stig-
matibus albis, petalis sex albis, Seminibus sub-
tomentosis. Variat, petalis subtus purpureis.) (G.)
Flor. dan. t. 549. Ranunculus albus, officin.

Habitat ubique ad margines fylvarum et inter
frutices, atque in insulis, Basileensi, lapidea et
apothecaria frequentissima est. Floret Majo. 24
Вѣшреница лѣсная. Russ. Sobol.

359. ANEMONE RANUNCULOIDES. Caule sub-
bifloro, petalis subrotundis, foliolis incisfis, semi-
nibus acutis. (Foliis ternis incisfis subsessilibus pe-
dunculo longioribus. Petalis luteis saepius mac-
culis albis. involucro unifloro, aut trifloro. Semi-
nibus glabris.) (G.) Flor. dan. t. 140.

Habitat in monte Pulcovo et Duderovo, etiam
in fylvis insularum basileensis, lapideae, Petri,
crucis, et apothecaria, atque etiam in hortis
spontanea inter fragariam aliasque plantas. Flo-
ret Majo. 24 Вѣшреница желтая. Russ. Sobol.

THALICTRUM. Calyx nullus. Petala quatuor aut
quinque. Capsulae plures, sulcatae, rostratae,
feminiformes, monospermae.

360. **THALICTRUM ANGUSTIFOLIUM.** Foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. (Foliis interdum duplicato-pinnatis, pinnis unilobis aut bilobis, alternis trilobis, ad oras membranaceis hirsutulis, caule nudo; umbella, racemove florum ochroleucorum terminato. In umbra odorem sambucinum spargit.) (G.) Jacq. hort. vind. 3. t. 43.

Habitat in pratis humidis, in ripis umbrosis Nevæ fluvii circa Catharinhoff, in insula rotunda, et apothecaria prope fabricam pyriam, atque in multis aliis locis similibus. Floret Iunio. 24 Золотуха узколистная. Russ. Sobol.

361. **THALICTRUM FLAVUM.** Caule fulcato folioso, foliis acute trifidis, panicula multiplici erecta densa, floribus erectis. (Foliola crassiuscula, subtus venis prominentibus floribus flavis, flavescit.) (G.) Flor. dan. t. 939.

Habitat in pratis sylvestribus humidis, uti circa Sarfskoje selo, et Crasnoje selo. Floret Iunio. 24 Золотуха желтая. Russ. Sobol.

362. **THALICTRUM AQUILEGIFOLIUM.** Caule tereti, fructibus pendulis triangularibus rectis. (Foliis ad exortum et divisiones stipulis rotundatis, floribus umbellatis densissimis, petalis quatuor exalbidis valde convexis. Variat staminibus purpureo-violaceis et albis.) (G.) Jacq. Fl. aust. 4. t. 318.

Habitat in ripa umbrosa Nevæ fluvii prope Catharinhoff, tum ad fluvium Wolchow, et in sylvis umbrosis ad viam Pargeloviensem, et circa Murzincam. Floret Junio. 24 Заслица. Russ. Золотуха водосборная. Sobol.

RANUNCULUS. Calyx deciduus pentaphyllus, (rarior triphyllus.) Petala quinque, (rarius tria aut octo.) Nectarium fovea vel squamula in fingulo petalo supra ungvem. Styli nulli. Stigmata reflexa persistentia. Semina incrustata erecta.

363. **RANUNCULUS REPTANS.** Foliis linearibus, caule repente. (G.) Flor. dan. t. 108.

In ripis arenosis Nevæ fluvii circa infulas apothecariam lapideam, aliisque quæ aquis sæpe inundantur frequens occurrit. Floret Junio, Julio. Жабникъ ползучій. Russ. Sobol.

364. **RANUNCULUS FLAMMULA.** Foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. Calyx corolla flava comosus, petala integra. (G.) Flor. dan. t. 572.

In uliginosis infularum Nevæ fluvii et passim frequens occurrit. Floret Junio, Julio. Жабникъ огненный. Russ. Sobol.

365. **RANUNCULUS LINGUA.** Foliis lanceolatis, caulè erecto. (Foliis integerrimis et sessilibus, caule tomentoso, capitulis squamatis, flore magno.) (G.) Flor. dan. t. 754.

Habitat in aquis stagnantibus infulae apothecariae, tum inter urbem Pawlowskoy, et Slavjankam et circa Murzinkam in locis limosis. Floret Julio. Жабникъ язычный. Russ. Sobol.

366. **RANUNCULUS FICARIA.** Foliis cordatis angulatis petiolatis, caulè unifloro, floribus octopetalis, calyce triphylo. (Petala octo, aut novem flava, subtus striata, nectario squamula subtrifida. Stamina octodecim ad triginta sex. Sub ole-

racea.) (G.) Flor. dan. t. 499. *Chelidonium minus*, officin.

In locis uliginosis umbrosis passim. Floret Majo, Junio. 2 Чистякъ меньшій. Russ. Жабникъ чистотѣльный. Sobol.

367. *RANUNCULUS CASSUBICUS*. Foliis radicalibus subrotundocordatis crenatis, caulinis digitatis dentatis, caule multifloro. (B.)

Habitat in sylvis umbrosis circa Petropolim, et alibi. Floret Junio. 2 Жабникъ кассубскій. Russ. Sobol.

368. *RANUNCULUS AURICOMUS*. Foliis radicalibus reniformibus crenatis incisis, caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. (Folium radicale cordatum, caulina subverticillata, caule debili plerumque decumbente, flores exigui flavi, vernalis apetalis, aduktioris petalis tribus aut quinque.) (G.) Flor. dan. t. 665.

Habitat in nemoribus et pratis passim. Floret Majo, Junio. 2 Жабникъ злаповласый. Russ. Sobol.

369. *RANUNCULUS SCCELERATUS*. Foliis inferioribus palmatis, summis digitatis, fructibus oblongis. (Foliis trilobis, lobis lateralibus trifidis, sequentis crenatis, superioribus integris, calyce glabro, reflexo, flavescente, petalis ex luteo-palescentibus. Stamina duodecim, fructu abortiente. Variat: foliis apioides, lanuginosis, incisuris pluribus, floribus nitore pingui et fructibus in capitulum congestis sursum spectantibus.) (G.) Flor. dan. t. 570.

In fossis suburbiis et locis uliginosis nihil vulgatus. Floret Majo, Iunio. ☉ Жабникъ вредный: Russ. Sob.

370. RANUNCULUS BUEBOSUS. Foliis compositis, caule erecto multifloro, pedunculis sulcatis, calycibus retroflexis. (Radice simplici globosa napiformi, squamulis nectarii trigonis. Stamina sexaginta.) (B.) Flor. dan. t. 551.

Habitat in pratis et locis gramineis circa Iamburgum. Floret Majo, Iunio. ♃ Жабникъ узлокоренный. Russ. Sobol.

371. RANUNCULUS REPENS. Foliis compositis, stolonibus repentibus, pedunculis fulcatis, calycibus patulis. (Radix fasciculata, caule subdepresso, foliis maculatis trilobis glabris linea longitudinali cava, petiolis violaceis, calyce patulo glabro.) (Sob.) Flor. dan. t. 795.

Crescit ad canales et fossas, in hortisque oleraceis nimis frequens, unde eliminari vix potest. Floret Iunio, Iulio. ♃ Жабникъ стелющийся. Russ. Sobol.

372. RANUNCULUS POLYANTHEMOS. Foliis multipartitis, caule erecto, pedunculis fulcatis, calycibus patulis. (Foliorum laciniae angustae, apice callosae.) (R.) Lobel. ic. 666.

Habitat in pratis elevatis circa petropolim. Floret Iunio, Iulio. ♃ Жабникъ многоцвѣтный. Russ. Sobol.

373. RANUNCULUS ACRIS. Foliis tripartito-multifidis, summis linearibus, pedunculis teretibus, calycibus patulis. (Folia macula ab infertio-

ne petioli per venas interdum dispersa, subtus subincana, glabra, pedunculis erectis ramoso-corymbosis, calycibus patulis, petalis flavis nitidis. Stamina quadraginta octo ad quinquaginta sex. In locis pingvioribus foliis admodum latis et magis hirsutis occurrit.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 20. Ranunculus acris officin.

Habitat in pratis et fylvis infularum Nevae fluvii, et vbique vulgaris planta est. Floret Majo, Iunio. Жабникъ остросочный. Russ. Sobol.

374. RANUNCULUS ARVENSIS. Foliis superioribus decompositis linearibus, feminibus aculeatis. (Flores minimi. Stamina quatuordecim) (B.) Flor. dan. t. 219.

Habitat in arvis humidis et ad segetes circa Jamburgum. Floret Majo, Iunio. Жабникъ полевой. Russ. Sobol.

375. RANUNCULUS AQUATILIS. Foliis submersis capillaceis, emerfis peltatis. (Foliis multifidis, laciniis divergentibus, foliolis calycinis reflexis coloratis, flore albo.) (G.) Flor. dan. t. 376.

Habitat in paludibus et aquis stagnantibus infularum Apothecariae, et lapideae; nec non ad habitacula aestiva aegrotantium nosocomii pedestris, atque in ramis minoribus Nevae fluvii circa infulas. Floret Iunio. Жабникъ водяной. Russ. Sobol.

TROLLIUS. Calyx nullus. Petala quatuordecim. Nectaria novem, linearia, basi perforata. Styli nulli. Stigmata mucronata. Capsulae plurimae filiquosae, ovatae, tetraspermae, introrsum dehiscentes.

376. **TROLLIUS EVROPÆUS.** Corollis conniventibus, nectariis longitudine staminum. (Foliis radicalibus quinquefidis, segmentis lobatis, lobis acutis, petiolatis, petiolis albis; flore maturo aureo, odorato, immaturo viridi, striis rubris, petalis duplici ordine positis, supra stamina recurvatis octo, aut decem.) (G.) Flor. dan. t. 133.

Habitat passim in sylvis et pratis, in magna copia praecipue ad viam Sarcofeliensem et montem Pulcovum atque fabricam pyriam Ochtersen. Floret Majo, Junio. 2 Желтоголовъ Европейскій. Russ. Sobol.

CALTHA. Calyx nullus. Petala quinque. Germina quinque ad decem. Styli nulli. Capsulae plures polyspermae, leguminosae, stellatim patentes.

377. **CALTHA PALUSTRIS.** (Dichotoma pedunculis fulcatis petalis flavis, stamina ultra centum.) (G.) Flor. dán. t. 668.

In pratis a fluvio Neva inundatis et passim in paludibus, et locis uliginosis. Floret Majo, Junio, Julio. 2 Куролабнъ болотный. Russ. Sobol.

C L A S S I S XIV.

D I D Y N A M I A

G Y M N O S P E R M I A.

AJUGA. Corollae labium superius minimum. Stamina labio superiori longiora.

378. *AJUGA PYRAMIDALIS*. Tetragono-pyramidalis villosa, foliis oblongis dentatis, radicalibus maximis, (decussatis, inferne purpureis, plerumque tridentatohastatis, corolla caerulea, calyce concolore. Labium corollae inferius otchioides.) (Sob.) Flor. dan. t. 185. *Consolida media*, s. *Bugula officin.*

Crescit inter gramina horti imperialis aestivi, spontanea. Floret Iunio, Iulio. 24 Дубровка пирамидальная. Russ. Sobol.

MENTHA. Corolla subaequalis, quadrifida, lacinia latiore emarginata. Stamina erecta distantia.

379. *MENTHA SYLVESTRIS*. Spicis oblongis, foliis oblongis ferratis tomentosis sessilibus, staminibus corolla longioribus. (Folia admodum venosa rugosa. Calyx coloratus. Corolla ex albo caerulea. Var. β Mollissima.) (Sob.) Flor. dan. t. 484. *Mentha sylvestris*, officin.

Habitat in hortis oleraceis circa Petropolim in Jemskaja, et in vico Strelina, spontanea. Floret Iunio. 24 Мята лѣсная. Russ. Sobol.

380. *MENTHA AQUATICA*. Floribus capitatis, foliis ovatis ferratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. (Stolonibus reptantibus, caulibus coloratis, foliis saepe maculatis, corolla ex albo coerulea purpurea. Varietas β ramosissima, caule villoso ramoso: ramis patentibus, foliis subcordatis.) (G.) Flor. dan. t. 673. *Mentha aquatica*, officin.

Crescit in marginibus sylvarum aquosis, Catharinhoffii et passim. Floret Iulio. 24 Мята водяная. Russ. Sobol.

381. *MENTHA GENTILIS*. Floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ferratis, staminibus corolla brevioribus. (Caule ramoso, erecto, folio pallidore, odore Melissae calaminthae. Variat, caule rubescente glabro.) (Sob.) Flor. dan. t. 736.

Habitat in urbe Petropoli ad fossas et saepes hortorum et in Strelina alibique spontanea. Floret Augusto. 2 Мята просная. Russ. Sobol.

382. *MENTHA ARVENSIS*. Floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ferratis, staminibus corollam aequantibus, (interdum et longioribus, verticillis tomentosis, calycibus hispidis, canescentibus, squamis hirsutis lanceolatis subjectis, corolla ex albo profunde caerulea quadrifida, interdum quinquefida. Caules villosi non multum diffusi, adscendentes.) (G.) Flor. dan. t. 512.

Habitat in pratis passim et circa segetes et hortos oleraceos. Floret Julio. 2 Мята полевая. Russ. Sob,

GLECOMA. Calyx quinquefidus. Antherarum singula paria in forma crucis conniventia. (Calyce quindecim striato, labio superiore obtuso semibifido. Germinibus corolla villosa tectis.)

383. *GLECOMA HEDERACEA*. Foliis reniformibus crenatis, caulibus procumbentibus, radican-
tibus, floribus subverticillatis, involucre diphyllo. (Floribus coarctatis, labio superiore pone subcornuto. Varietas β sepium, caule elongato subscandente, foliis reniformibus glabris. γ . minor, antheris oblitteratis.) (G.) Flor. dan. t. 789. Hedera terrestris, officin.

Habitat ad fegetes Crasnoselii et passim ad sepes hortorum in hortisque. Floret Majo, Iunio. 2/ Буда Russ. Буда ползучая. Sobol.

LAMIUM. Corollae labium superius integrum, fornicatum, labium inferius obcordatum, faux utrinque dente setaceo reflexo.

384. **LAMIUM ALBUM.** Foliis cordatis acuminatis ferratis petiolatis, verticillis vigintifloris. (Caulis ramosi, folia hirsuta venis superne atris, floribus magnis albis rubrisve verticillatis in geniculis; calyx laciniis reflexis aristatis; faux dente unico; antherae basi pilosae. Variat flore purpureo labio superiore bifido.) (Sob.) Flor. dan. t. 594. Urtica mortua, seu Galeopsis, officin.

Crescit ubique in locis cultis et ad sepes hortorum. Floret Iunio, Iulio. 2/ Глухая крапива. Russ. Пчелнососка бѣлая. Sobol.

385. **LAMIUM PURPUREUM.** Foliis cordatis obtusis petiolatis. (Spica floralis pyramidalis; bracteae venosae herbido-flavae; flos exiguus albus purpureus ve hirsutus, fauce utrinque bidentatus. Omnia praecedente minora.) (G.) Flor. dan. t. 523.

Habitat inter fegetes et in hortis passim. Floret Majo, Iunio. ☉ Курячья слѣпота, five Волшебная крапива. Russ. Пчелнососка лиловая. Sobol.

386. **LAMIUM AMPLEXICAULE.** Caulibus inerribus, corollae labio inferiore bifido, foliis caulinis sessilibus rotundatis incis; radicalibus pe-

tiolatis cordato-lobatis. (Sob.) Flor. dan. t. 752.
Nunc *Pollicia amplexicaulis*.

In hortis oleraceis et locis cultis frequens est,
cum *Lamio* purpureo. Floret Iunio, Iulio. ☉
Пчелнососка круглолистая. Russ. Sobol.

GALEOPSIS. Corollae labium superius subcrenatum, inferius trifidum; faux utrinque dente obtusiusculo concavo acuta. (Calyx longe aristatus.)

387. **GALEOPSIS LADANUM.** Verticillis omnibus remotis, calycibus campanulatis pubescentibus: dentibus lineari setaceis divergentibus longioribus, (caule internodiis aequalibus, foliis lanceolato-ovatis ferratis hirsutis. Calyx dentibus tribus inferioribus majoribus aristatis; faux amplissima, galea purpurea, alba, flavicans, maculata, denticulis ad faucem maximis.) (G.)

Habitat in locis cultis, et ad margines sylvarum uti in monte Poclonnaja, Ofinova Roscha, et ad segetes passim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Куряшникъ. Russ. Куряшникъ вонючій. Sobol.

388. **GALEOPSIS TETRAHIT.** Verticillis summis subcontiguis, calycibus ventricosis, dentibus longissimis setaceis aequalibus pungentibus; (internodiis magnis coloratis; foliis cordatis ferrato-ciliatis, petiolis squamis aristatis suffultis. Calyx pilis globulo glanduloso terminatis; corolla calyce duplo-quadruplo majore, purpurea, alba, flavicans, maculata, denticulis ad faucem maximis. (G.) Rivin. monop. t. 44.

Habitat circa papos et segetes frequens. Floret Iulio, Augusto. ☉ Пѣтушьи головки. Russ. five Куряшникъ конопляный. Sobol.

389. **GALEOPSIS GALEOBDOLON.** Calycibus pungentibus, corollae labio inferiore trifido, foliis omnibus cordatis dentatis petiolatis. (Verticilli dimidiati subsexflori, (involucum tetraphyllum,) floribus flavis, labii inferioris lobo medio purpura picto, staminibus in stylum quasi concretis.) (G.) Knorr del. hort. 1. t. N. 9. n. s.

Habitat in nemoribus montosis, circa Kojrovam et in monte Poclonnaja atque Pargelovii. Floret Iunio, Iulio. 24 Курятникъ колючій. R. Sobol.

BETONICA. Calyx aristatus. Corollae labium superius erectum planum; tubus cylindricus, incurvus. Stamina longitudine faucis, (deflorata exserta.)

380. **BETONICA OFFICINALIS.** Spica interrupta, corollae galea integra, labii lacinia intermedia emarginata, calycibus glabriusculis. (Verticilli quatuordecim-flori calycibus bracteisque spinulosis, corollis purpureis horizontaliter patentibus tubo longissimo, staminibus villosis. Folia cordato-oblonga ferrato-rugosa, atro-virentia, spica foliis reflexis interrupta. Variat saepius: galea bifida et flore albo.) (G.) Flor. dan. t. 726. *Betonica*, officin.

In sylvis montosis ad fluvium Wolchow et Lugam vulgaris planta est. Floret Iunio. 24 Буквица черная. Ross.

STACHYS. Corollae labium superius fornicatum; inferius lateribus reflexum, lacinia intermedia maiore emarginata. Stamina deflorata versus latera reflexa.

391. *STACHYS SYLVATICA*. Verticillis sexfloris, foliis cordatis pctiolatis, (acuminatis, late ferratis. Calyx coloratus incurvus, dente maximo, corolla purpurea, labio inferiore lineis albis; filamenta medio villosa. Odorata.) (G.) Flor. dan. t. 1101.

Habitat in nemoribus humidis umbrosis, uti in monte Pulcovo, et Duderovo, et circa urbem Gatzinam. Floret Iunio, Iulio. ☉ Змбина права. R. Колосница лѣсная. Sobol.

392. *STACHYS PALUSTRIS*. Verticillis subsexfloris, foliis linearilanceolatis, femiamplexicaulibus, sessilibus. (Calyces sessiles, bracteis duabus coloratis, floribus albis, purpurefcentibusve.) (G.) Flor. dan. t. 1102.

Ad ripas, Nevae fluvii locis humidis, et fossas atque inter segetes passim. Floret Iunio, Iulio. ☽ Колосница болотная. Russ. Sobol.

393. *STACHYS ANNUA*. Verticillis sexfloris, foliis ovato-lanceolatis trinerviis laevibus petiolatis, caule erecto. (Folia varia, spinulis quasi ciliata, verticillis quinquefloris aut novem floris, calycis dentibus patentireflexis aristatis fere spinosis; flos ochroleucus fauce maxima, maculis purpureis. Lamii odor.) (R. Sob.) Jacq. Flor. aust. 4. t. 360.

Habitat in asperis, ficcis montanis circa Crasnofelium et in arvis circa montem Duderovum. Floret Iulio, Augusto. ☉ Колосница лѣшная. Russ. Sob.

394. *STACHYS ARVENSIS*. Verticillis sexfloris, foliis obtusis nudiusculis, corollis longitudine ca-

lycis, caule debili, corollae labio superiore integerrimo. (R. Sob.) Flor. dan. t. 587.

Habitat in arvis Ofinovae Roschczae, et circa Ligovam, sed parce. Floret Julio, Augustb. ☉ Колосница полевая. Russ. Sobol.

LEONURUS. (Corollae labium superius concavum integrum, labium inferius trifidum.) Antherae punctis nitidis adspersae. (Calyce pentagono, dentibus inferioribus longioribus; germinibus tectis corona villorum e corollae tubo nascentium.)

395. LEONURUS CARDIACA. Foliis caulinis lanceolatis trilobis. (Caules erecti ramosissimi tetragoni, folia verticillis unifloris subjecta dependentia, calyces paleis suffulti spinosis, flores ochroleuci. Stamina deflorata ad latera.) (G.) Flor. dan. t. 727. Cardiaca, officin.

In monte pulcovo, et Duderovo; ad ductum aquarum Ladogensium; atque Petropoli in rudetatis et hortis passim. Floret Julio, Augusto. 24 Сентября. сиве Львинохвостъ сердечный. Russ. Sobol.

PHLOMIS. Calyx angulatus. Corollae labium superius incumbens, compressum, villosum, (bifidum, inferius lacinia intermedia biloba, antheris puris.)

396. PHLOMIS TUBEROSA. Floribus involucretis involucretis hispida subulatis, foliis cordatis scabiis, caule herbaceo. (Foliis caulinis lanceolatis, binis oppositis, subjectis verticillis; calyci-

bus hispida, floribus ochroleuco-purpureis. (G.) Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 66. f. 9.

Habitat in pratis ficcis arenosis circa Petropolim rarius. Floret Julio, Augusto. 2 Запья права. five посшокъ. Russ. Посшокъ узловый. Sobol.

CLINOPODIUM. Stamina curvata, antheris conniventibus. (Involucrum multifetum, verticillo subjectum. Labium superius erectum concavum, inferius trifidum, utrumque emarginatum.

397. **CLINOPODIUM VULGARE.** Capitulis subrotundis, bracteis fetaceis, (caule procumbente, foliis ovatis acutis, raris: capituli subrotundi densissimi diffiti, floribus dilute purpureis, fauce et calyce admodum piloso.) (Sob. B.) Sabb. h. rom. 3. t. 65.

Habitat in montosis sylvaticis, Pargelovii, Ofinova Roszczka, circa Sarskofelium et Gatzinam, atque in monte Duderovo. Floret Junio, Julio. 2 Поспелница обыкновенная. Russ. Sobol.

ORIGANUM. Strobilus tetragonus, spicatus, calyces colligens. (Involucrum spicatum, bracteis imbricatis, ovatis coloratis. Periathium inaequale, varium, bilabiatum diphyllum, quinquedentatum.)

398. **ORIGANUM VULGARE.** Spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. Variat: spicis foliosis brevissimis umbellatis, et spicis decoloribus umbellatis, corollis albis. Utraque foliis ovato-acuminatis petiolatis integris acuminatis, calyce fauce pilosa,

CL. XIV. DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 143

bracteis purpurascensibus, staminibus quatuor, antherae octo.) (G.) Flor. dan. t. 638. *Organum vulgare offic.*

Habitat in ripis editis Nevae fluvii, et ad margines sylvarum, Pargelovii, montis duderovii, Gatzinae, ad pagum Colodeci et ad fluvium Lugam. Floret Iunio, Iulio. ④ Душица, five ма-
терица. Russ. Душица пуостая. Sobol.

THYMUS. Faux villis clausa. (Calyx labio superiore tridentato, inferiore bifido, incurvo-gibbus.)

399. THYMUS SERPYLLUM. Floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis, (utrinque punctis impressis, calyce lineis coloratis, labium inferius purpura maculatum. Varietates: majus, minus.) (G.) Zorn pl. med. ic. t. 17. Serpyllum, officin.

In locis arenosis apricis Pargelovii, et superiori regione Nevae fluvii tanta in copia crescit, ut ripae ejus editiores et praeruptae pene ex toto hac planta vestiantur. Floret Iulio. ④ Боро-
дская шрава. Russ. Тимьянъ ползучий. Sobol.

400. THYMUS ACINOS. Floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis subramosis, foliis acutis ferratis. (Caulis decumbenti-erecti, foliis subhorizontalibus, verticillis dimidiatis, paleis et folio singulo suffultis; ex strumosis striis undecim, corolla caerulea tubo longissimo.) (G.) Bulliard. herb. Franc. t. 318.

Habitat in montosis et locis editioribus arenosis Pargelovii, in monte Pulcovo, et circa Strelinam, ad pagum Colodeci, et passim. Floret Iunio, Iulio. ④ Тимьянъ оспролистный. Russ. Sobol.

SCUTELLARIA. Calyx ore sub integro, post florescentiam clauso, operculato. (Labiū superius concavum trifidum, lacinula media concava; inferius emarginatum. Calyx galeam crista et operculo representat.)

401. **SCUTELLARIA GALERICULATA.** Foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus, (caulibus geniculatis, purpureis, floribus gemellis, caeruleis subfessilibus, fauce villosa: labium superius segmentis crispato-reflexis, inferius aggeribus albis, antherae fissura barbata.) (G.) Fl. dan. t. 637. Variat: floribus albis.

In sylvis humidis declivibus et fossis stagnorumque ripis nec non circa paludes passim. Floret Julio. 2 Щиповка шлемовная. Russ. Sobol.

PRUNELLA. Filamenta bifurca, altero apice antherifera. Stigma bifidum. (Stylo spiraliter convoluta. Calyx auricularis.)

402. **PRUNELLA VULGARIS.** Foliis omnibus ovato-oblongis ferratis petiolatis, calycibus labio superiore truncato subtridentato, (bracteis cordatis.) Blaczw. herb. t. 24. Prunella, s. Brunella, officin. Variat, flore albo.

In pratis ficcis apricis, infulae apothecariae aliarumque, et passim vulgaris planta est. Floret Junio, Julio. 2 Черноголовъ простой. Russ. Sobol.

ANGIOSPERMIA.

RHINANTHUS. Calyx quadrifidus inflatus. Capsula bilocularis, obtusa, compressa. Semina pauca. Antherae bifidae hirsutae. Corolla personata.

403. RHINANTHUS CRISTAGALLI. Corollis labio superiori compresso, breviori, calycibus glabris. (Foliis inter flores latioribus, admodum variantibus, latioribus, angustioribus, prout ramosa vel non, caule serpentario in geniculis striis nigris; galea ochroleuca, segmentis caeruleis; pistillo barba flava, glandula nectarifera ad basin germinis.) (G.) Bulliard herb. Franc. t. 125. Varietas, β minor angustifolius, flore saturate luteo. (Sob.)

In pratis frequens. Var. β occurrit circa Ligozam et Strelinam, atque in monte Poclonnaja. Floret Iunio. ☉ Пъшуй гребень, five копъчникъ. Russ. Копъчникъ гребенчатый. Sobol.

EUPHRASIA. Calyx quadrifidus, cylidricus. Antherae inferiores altero lobo basi spinosae. Capsula bilocularis, ovato-oblonga. Semina pauca deorsum incumbentia. (Corolla perforata.)

404. EUPHRASIA OFFICINALIS. Foliis ovatis lineatis, argute dentatis. (Foliis oppositis, floribus axillaribus minimis albis, secundis; staminibus inclusis, lacinia intermedia macula flava.) (G.) Flor. dan. t. 1037. Euphrasia, offic.

Crescit ubique in pratis siccis copiosissime, uti in insulis apothecaria, lapidea, basileensi, et passim. In humidioribus et sylvosis, caule ramosiore foliis ferratis majoribus nitidis occurrit. Floret Julio, Augusto. ☉ Очная помощь. Russ. Глазница аптекарская. Sob.

405. EUPHRASIA ODONTITES. Foliis linearibus: omnibus ferratis. (Caules atropurpurei; fo-

lia triste viridia, floralia ferrata; flores spicati pallide rubentes, calyx laciniis coloratis; labio superiori hirsuto, inferiori trilobo; lobo medio minimo, omnibus erectis ciliatis. Euphrasii caeteris non similis.) (G.) Flor. dan. t. 655.

Habitat in pratis arenosis ficcis, et pascuis circa fabricam pyriam Ochtensem, Ligovam, Crasnoselium et passim. Floret Iulio, Augusto. ☉ Глазница зубная. Russ. Sob.

MELAMPYRUM. Calyx quadrifidus. Corollae labium superius compressum, margine replicato. Capsula biocularis compressa, obliqua, hinc dehiscens. Semina solitaria gibba duo. (Corolla perforata vel ringens.)

406. **MELAMPYRUM NEMOROSUM.** Floribus fecundis lateralibus: bracteis dentatis, summis coloratis sterilibus, calycibus lanatis. (Foliis ovatis, interdum sagittatis, ciliato-asperis; bractea caeruleo-violaceae inferne lanatae, flore axillari uno, lutescente.) (G.) Flor. dan. t. 305.

In pratis et nemoribus praesertim insulae apothecariae, lapideae et Catharinhofii et passim in betuletis. Floret Iunio, Iulio, et Augusto. ☉ Иванъ да марья. Russ. Огнецвѣтникъ дубровный. Sobol.

407. **MELAMPYRUM PRATENSE.** Floribus fecundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis clausis; (foliis lanceolatis horizontalibus. Flores in pedunculis binatis lutei, calyce maculis purpureis, galea margine non reflexo. Os clausum variat.) (G.) Gaertn. de fr. et sem. cent. 4. t. 53. f. 1.

CL. XIV. DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 147.

Crescit in infulis apothecaria et lapidea et passim in pratis sylvosis. Floret Iunio, Iulio. ☉
Огнецвѣтникъ луговой. Russ. Sobol.

408. MELAMPYRUM SYLVATICUM. Floribus secundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis hiantibus. (Flores minores, toti flavi. (F.) Flor. dan. t. 145.

Habitat in sylvis et nemoribus amoenissimis circa Sarškoje selo, et Gatzinam, in monte Duderovo, et ad Fabricam pyriam Ochtensem. Floret Iulio. ☉ Огнецвѣтникъ лѣсный. Russ. Sobol.

LATHRAEA. Calyx quadripartitus aut quinquepartitus. Glandula depressa ad angulum alterum germinis. Capsula unilocularis: receptaculis fungosis lateralibus, seu calyce patente vestita. (Corolla perforata.)

409. LATHRAEA SQUAMARIA. Canle simplicissimo, corollis pendulis, labio inferiore trifido. (Squamae florales caulinis fere majores, ex albedo coloratae, villosae uniflorae, caeruleo-purpurascens, nutantes. Calyce quinquesido coralloideo, colorato, labio inferiore trifido, apice sphacelato. Antherae pilosae.) (G.) Flor. dan. t. 136.

Habitat in monte Pulcovo, et Duderovo satis frequens, atque in Ofinova Roszcz; amat sylvas umbrosissimas, semper humidam et partem montis septentrionalem, inter furculos arborum putrescentes et folia. Floret Majo, Iunio. 24 пепровъ крестъ. Russ.

PEDICULARIS. Calyx quinquesidus. Corolla perforata, labio superiore compresso. Capsula bilo-

cularis, mucronata, obliqua. Semina pauca tuni-
cata, hilo receptaculo affixa. (Variat calycis ore
bifido.)

410. **PEDICULARIS PALUSTRIS.** Caule ramofo,
calycibus cristatis callofo-punctatis, corollis la-
bio obliquis. (Calycibus bifidis aut quadrifidis
saepius, corollae ex albo-rubentis labium supe-
rius utrinque denticulis; folia pinnato-ferrata.)
(G.) Flor. dan. t. 225.

Crescit ubivis in palustribus. Floret Iunio, Iulio.
⊙ Вшивая трава. Russ. Вшивица болопная.
Sobol.

411. **PEDICULARIS SCEPTRUM COROLINUM.**
Caule simplici, floribus terno-verticillatis, co-
rollis clausis, calycibus cristatis, capsulis regula-
ribus. (Caulis bipedalis speciosissimus. Corollae
clausae luteae ore sanguineo. Variat, caule ra-
mofo floribus sparfis; foliis inferioribus ternis,
superioribus binis. In varietate rami caulis non-
nunquam fastigium attingunt.) (G.) Flor. dan. t.
26.

Nascitur in sylvis humidis superiorum regionum
Nēwae fluvii perquam copiose, tum circa pagum
Murino, et inter Sarsoje selo et urbem Gatzzi-
nam. Floret Iulio, Augusto. 2/ Скипептръ ка-
ролинскій. Russ. Sob.

ANTIRRHINUM. Calyx quinquepartitus. Corolla
basi gibba aut calcarata. Capsula bilocularis po-
lyisperma, apice in lacinulas reflexas dehiscens.
(Corollae labium superius bifidum, inferius trifi-
dum, palato saepissime prominente.)

412. ANTIRRHINUM CYMBALARIA. Foliis cordatis quinquelobis, caulibus procumbentibus, (pedunculis axillaribus folitariis, floribus violaceis. Variat: floribus albis. (St.) Curtis Flor. Londin. t. 55.)

Habitat in muro arcis Petropolitanae. Floret Iunio, Iulio. ☉ Жабрей. Р. Львиноустъ шестилытый. Russ. Sobol.

413. ANTIRRHINUM MINUS. Foliis plurimis alternis lanceolatis obtusis, caule ramosissimo diffuso, (plus minusve diffuso; foliis dorso purpurascentibus, sobcarnosis, inferioribus oppositis, saepius reflexis; floribus axillaribus exiguis, violaceo rubroque albidis, calcare brevi.) (Sob. R.) Flor. dan. t. 502.

Habitat in glareosis, et cultis, uti inter segetes Crasnoselii, et Ligovi, atque Petropoli in hortis oleraceis. Floret Iunio, Iulio. ☉ Львиноустъ меньшій. Russ. Sobol.

414. ANTIRRHINUM LINARIA. Foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis, (calyce ochroleuco luteoque variis, calcare longo.) (G.) Knorr del. hort. 2. t. L. 6. a. Eadem monstrosa, floribus summis naturalibus, inferioribus degeneribus. Peloria. Linaria, officinarum.

Habitat in arvis ficcis et ruderatis, ad vias et inter segetes, uti Pargelovii, Ligovi, Catharinhofii, et in hortis cultis Petropoli. Floret Iunio, Iulio. Augusto. 2 Дикой ленъ. Russ. Львиноустъ льняной. Sobol.

SCROPHULARIA. Calyx quinquefidus. Corolla quinquepartita, tubo globofo, lacinia infima reflexa. Capsula bilocularis: difsepimento duplicato. (Labiū inferius intus squamula accefforia acuta, labiū fuperius lacinia intermedia ad tubum reflexa. Corolla refupinata.)

415. **SCROPHULARIA NODOSA.** Foliis cordatis trinervatis, caule obtufengulo. (Foliis obfolete cordatis, vix trinervatis, ferratis, petiolatis, erecto-patentibus, caule nudo, pedunculis subalatis in panicula terminali; bracteis exiguis laciniatis; corolla fordide purpurea, labio inferiori rotundato, deflexo, capsula inflexa, ut duplex videretur.) (G.) Blackw. herb t. 87. Scrophularia, officin.

In fylvis humidis aquofis Catharinhoffi et infularum apothecariae, lapideae, et ad rudera domorum atque in hortis oleraceis faepius occurrit. Floret Iunio, Iulio. † Норычникъ. five Собачья голова. Russ. Норыч-никъ узлокоренный. Sobol.

LINNAEA. Calyx duplex: fructus tetraphyllus; floribus quinquepartitis fuperus. Corolla campanulata. Bacca ficca trilocularis.

416. **LINNAEA BOREALIS.** (Calyx fructus tetraphyllus: foliolis duobus minoribus, magis acutis, rubellis. Caule repente foliis oppofitis ovatis, pedunculis erectis apice nudis bifloris, floribus subrubentibus.) (G.) Flor. dan. t. 3.

Habitat in fylvis umbrofis et mufcofis, uti Peterhoffi, Strelinae, et Petropoli in infula Bafileenfis frequens est. Floret Iunio, Iulio. † Линнея сѣверная. Russ. Sobol.

LIMOSELLA. Calyx quinquefidus. Corolla quinquefida aequalis. Stamina per paria approximata. Germen biloculare. Capsula subunilocularis, bivalvis, polysperma.

417. **LIMOSELLA AQUATICA.** Foliis lanceolatis, (longe petiolatis, parum carnofis; scapi in fine flore uno muscofo. Calyce maculis purpureis, faepiffimae bifido, corolla laciniis albis purpurafcentibus; filamenta longitudine potius aequalia, antherae subrotundae nigrae, villo cum stigmate globofo conjuctae, dein per paria fe removement.) (G.) Flor. dan. t. 69.

Ad ripas fluvii Siftae et in locis vere inundatis circa Ligovo et Goreloy cabac magna copia crescit. Floret Julio, Augusto. ☉ et 2 Грязница водяная. Rnss. Sobol.

OROBANCHE. Calyx subbifidus. Corolla ringens. Glandula sub basi germinis. Capsula unilocularis, bivalvis, polysperma. (Calyx interdum quinquefidus, variat. Stigma obcordatum, tuberculo flavo.)

418. **OROBANCHE MAJOR.** Caule simplicissimo pubefcente, ftaminibus subexfertis. (Squamis caulinis laxis pilofis emarcidis, spica denfa floribus ex albo flavefcentibus, ferrugineis, atropurpleisve, polline albo confperfis, calyce trifido lacinia media longiore.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 232. Orobanche, officin.

Habitat in montofis, et pratis ficcis editioribus, uti circa Crasnoje selo, montem Duderovium, urbem Gatzcinam et pagum Colodetzi. Floret

Iunio, Iulio. Parasitica. Заразиха, five ЛЬВИНЫЙ хвостъ. Russ. Заразиха солнечная. Sobol.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA

I. SILICULOSA.

MYAGRUM. Silicula stylo rigido conico terminata, bivalvis; loculis quibusdam saepe vacuis.

419. **MYAGRUM SATIVUM.** Siliculis obovatis pedunculatis polyspermis, (Foliis scabris sagittatis leviter dentatis, flore luteo exiguo, filicula obcordata tumente.) (R. B. Sob.) Lindern flor. als. t. s.

Habitat inter segetes ad viam Sarcofeliensem et in regione Wiburgensi. Floret Iunio. ☉ РѢЗЪ five рѣзуха. Russ. Рѣзуха сѣяльная. Sobol.

420. **MYAGRUM PANICULATUM.** Siliculis lentiformibus orbiculatis punctato-rugosis. (Foliis sagittatis. Floribus luteis. Semine rotundo unico.) (G.) Flor. dan. t. 204.

Ad ductum aquarum ladogenflum, tum in agris et arvis circa Ligovam, et infulis apothecaria, et lapidea ad saepes frequens est. Рѣзуха вѣшочная. Russ. Sobol.

SUBULARIA. Silicula integra, ovata: valvis ovatis, concavis, dissepimento contrariis. Stylus filicula brevior.

CL. XV. TETRADYNAMIA SILICULOSA. 153.

421. SUBULARIA AQUATICA. Foliis teretiusculis. (Caulēs tenuissimi nudi, foliis radicalibus pene breviores, saepissime ramosi.) (G.) Flor. dan. t. 53.

In ripis humidis et uliginosis Nevae fluvii passim copioseque provenit, et circa Ligovam in fossis et aquis, aliisque in locis similibus frequens est. Floret Iunio, Julio. ☉ Шильница водяная. Russ. Sobol.

DRABA. Silicula integra, ovali-oblonga, valvis planiusculis (membranaceis) dissepimento parallelis. Stylus nullus.

422. DRABA VERNA. Scapis nudis, foliis subferratis, hirsutis. (Petalis bifidis.) (G.) Flor. dan. t. 983.

Habitat circa nosocomium maritimum, et passim in locis sabulosis sterilibus. Floret Aprili, Majo. ☉ Быльникъ весенный. Russ. Sobol.

LEPIDIUM. Silicula, cordata, emarginata, compressa, polysperma; valvis acute carinatis; dissepimento lanceolato, contrario.

423. LEPIDIUM RUDERALE. Floribus diandris, apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis. (Silicula emarginata; floribus vix conspicuis flavis, passim et tetrandris.) (G.) Flor. dan. t. 184.

Ad vias plateasque et ruderata ubique crescit copiosissime. Floret Majo, Iunio. ☉ Дикой крещъ. Russ.

154. CL. XV. TETRADYNAMIA SILICULOSA.

THLASPI. Silicula emarginata, obcordata, polyperma, valvis navicularibus, marginato-carinatis, alato-marginatis.

424. **THLASPI ARVENSE.** Siliculis orbiculatis, foliis oblongis, dentatis, glabris. (Silicula latissima.) (G.) Flor. dan. t. 793.

Habitat in arvis et in hortis cultis passim. Floret Majo, Iunio. ☉ Ярупка. five Комелекб. Russ. Ярупка полевая. Sobol.

425. **THLASPI BURSA PASTORIS.** Siliculis obcordatis, triangulis, compressis, valvis dorso nudis obtusis, foliis radicalibus pinnatifidis. Varietas *a.* foliis omnibus pinnatifidis. /3 Foliis radicalibus longe petiolatis ovatis integerrimis, caule aphylo. *γ.* Foliis longe petiolatis integerrimis caule folioso. (G.) Flor. dau. t. 729. Bursa pastoris, officin.

In hortis oleraceis et circa domos et sepēs vulgarissima planta est. Floret, a mense Aprili ad Septembrem. ☉ Пасшущья сумка. Russ.

ALYSSUM. Filamenta quaedam introrsum dente notata. Corolla aequalis. Silicula subglobosa leviter emarginata, compressula, stylo coronata.

426. **ALYSSUM INCANUM.** Caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymbosis, petalis bifidis, (albis), filiculis ovatis. Nunc Moenchia. (G.)

Habitat circa urbem Gatzinam, et in monte Pulcovo, circa Sarfcoje selo, ad margines agrorum, in ficcis arenosis, et Petropoli in horto Nobilium Cadetorum terrestrium spontaneo. Floret Iunio,

Iulio. ♀ et ♂ Торица. five икопная права.
Russ. икопка сбдая. Sobol.

LUNARIA. Silicula integra elliptica, compresso-plana; diffepimento valvis parallelo, aequali, plano. Stylo brevi. Semina compressa marginata.

427. **LUNARIA REDIVIVA.** Siliculis oblongis, foliis alternis, (cordatis. Radix perennis.) (G.) Gaertn. de fr. et sem. pl. Cent. 9. t. 142. f. 1.

Ad Lugam fluvium inter pagos Curovitza et Novaja in sylvis magna copia occurrit. Floret Iunio, Iulio. ♀ Мбсячникъ. five лунная права. Russ. Мбсячникъ иноголбшній. Sobol.

S I L I Q U O S A.

CARDAMINE. Siliqua longa, cylindraceo-compressa, bilocularis, bivalvis, valvulis elastice dehiscens spiraliter (sursum) revolutis. Calyx subhians. Stigma obtuso-capitatum, integrum. (Stamina saepius quatuor longiora tantum. Petala saepius abortiva.)

428. **CARDAMINE PRATENSIS.** Foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis. (G.) Curt. fl. Londin. t. 175. Variat. flore albo, et flore pleno, purpureo.

In pratis humidis infulae apothecariae et lapideae et passim frequens est. Floret Majo, Iunio. ♀ Кресб луговой. Russ. Robol.

429. **CARDAMINE AMARA.** Foliis pinnatis, axillis stoloniferis. (Caule flexuoso, foliis glabris.

Stolones in plantis defloratis tantum.) (G.) Curtis flor. Londin. t. 158.

Habitat in aquis et ad ductus aquarum, uti in fylvis infulae apothecariae, et lapideae. Floret Majo, Iunio. 2 Кресъ горькій. Sobol.

SISYMBRIUM. Petala unguibus minimis. Siliqua incurvula, gibba, teres, valvulis dehiscendo recitiusculis, dissepimento paulo brevioribus. Calyx patens. Corolla patens.

430. **SISYMBRIUM NASTURTIUM.** Siliquis declinatis, foliis pinnatis; foliolis subcordatis. (G.) Flor. dan. t. 990. Nasturtium aquaticum, officinarum.

Habitat ad rivulos fluentes, et fontes circa officinam pyriam Ochtemsem, ad Goreloy cabac, et passim. Floret Iunio. ♂ Брунъ кресъ. Russ. Кресъ водяной. Sobol.

431. **SISYMBRIUM SYLVESTRE.** Siliquis declinatis, oblongo ovatis, foliis pinnatis, foliolis lanceolato-ferratis. (Caule ramosissimo, floribus parvis flavis.) (G.) Curtis flor. Londin. t. 153.

In humidis, palustribus et ad fossas passim. Floret Iunio. 2 Гулявикъ. five гулявникъ. Russ. гулявникъ лѣсный. Sob.

432. **SISYMBRIUM AMPHIBIUM.** Siliquis declinatis, oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis ferratis, petalis calyce majoribus. (Folia calycina et petala flava) (G.) Tabernam. Kraeuterb. p. 408. Variat foliis simplicibus et pinnatis.

In ripis inundatis Nevae fluvii, et in aquis lente fluentibus et paludosis circa pagum Zapolje. Flo-

ret Majo, Iunio. 2/ Гулявникъ водоземный.
Russ. Sobol.

433. SISYMBRIUM SOPHIA. Petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. (G.) Flor. dan. t. 528. Sophia, officin.

Crescit ubique in arvis, aggeribus, ad vias et fepes. Floret Majo, Iunio. ☉ Гулявникъ. five мудрость лѣкарская. Russ. Sobol.

ERYSIMUM. Siliqua longa linearis, fricta, erecte tetragona, bilocularis, bivalvis. Calyx clausus. Stigma capitatum.

434. ERYSIMUM OFFICINALE. Siliquis spicae adpressis, foliis runcinatis, (extremo lobo triangulo dentato, calycum apicibus coloratis, filiqua villosa, longitudinaliter striata.) (Flor. dan. 560. Erysimum officin.

Habitat in arvis, ad vias et in ruderatis ficcis insulae basilensis et passim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Горчица полевая. five Свирѣпка. Russ. Свирѣпка аптекарская. Sobol.

435. ERYSIMUM BARBAREA. Siliquis obsolete tetragonis, foliis lyratis extimo subrotundo, (carnoso, splendido.) (G.) Flor. dan. t. 985.

Habitat in quantitate ad fossas viae Sarfcolienfis, et in pratis humidis passim. Floret Majo, Iunio. 2/ Варварка. Russ. Sobol.

436. ERYSIMUM CHEIRANTHOIDES. Caule ramosissimo, foliis integris lanceolatis, oblique repando-dentatis, patulis. (Foliis radicalibus emarcescentibus, rosmarinoidibus. Caules ramosi ex nigro

maculati, planta exsucca. Siliquae a scapo racemi distantes.) (G.) Flor. dan. t. 923.

Ad agrorum margines et inter fegetes frequenter occurrit, atque petropoli in cultis, et hortis passim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Свирѣпка рукоцѣпная. Russ. Sobol.

ARABIS. Nectaria quatuor, fingulum ex squamula intra fundum folioli calycini reflexa. Siliqua longa, compressa, linearis, apice integra, capitata. (Calyx superne patens; siliqua lata; petala limbo amplissimo, patulo.)

437. **ARABIS THALIANA.** Foliis petiolatis lanceolatis integerrimis subdenticulatis, ad exortum ramorum caulinis sessilibus. Corolla nivea ad faucem subflavescens.) (G.) Flor. dan. t. 1195.

Crescit in hortis oleracis Petropoli et ad pagos circa viam Schlüssenburgensem. Floret Majo. ☉ Арапская горчица. Russ. Sobol.

TURRITIS. Petala erecta (in hac classis angustissima.) Siliqua omnium longissima, stricta, tetragona, (interdum pendula.) Calyx connivens erectus.

438. **TURRITIS GLABRA.** Foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerrimis, amplexicaulibus glabris.) Brassicae fere habitus; petalis albidis, foliis cichoraceis.) (G.) Flor. dan. t. 809.

Habitat in pratis ficcis montosis, sylvosis Pargelovii, et circa Catherinhoffium, aliisque in locis similibus. Floret Iunio, Iulio. ♂ Бешенница гладкая. Russ. Sobol.

439. **TURRITIS HIRSUTA.** Foliis omnibus hispida; caulinis amplexicaulibus. (Foliis caulinis sessilibus, acutiusculis, subfagittatis, integerrimis, dentato-ciliatis, filiquis erectis linearibus compressis, petalis niveis maximis, calycibus apice saepius sphacelatis, glandula triloba inter stamina longiora et calycem, similis Arabidibus. Pili in foliis furcati, in caule simplices.) (R. Sobol.) Flor. dan. t. 1040.

Habitat in pascuis montosis, sylvosis Crasnofelii, et passim circa Petropolim. Floret Majo, Iunio. ♂ Бешенница шершавая. Russ. Sobol.

BRASSICA. Calyx erectus connivens. Siliqua utrinque depressa, longa, valvulis dissepimento apice tereti brevioribus. Glandulae quatuor, inter stamina longiora et calycem, una utrinque. Semina globosa.

440. **BRASSICA CAMPESTRIS.** Radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus. Radicalibus lyratis, subhispidis. Variat, flore albo, et luteo. (G.) Flor. dan. t. 550.

Inter segetes et ad sepes hortorum oleraceorum frequens est. Floret Iunio. ○ Капуста полевая. Russ. Sobol.

441. **BRASSICA NAPUS.** Radice caulescente suffiformi. (G.) Blackw. herb. t. 224.

Habitat in agris circa Pargelovium et Ofinova Roszczza, nec non ad rudera domorum et sepes hortorum. Floret Majo, Iunio. ♂ Рѣпа дикая. Russ.

SINAPIS. Calyx patens. Petala unguibus erectis linearibus. Glandulae quatuor inter stamen bre-

160. CL. XV. TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

vius et pistillum, utrinque unica, et inter stamina longiora et calycem. Siliqua torosa inferne, scabra, rostrata; dissepimento valvulis duplo saepe longiore. (Glandulae? Cornu siliquae bifidum.)

442. SINAPIS ARVENSIS. Siliquis multangulis, toroso-turgidis, rostro ancipiti longioribus. (Foliis inciso-ferratis, floribus luteis, cornu brevi. (Sob. B.) Flor. dan. t. 753.

Habitat in agris et inter fegetes circa urbem Jamburgum, Boeber, circa montem Pulcovum, Pargelovii. Sobol. Floret Iunio, Iulio. ☉ Горчица полевая. Russ. Sobol.

RAPHANUS. Calyx clausus erectus, (setosus.) Siliqua torosa, subarticulata, teres cum acumine. Glandulae nectariferae quatuor, unica utrinque inter stamen breve et pistillum, unica inter stamina longiora et calycem. (Flos fere Hesperidum habitu.)

443. RAPHANUS RAPHANISTRUM. Siliquis teretibus articulatis laevibus unilocularibus, (saepius intortis. Calyce colorato hispido, glandula nulla. Hirsuta aspera planta; caulis retrorsum hispidus, folia inferiora runcinata; fructus discedens secundum articulos. Variat flore albo et luteo.) (Sob.) Curtis flor. Londin. t. 267.

Habitat inter fegetes Pargelovii et in agris passim. Floret Majo, Iunio, Iulio. ☉ Редька полевая. Russ. Sobol.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA

DECANDRIA.

GERANIUM. Calix quinquepartitus. Corolla pentapetala. Pistillum unum. Stigmata quinque. Staminum urceolus decempartitus. Receptaculum commune rostratum, cauda longissima tortili longitudinaliter interne dehiscente. Cocculi quinque.

444. **GERANIUM CICUTARIUM.** Caule remoto prostrato, foliis pinnatis, pinnulis subovatis, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris. (Glandulis nigris inodorum.) (G.) Curtis flor. Londin. t. 53.

In pratis Ofinovae Roschczae aliisque, tum ad vias et plateas atque in hortis oleraceis frequens est. Floret Iunio, Iulio. ☉ Журавлиный носъ. sive Журавлиникъ омиговый. Russ. Sobol.

445. **GERANIUM SYLVATICUM.** Pedunculis bifloris, foliis subpeltatis inciso-ferratis quinquelobis, caule erecto subtetragono, petalis emarginatis, (lineis tribus purpureis. Folia pilis adpressis gaudent, subtus pallida venis flexuosis. Petala basi subhirsuta. Pedunculi breves pilosi. Arilli hirsuti, annulo elevato.) (R. Sob.) Flor. dan. t. 124.

Habitat circa Petropolim, in fylvis montosis ad fabricam pyriam Ochtensem, Pargelovii, et passim. Floret Iunio, Iulio. ♀ Журавлиникъ лѣс-ный. Russ. Sobol.

446. GERANIUM PALUSTRE. Foliis quinquelobis incisifs caule que herbaceo villosis, pedunculis bifloris oppositis longissimis declinatis, petalis integris. (Rami divaricatissimi, bifariam angulati, angulis obtusis. Foliis rugosis subtus, cum petalis dilute rubris lineis tribus fuscis, basi villis albis.) (G.) Flor. dan. t. 596.

Habitat in fylvis humidis et ripis Nevae fluvii; circa insulam lapideam, et insulam crucis, alibi-que in locis similibus passim. Floret Iunio, Iulio. ♀ Журавлиникъ болотный. Russ. Sobol.

447. GERANIUM PRATENSE. Pedunculis bifloris, caule herbaceo erecto, foliis oppositis subpeltatis multipartitis rugosis, lobis pinnatis acutis, petalis integris. (Totum hirsutum; petioli radicales longi. Corolla magna violacea.) (G.) Curts flor. Londin. t. 250.

In pratis fylvosis circa fabricam pyriam Ochtensem, in monte Poclonnaja et ad viam Peterhoffianam et Strelinam frequens est. Floret Iunio, Iulio. ♀ Журавлиникъ луговой. Russ. Sob.

448. GERANIUM ROBERTIANUM. Pedunculis bifloris, foliis ternatis pinnatis incisifs, calycibus pilosis decemangulatis. (Odor hircosus.) (R. Sob.) Flor. dan. t. 694. Geranium robertianum, offic.

Habitat in rupibus umbrosis circa Pargelovium, et Strelinam. Floret Iunio, Iulio. ♂ Журавлиникъ робертіанскій. Russ. Sobol.

449. GERANIUM LUCIDUM. Pedunculis bifloris, caule herbaceo, foliis oppositis pilosis quinquelobis rotundatis, calycibus pyramidatis transverse elevato-rugosis. (G.) Flor. dan. t. 213.

Crescit circa Novogrodium. Gorter. Et circa pagum Colodeci, atque urbem Gatzzinam. Sob. Floret Majo, Iunio. ☉ Журавлиникъ свѣпый. Russ. Sobol.

450. GERANIUM COLUMBINUM. Caule procumbente, foliis oppositis palmatis angulatis, laciniis pinnatis glabris, calycibus aristatis, pedunculis solitariis, foliis longioribus. (Sob.) Cavanill. diff. 4. t. 82. f. 1.

Habitat in hortis oleraceis, uti in horto imperiali vulgo Italico dicto, et in regione Peterburgenfi, atque in aliis, passim. Floret Majo, Iunio. ☉ Журавлиникъ голубиный. Russ. Sobol.

451. GERANIUM ROTUNDIFOLIUM. Pedunculis bifloris, caule prostrato, foliis oppositis inferioribus subrotundis femiquinquepartitis, superioribus subcuneatis; petalis integerrimis calyce paulum longioribus. (Arillis laevibus pilosis feminibus reticulatis.) (Sob.) Regn. bot. t. 214.

Habitat in agris circa montem Duderovum, et Crasnoselium, atque Petropoli in hortis oleraceis. Floret Iunio, Iulio. ☉ Журавлиникъ круглолистный. Russ. Sobol.

P O L Y A N D R I A .

- MALVA. Perianthium duplex, exterius triphyllum, interius monophyllum femiquinquefidum. Petala quinque. Capsulae numero stigmatum, octo aut

plures, monospermae, unilocularis, rarius biloculares aut dispermae in verticillum dispositae.

452. MALVA ROTUNDIFOLIA. Caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis plicatis, obsolete quinquelobis septemlobisque, pedunculis uno aut tribus fructiferis declinatis. (G.) Flor. dan. t. 721. Malva, officin.

Crescit in ruderatis, ad vias et sepes hortorum, uti in regione petersburgensi, in regimento Semenowsky et Ismaylowsky, circa nosocomium maritimum, et ad fluvium Lugam. Floret tota aestate. ☉ Просвирки, five калачики. Russ. Присвирничка круглолистная. Sobol.

453. MALVA VERTICILLATA. Caule erecto, foliis angulatis, floribus axillaribus glomeratis sessilibus, calycibus scabris. (Sob.) Jacq. hotr. vind. t. 40.

Crescit copiose in horto Imperiali italico dicto, et in hortis oleraceis circa Regimentum Preobrazschensky, spontanea. Floret Iunio, Iulio. ☉ Просвирничка цвѣшколесная. Russ. Sobol.

454. MALVA CRISPA. Caule erecto, foliis angulatis crispis, floribus axillaribus glomeratis. (R.) Cavanill. diff. 2. t. 23. f. 1.

Habitat circa P. tropolim, in ruderatis. Floret Iulio. ☉ Просвирничка кудрявая. Russ. Sobol.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

FUMARIA. Calyx diphyllus. Corolla ringens, fauce clausa, (tetragona,) nectarifera, nectario stamina occultante. Filamenta duo membranacea, singula antheris tribus. Silicula unilocularis, submonosperma.

455. **FUMARIA BULBOSA.** Radice bulbosa, caule simplici, bracteis ovato-lanceolatis integerrimis flore brevioribus. (Coloratis, caulis unicus albidus diphyllus, foliis Ligustici, trifidis, bracteis foliolis tribus, fere calycis longitudine, floribus subsessilibus, calycibus stipulantibus, corollis carina alata, alis lateralibus latissimis. Variat floribus purpurascens, et albis.) (L. Sob.) Flora dan. t. 60. *Aristolochia cava*, officin.

Habitat in sylvis montosis umbrosis, uti in monte Pulcovo, et Duderovo, et circa pagum Colodeci, et urbem Gatzinam, Sob. atque Petropoli in valle circa praedium Mandere, aliisque valibus subhumidis; ad ripas minorum ramorum Nevæ fluvii. Laxmann. Floret inter primas plantas, ad finem Aprilis, et Majo. 2 Дымница орбшисная. Russ. Sobol.

456. **FUMARIA OFFICINALIS.** Leguminibus monospermis racemosis, caule diffuso acutangulo,

foliis decompositis glaucis, corollis purpurascen-
tibus. (G.) Zorn pl. officin. ic. t. 14. Fumaria,
officinarum.

Habitat inter segetes , Pargelovii, Ofinovae Ros-
czae, Crasnofelii, et ad viam Peterhoffianam, cir-
ca Strelinam, et passim. Floret Iunio, Iulio. ☉
Земный дымб. Russ. дымница аптекарская.
Sobol.

OCTANDRIA.

POLYGALA. Calyx pentaphyllus, foliolis duobus
majoribus alaeformibus, ante maturitatem feminis
coloratis; exterioribus tribus minoribus. Corolla
subpapilionacea, inaequalis, vexillum cylin-
dricum. Capsula obcordata, compressa, bilocularis.
Semina solitaria.

457. **POLYGALA AMARA.** Floribus racemosis,
Caulibus erectiusculis, foliis radicalibus obova-
tis majoribus. (Caulinis declinatis, ellipticis, al-
ternis, sessilibus; pedunculis calycibusque flori-
bus caeruleis concoloribus. Caule procumbente.
Amaritie mox distinguitur a vulgari simili. Folia
radicalia cespitosa crassa. Flores semper violacei.)
(Sob. B.) Iacq. flor. austr. 5. t. 412. Polygala
amara, officin.

Habitat circa Petropolim. Crescit in magna quan-
titate in pratis circa montem Pulcovum, et Du-
derovum, ad Crasnoje selo, et Colodeci, et pas-
sim in montosis. Floret Iunio. 2/ Исходъ гор-
кий. Russ. Sob.

458. **POLYGALA VULGARIS.** Floribus racemo-
sis, caulibus herbaceis simplicibus procumbenti-

bus, foliis lineari-lanceolatis. (Caulibus procumbenti-erectis; foliis fere buxinis; floribus alis majoribus dependentibus, vexillo bifido, variis, albis, purpureis caeruleisve, laciniis sexdecim, aut septemdecim. Capsula thlapsidea, fructu hilo trifido. (G.) Flor. dan. t. 516.

Ad ductum aquarum Ladogensium, et ad montem Pulcovum, Duderovium, fluvium Lugam et pagum Colodeci, frequens est, atque in insula lapidea occurrit. Floret Iunio, Iulio. 2 Истодъ обыкновенный. Russ. Sobol.

DECANDRIA.

ANTHYLLIS. Calyx ventricosus, villosus quinque-dentatus. Legumen minimum, subrotundum, tectum, intra calycem.

459. **ANTHYLLIS VULNERARIA.** Foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato, (terminali. Caules prostrati, ad infidentes flores incurvati; alae carina longiores, carina rostro longo. Folia ternata, quina, trifida seu quinquefida. Variat floribus flavis et luteis, apice rubro et fanguineo, foliisque variis.) (G.) Flor. dan. t. 988. Vulneraria, officin.

Circa ostium Narovae fluvii in pineto, praeterea nullibi visa. Floret Majo, Iunio. 2 Язвенникъ. sive сольникъ. Russ. Сольникъ ранецъ-лебный. Sob.

OROBUS. Calyx basi obtusus, dentibus superioribus duobus profundioribus, brevioribus. Stylus linearis, teres, supra villosiusculus.

460. **OROBUS VERNUS.** Foliis pinnatis ovatis: stipulis semifagittatis integerrimis, caule simplici, (purpureo quadrangulo, stipulis involucrantibus, pedunculis sex floris, aut octo floris, floribus purpureis vexillo caeruleo-rubenti, plica singulari.) (G.) Blackw. herb. t. 208. f. 1. 2. Orob., officin.

Habitat in fylvis umbrosis montosis Duderovii, Pulcovo, Ofinovae Roschczae, circa urbem Gatznam, pagum Colodeci, circa fabricam pyriam Ochtensem, et in plerisque aliis similibus. Floret Majo. 2 Горногорошникъ весенній. Russ. Sob.

LATHYRUS. Calycis laciniae duae superiores breviores. Stylus planus, supra villosus, superne latior. Legumen plurimis aequale latum longissimum. (Vexillum obcordatum, maximum.)

461. **LATHYRUS PRATENSIS.** Pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis; foliolis lanceolatis (binatis, utrinque acutis, petiolis alatis, stipulis duabus ad nodos singulos, floribus luteis, odoratis, vexillo lineis atris angulis duobus cartilagineis carinam amplexante.) (G.) (Flor. dan. t. 527.

Habitat frequens in pratis laetioribus; uti circa fabricam pyriam Ochtensem, Catharinhoffi, et in insulis Nevae fluvii. Floret Iunio, Iulio. 2 Гороховникъ лиловый. Russ. Sobol.

462. **LATHYRUS SYLVESTRIS.** Pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. (Caules trianguli, foliofo-alati, cirrhi plerumque triphylli; foliola in spinulam terminata; vexillum tota ora cincina-

tum, purpureum. Variat flore rubente et albido.)
Flor. dan. t. 525.

Habitat in sylvis montosis circa Petropolim. (B.)
Florrt Iunio. 2 Гореховникъ лѣсний. Suss.
Sob.

463. LATHYRUS LATIFOLIUS. Pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. (Caules alati, alis ciliato-aculeatis; folia bina opposita ovato-obtusa subsenescentia maxima. Cirrhi saepius triphylli. Flores rosei magni, subinde caeruleo-virides, carina ascendente, intorta saepius.) (G.) Rivin. tetrap. t. 40.

Habitat circa montem Pulcovum, et ad fluvium Iugam, atque in montosis Duderhovii et Crafnofaelii. Floret Iunio. 2 Гореховникъ широколиственный. Russ. Sobol.

464. LATHYRUS HETEROPHYLLUS. Pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis tetraphyllisque: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. (B.) Hacq. it. carp. sept. 1. 32.

Habit circa Petropolim. In vallibus et montibus Pargelovii, et Ofinovae Roszczae (Sob.) Floret Iunio, Iulio. 2 Гореховникъ разнолиственный. Russ. Sob.

465. LATHYRUS PALUSTRIS. Pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis lanceolatis; (internodiis membranaceis; foliis auriculis calcatis; calycis ora ciliata; carina ad angulum fere rectum ascendente. Flores Orobi verni subcaerulei, pallide purpurascens. (G.) Flor. dan. t. 399.

Habitat in in locis paludosis et pascuis humidis circa Catharinhoffium et ad viam Peterhoffianam passim. Floret Iunio, Iulio. 2 Гореховникъ болотный. Russ. Sob.

VICIA. Stigma latere inferiore transverse barbatur. Legumen coriaceum, longum, acumine terminatum, (multis nodosum. Calyx femiquinquefidus. Stylus ad angulum rectum.)

466. **VICIA SYLVATICA.** Pedunculis (elongatis) multifloris foliolis ovalibus, stipulis denticulatis. (Floribus albescentibus, lineis caeruleis.) (G.) Flor. dan. t. 277.

Habitat in fylvis umbrosis montis Pulcovi, Duderovi, Strelinae et passim. Floret Iunio, Iulio. 2 Мышій горохъ лѣснѣй. Russ. Sob.

467. **VICIA CRACCA.** Pedunculis multifloris, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris, floribus imbricatis. (Caulis villis pubescens, foliis fere linearibus, interdum glabris, stipulis hirsutis tripartitis. Flores ex violaceo-purpureo-caerulei, fauce aggeribus duobus, alia carina multo longioribus carina bipede; siliquae subhirsutae longae.) Flor. dan. t. 804.

In pratis et inter segetes atque in hortis ubique et maxima copia. Floret Iunio, Iulio. 2 Мышій горохъ полевой. Russ. Sob.

468. **VICIA SATIVA.** Leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliolis omnibus oblanceolatis retusis emarginatis, stipulis dentatis, feminibus compressis. (Stipulis dentibus aristatis, postice exsertulatis. Calyx dentibus longissimis rectis

subaequalibus, alis purpureis. Stigma saepius nudum. Tota villosula.) (G.) Flor. dan. t. 522.

Habitat inter segetes, et in ripa Nevae fluvii inter Kazatchiam, et Ochtam. Floret Iunio, Iulio.

☉ Мышій горохъ сѣяльный. Russ. Sob.

469. VICIA SEPIUM. Leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decrefcentibus. (Costae auriculis subaristatis, foliis ovato-obtusis quinque aut sex, mucrone adunco instructis; stipulae subtus nigromaculatae, calycis dentes curti corollae tubo breviores; corollis alboceruleis livescentibus, floribus plerumque quatuor. (G.) Flor. dan. t. 699.

Habitat ubique, in fylvis herbofis, in pratis, infulae Iapideae aliarumque, et ad saepes horticorum frequens. Floret Majo, Iunio. ☿ Мышій горохъ заборный. Russ. Sob.

470. VICIA MONANTHA. Pedunculis unifloris aristatis, foliolis lanceolatis obtusis: stipulis bifidis. (R.) Retz. obs. bot. 3. p. 39.

Habitat circa Petropolim. In agris circa Crasnoje selo, et montem Duderovium. (Sob.) Floret Iunio, Iulio. ☉ Мышій горохъ одноцвѣтный. Russ. Sobol.

ERVUM. Calyx quinquepartitus, subaequalis, longitudine fere corollae. (Simillimum viciae, a qua stigmatate imberbi deffert.)

471. ERVUM TETRASPERMUM. Pedunculis subbifloris, feminibus globosis quaternis. (Caulis infimus subquadrangulus, foliosus, foliis linearibus quadijugis aut quinquejugis, denticulatis, calyce

purpureo, corolla dilute caerulea, albidave, stamen decimum connatum saepius.) (G.) Curtis flor. Londin. t. 41.

Осcurrit passim in agris, et inter fegetes, sed rarius quam vicia cracca. Floret Iunio. ☉ Чечевица чешыресемьяная. Russ. Sob.

472. ERVUM HIRSUTUM. Pedunculis multifloris, feminibus globosis binis. (Caulibus prostratis quadrangulis, utrinque subalatis, foliis quinque aut novem, cirrhis involutis, corolla dilute caerulea, vexillo medio denticulato, carina lateribus margine purpurea. Legumen hirsutum.) (G.) [Flor. dan. t. 639.

Habitat cum vicia fativa, tum inter fegetes ad Goreloj cabac, et in hortis cultis. Floret Iunio, Iulio. ☉ Чечевица шершавая. Russ. Sob.

TRIFOLIUM. Flores subcapitati. Capsula vel Legumen vix calyce longius, non dehiscens, deciduum. (Perianthium quinquedentatum: Stamen decimum liberum.)

473. TRIFOLIUM MELILOTUS OFFICINALIS. Capsulis racemosis subdispermis acutis rugosis, caule erecto. (Flores penduli racemosi flavi, rarius albi, vexillo emarginato recedente a carina, alis convolutis divergentibus, capsulis turgidulis.) Blackw. hab. t. 80.

Ad cataractas fluvii Wolchow, praeterea nusquam vidi. Gorter. Floret, Iulio. ☉ Melilotus, officin. Дикой хмбль, sive донникъ. Russ. прилишникъ донный. Sobol.

474. TRIFOLIUM HYBRIDUM. Capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule adscendente. (Flores primo congesti capituliformes albi, dein patuli rubelli, tandem reflexi marcidi ferruginei evadunt.) (Sob. R.) Rivin. tetrap. t. 127. f. 3.

Habitat circa Petropolim. In pratis infulae apothecariae et lapideae et in hortis oleraceis faepe occurrit, floribus odoratis gratissimis. Sobol. Floret Iunio, Iulio. 2 прилишникъ подложный. Russ. Sobol.

475. TRIFOLIUM REPENS. Capitulis umbellariibus, leguminibus tetraspermis, caule repente. (Folia macula albente lambdaidea; flores albi subquadripetali, vexillo longissimo plicato, defloratis recedentibus. Folia aëre sicco flaccida, et aëre humido erecta.) (G.) Flor. dan. t. 980.

Crescit ubivis in pratis. Floret Majo, Iunio, Iulio. 2 прилишникъ ползучий. Russ. Sobol.

476. TRIFOLIUM RUBENS. Spicis longis villosis, corollis monopetalis, caule erecto, foliolis ferrulatis. (Caules admodum foliosi foliis lanceolate-linearibus, spica longissima rubente, calycis dente imo longissimo; stipulae longissimae, flores purpurei. Radix ingrata amaricans.) Jacq. flor. austr. v. 385.

Habitat circa Petropolim. Boeber. In montosis sylvaticis Pargelovii. (Sob.) Floret Iunio. ☉ прилишникъ краснбющій. Russ. Sob.

477. TRIFOLIUM PRATENSE. Spicis globosis subvillosis cinctis, stipulis oppositis membrana-

ceis. (Caulēs incurvi, stipulae sessiles fetaceae, folia ovata integra, corolla monopetala, tubo, ut prius, staminifero, stigmatē papillis duabus, purpurea, vel ochroneuca. Flores odorati.) (G.) Blackw. herb. t. 20.

In pratis ubique frequens est. Floret Iunio, Iulio. 2 Дяшлина, five кашка. Russ. Трилистникъ луговой. Sob.

478. TRIFOLIUM ARVENSE. Spicis ovalibus villosis, calycis dentibus fetaceis villosis aequalibus. (Caulibus erectis, mollibus, lanuginosis, subdichotomis, foliis nervo in spinulam terminato, incisis, stipulis exiguis, calycibus dentibus quinque longissimis, pappo pinnato; flores magni, quadripetali carnei; deflorati aurantiaci, alae intus macula sanguinea.) (G.) Flor. dan. t. 724.

Habitat in arvis et agris montosis, apricis uti circa Sarskoje felo, et Murzincam, et passim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Заячы лапы. Russ. Трилистникъ полевой. Sob.

479. TRIFOLIUM FRAGIFERUM. Capitulis subrotundis, calycibus fructiferis reflexis, labio superiore inflato bidentato, caule repente. (Foliis argute ferratis; floribus rubicundis, quadripetalis, calycibus roseis. Flor. dan. t. 1042.

Habitat circa Petropolim. Voeber. In locis humidis circa Catharinhoffium et alibi frequens est. Sobol. Floret Iunio, Iulio. 2 трилистникъ земляничный. Russ. Sobol.

480. TRIFOLIUM MONTANUM. Spicis subimbricatis subtribus: vexillis subulatis emarcescen-

tibus, calycibus nudis, caule erecto. (Caules nudiusculi, foliis lanceolatis, duris, strigosis, subplicatis cauleque pilosis, calycibus albis, floribus monopetalis, florentibus erectis albidis. Capitulum est vere Racemus coarctatus bracteis subulatis minimis interstinctis.) Rivin. tetrap. t. 12.

Habitat in insula Petri, et ad fluvium lugam sed rarius. Gorter. Occurrit etiam in monte Pulcovo, et circa Murzincam et Ribaciam in pratis sylvaticis montosis. Sob. Floret Iunio. Iulio. ☉ Трилистникъ горный. Sobol.

481. TRIFOLIUM AGRARIUM. Spicis ovalibus imbricatis; vexillis deflexis persistentibus, calycibus subpubescentibus, stipulis cordatis ciliatis, foliolo impari petiolato, caule diffuso (interdum subdichotomo, foliis ferratis, capitulis oblongis, floribus quadripetalis luteis, vexillo plicatulo ferrulato.) (G.) Flor. dao. t. 558.

Habitat in agris cultis et pratis, Pargelovii, et Ligovi, et passim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Трилистникъ пашенный. Russ Sobol.

482. TRIFOLIUM SPADICEUM. Spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus pilosis, caule erecto. (Floribus rufescentibus.) Barr. pl. rar. ic. 1024.

Vulgatissima, in insula praesertim apothecaria, planta est, tum in monte Poclonnaja et ad viam Sarcofeliensem in pratis sylvosis humidis frequens. Vide ejus descriptionem in flora ingrlica. Gorteri. Floret Iunio, Iulio. ☉ Дикой хмблъ. Russ. Трилистникъ красноголовый. Sobol.

483. **TRIFOLIUM FLEXUOSUM.** Spicis subglobofis villofis terminalibus, caule adscendente flexuoso ramofissimo, foliolis ovato-lanceolatis serrulatis. (Stipulae strictae inferne lineis rubellis, ad oras, ut folia maculata maculis albescentibus, hirsutulis; calyces decemstriati ochroleuci superne purpurascens, lacinia infima longitudine corollae dilute rubentes. Roth. flor. gern. 1. p. 314.

Habitat circa Petropolim. Rudolph. Ad margines sylvarum in pratis elevatis, circa Sarsoje felo. Sob. Floret Iunio, Iulio. Durationis incertae. Трилистникъ изгибистый. Russ. Sob.

LOTUS. Calyx tubulosus. Alae sursum longitudinaliter conniventes. Legumen teres, strictum, (multis) loculamentosum, fractum seminibus inflexum. (Vexillum ungue oblongo concavo. Stigma punctum inflexum. Legumen saepius membranaceo-quadrangulare.)

484. **LOTUS CORNICULATUS.** Capitulis depressis decumbentibus herbaceis, leguminibus patentibus. (Caulibus purpureis, foliis oblique cordatis subamplexantibus, floribus umbellatis flavis, leguminibus cneiformibus, compressis, maculatis. Variat flore majore luteo splendente, prout in udis, fabulosis vel in alpidis crescit.) Curtis flor. Londin. t. 107.

Ad urbem Jamburgum inde inferiora versus fluvii Lugae in pascuis vulgaris est planta. Gorter. Occurrit. etiam in Strelinae pratis elevatis et ad littus maris arenosum. (Sob.) Floret Iunio, Iulio. 2 Леденецъ рожковатый. Russ. Sob.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA

POLYANDRIA.

HYPERICUM. Calyx quinquepartitus. Petala quinque. Filamenta capillaria multa basi in tres aut quinque phalanges connata. Stili tres, interdum unus duo, quinque; capsula loculis numero stylo-
rum polyspermis. (Petala secundum motum folis rotata.)

485. **HYPERICUM QUADRANGULUM.** Floribus trygynis, foliis ovatis, (trinervibus) caule quadrangulo (alato. Flores et calyces puri, vel in laciniarum margine punctati; stamina quindecim, folia margine reflexa.) (G.) Flor. dan. t. 640.

Habitat Pargelovii, in monte Poclonnaja et Ofinova Roszczca, in pratis humidis submontanis, uti circa Colodeci, et ad montem Pulcovium ejusque in viciniis copiose provenit. Floret Julio. 24 Звѣробой четвероугольный. Russ. Sob.

486. **HYPERICUM PERFORATUM.** Floribus trygynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis. (Petalis oblique-truncatis crenulatis puncto atro inter crenas notatis. Variat: foliis pellucido-et obscure punctatis, et petalis calyce minoribus acuminatis integris. Stamina viginti

178 CL· XVIII. POLYADELPHIA POLYANDRIA.

unum. Antherae puncto atro. Stigmata sanguinea. (G.) Blackw. herb. t. 15. Hypericum offic.

In infula rotunda frequens est; in pratis sylvaticis, nemorosis infularum apothecariae, lapideae, et in monte Poclonnaja, copiose provenit. Floret Junio, Julio. 24 Звѣробой. Russ. Звѣробой проколошый. Sobol.

487. HYPERICUM HIRSUTUM. Floribus trigynis, calycibus ferratoglandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis subpubescentibus, (pedicellatis perforatis. Petala lineolis nigris notata. Variat, foliis oppositis ternatis, caulibus admodum foliosis, foliis non punctatis, atroviridibus, floribus puris. (G.) Flor. dan. t. 303.

Habitat circa Petropolim in locis montosis apricis, uti Pargelovii, et Ofinovae Roschze. Floret Junio, Julio. 24 Звѣробой мохнашый. Russ. Sobol.

C L A S S I S X I X.

S Y N G E N E S I A

P O L Y G A M I A A E Q U A L I S.

SCORZONERA. Receptaculum nudum. Calyx imbricatus, cylindraceus, squamis quindecim margine scariosis. Pappus plumosus.

488. SCORZONERA HUMILIS. Foliis lato-lanceolatis nervosis planis, caule subnudo unifloro.

CL. XIX. SYNGENES. POLYGAM. AEQUALIS. 179

(Folia glauca varia, petala linearia sulphurea; lactescit lacte demum aurantiaco.) (G.) Flor. dan. t. 816.

Habitat in pratis fylvofis, circa fluvium Strelnaja, et in viciniis Fabricae pyriae Ochtenfis, Pargelovii, Murinae, et passim. Floret Majo, Iunio. 24 ушовникъ. five Козелецъ. Russ. Козелецъ низкій. Sobol.

PICRIS. Receptaculum nudum. Calyx duplicatus, exterior pentaphyllus. Pappus plumosus. Semina transversim fulcata.

489. **PICRIS HIERACIOIDES.** Perianthiis laxis, foliis integris, pedunculis squamatis in calycem. (Scapus plerumque dichotomus villis rigidus; folia radicalia dentata, superiora amplexicaulia; femina flavescentia. Pedunculi in calycem usque adspersi squamis subulatis. Tota scabra, fetis furcatis obfita. Caulis uno latere purpurascens (G.) Sow. Engl. bot. t. 196.

Habitat ad limites agrorum et in pratis circa Sarcoje felo, et Crafoje felo. Floret Iunio. 24 Горчавка сокольная. Russ. Sobol.

SONCHUS. Receptaculum nudum. Calyx imbricatus basi ventricosus. Pappus capillaris sessilis.

490. **SONCHUS PALUSTRIS.** Pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi aristatis. (B.) Flor. dan. t. 1007.

Crescit in paludibus et humidis circa Petropolim. Floret Iunio, Iulio. 24 Молочай болотный. Russ. Sobol.

491. **SONCHUS ARVENSIS.** pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis. (Calycibus villosis, floribus maximis. (Sob. R.) Flor. dan. t. 606.

Habitat in agris et inter fegetes circa Ligovam, Goreloj cabac, tum in hortis passim. Floret Iunio, Iulio. ☿ Молочай полевой. Russ. Sobol.

492. **SONCHUS OLERACEUS.** Pedunculis tomentosis, calycibus glabris, umbella terminali brevior. (G.) Var. β *Sonchus laevis.* foliis amplexicaulibus laciniatis latioribus calycibus laevibus. (Sob.) Flor. dan. t. 682.

Var. γ *Sonchus asper.* Foliis amplexicaulibus rigidiusculis integris aut semipinnatis, petiolo foliaceo ferrato, pinnis triangularibus ferratis. (Sob.) Flor. dan. t. 843.

In ruderalis et hortis oleraceis passim. Floret Iunio, Iulio. ○ Молочай огородный. Russ. Sobol.

493. **SONCHUS SIBIRICUS.** Pedunculis squamatis, foliis lanceolatis indivisis sessilibus. Flores caerulei. (G.) Kniph. bot. orig. cent. 10. n. 82.

Habitat in superiori regione Nevae fluvii in utraque ejus ripa locis humidis umbrosis, et in plurimis hortis oleraceis atque ad sepes hortorum insulae basileensis. Floret Iulio, Augusto. ☿ молочай сибирский. Sobol.

LEONTODON. Receptaculum nudum punctatum. Calyx imbricatus, squamis interioribus linearibus linearibus parallelis, exterioribus tandem reflexis. Pappus capillaris stipitatus.

CL. XIX. SYNGENES. POLYGAM. AEQUALIS. 181

494. **LEONTODON TARAXACUM.** Calyce squamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis laevibus. (G.) dan. Flor. t. 574. (Pappus stipitatus plumosis: Taraxacum officinale nonnullorum.) Taraxacum, officin.

Crescit ubivis in pratis et ad vias. Floret Majo, Junio. 24 Хасимб, попово гуменцо. et одуванчики. Russ. Одуванчикъ аптекарскій. Sob.

495. **LEONTODON AUTUMNALE.** Caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris, pappo subfessili. (Foliis lanceolato-pinnatifidis: pinnis patentibus linearibus longissimis. Variat foliis minus incis. (Sob. B.) Flor. dan. t. 501. Apargia autumnalis.

Habitat in pratis agrisque incultis et ad vias ubique. Floret Iulio, Augusto. 24 Одуванчикъ осенній. Sob.

496. **LEONTODON HISPIDUM.** Calyce toto erecto, folis dentatis integerrimis hispidis: fetis furcatis. (Variat foliis sinuatis, subruncinatis, pilosis scabris. Scapus sursum incrassatus calyx que pilis rigidis hispida.) (G.) Flor. dan. t. 862. Apargia hispida. Variet. Foliis glaberrimis.

Habitat in pratis sylvaticis prope fluvium et vicum Strelina, in pascuis superiorum regionum Nevae fluvii, in monte Duderovo, ad pagum Colodeci, et Ofinova Roschcza satis in magna copia cum sua varietate. Floret Iunio, Iulio. 24 Одуванчикъ шершавый. Russ. Sobol.

HIERACIUM. Receptaculum nudum, ut plurimum. Calyx imbricatus, ovatus, squamis pluribus li-

nearibus valde inaequalibus, interdum calyculatus. Pappus ut plurimum sessilis capillaris, rarius stipitatus plumosus ve.

497. *HIERACIUM PILOSELLA*. Foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro. (Stolonibus pilosis, corolla extus subrubella. Variat scapo trifloro vel multifloro, foliis tomentosis subtus scabris, dentatis et integerrimis.) (G.) Flor. dan. t. 1108. Auricula muris, officin.

Nihil vulgatius hac planta in pascuis et pratis sylvestribus siccis, praesertim in insulis Nevae fluvii. Floret Majo, Iunio. 24 мышье ушко. Russ. Сокольникъ волосатый. Sob.

498. *HIERACIUM DUBIUM*. Foliis integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro. (Caulis hirtus. Folia hirta, praesertim subtus.) (Sob. B.) Flor. dan. t. 1044.

Habitat in sylvis ficioribus insulae apothacariae lapideae et passim. Floret Iunio, Iulio. 24 Сокольникъ сумнительный. Russ. Sobol.

499. *HIERACIUM AURICULA*. Foliis integerrimis lanceolatis, stolonibus repentibus scapo nudo multifloro. (Amodum variat, caule interdum et foliis hirtis.) (Sob. B.) Flor. dan. t. 1109.

Habitat in pratis aridis montosis Pargelovii, in monte Poclonnaja, ad Fabricam pyriam Ochtershem et passim in locis similibus. Floret Iunio, Iulio. 24 Сокольникъ ушковатый. Russ. Sob.

500. *HIERACIUM CYMOSUM*. Foliis lanceolatis integris pilosis, scapo subnudo basi piloso, flori-

bus subumbellatis. (Caules striati, calyces incarni hirsuti. Lactescit.) (Sob. B.) (Habitus procerus. Scapus bipedalis deorsum villosus. Folia radicalia plura obsolete dentata basi villosa.) Flor. dan. t. 810.

Habitat in monte Poclonnaja, Pargelovii, aliisque in locis elevatis ficcis. Floret Iunio, Iulio. 24 Сокольникъ верхоцвѣтный. Russ. Sob.

501. **HIERACIUM PRAEMORSUM.** Foliis ovatis subdentatis, scapo ramofo, floribus superioribus prioribus- (G.) Gmelin. flor. sib. 2. t. 13. f. 2. Flor. dan. t. 942.

Habitat in pratis juxta viam Peterhovianam, et circa Ligovo, Goreloy cabac atque Pargelovii. Floret Iulio, Augusto. 24 Сокольникъ короткокорный. Russ. Sobol.

502. **HIERACIUM AURANTIACUM.** Foliis integris, caule subnudo simplicissimo piloso corymbifero. (Floribus aurantiacis amplis, odore violarum, calycibus pilis atris; foliis pilis rigidulis incanis.) (R.) Jacq. fl. austr. v. 5. t. 410.

Habitat in montosis sylvaticis circa Petropolim parcius. Floret Iunio, Iulio. 24 Сокольникъ помаранцовый. Russ. Sobol.

503. **HIERACIUM MURORUM.** Caule ramofo, foliis radicalibus ovatis dentatis petiolatis; caulibus minoribus. (G.) Blackw. herb. t. 538.

Habitat passim in sylvis ficcioribus montosis. Floret Iulio. 24 Сокольникъ стѣнный. Russ. Sob.

504. **HIERACIUM PALUDOSUM.** Caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, ca-

184 CL. XIX. SYNGENES. POLYGAM. AEQUALIS.

Iycibus hispida, (*pilis nigris*, *floribus parvis*)
(G.) Flor. dan. t. 928.

Habitat in pratis humidis sylvosis insulae apothecariae, lapideae, *Caterinhoffii*, et passim. Floret Junio, Julio. 2. Сокольникъ болошный. Russ. Sobol.

505. *HIERACIUM SABAUDUM*. Caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis semi-amplexicaulibus. (Caulis fulcatus scaber. Rami axillares foliosi multiflori. Folia ovato-lanceolata, sinuata. Flores corymbosi.) (B.) Flor. dan. t. 872.

Habitat in pratis sylvosis siccis circa Petropolim. Floret Julio. 2. Сокольникъ савойскій. Russ. Sobol.

506. *HIERACIUM UMBELLATUM*. Foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis. (Calyx squarrosus. Caulis laevissimus. Folia floralia sub umbella spuria quatuor inaequalia. Flos centralis strictus ceteris major.) (G.) Flor. dan. t. 680.

Habitat in sylvis superiorum regionum Nevae fluvii, ad Fabricum pyriam Ochtensem, et ad viam Sarcofeliensem nec non Pargelovii frequens est. Floret Julio. 2. Сокольникъ щипоцвѣтный. Russ. Sobol.

CREPIS. Receptaculum nudum. Calyx calyculatus, exterior deciduus. Pappus capillaris stipitatus, (plumosus, Gmel. S. N.)

507. *CREPIS TECTORUM*. Foliis lanceolato-runcinatis sessilibus laevibus, inferioribus dentatis.

(Caule laevi. Folia interdum scabra; squamae calycis apice sphacelatae duodecim aut tridecim; caulis ut plurimum fulcatus.) (G.) Flor. dan. t. 501.

Habitat in monte Duderovo, et circa Crasnoje felo, atque in aridis ad pagum Murina. Floret Iulio. ☉ Скрипуха кровельная. Russ. Sob.

508. CREPIS BIENNIS. Foliis runcinato pinnatifidis scabris: basi superne dentatis, calycibus muricatis. (Caulis tripedalis, subramosus hinc inde scaber. Folia subtus pilosa. Calyx pilis glanduliferis nigrescentibus obtectus: squamulae patulae glabrae.) (G.) Bauh. hist. pl. 2. p. 10. 25. ic. Variat foliis omnibus fere integris; vel superioribus integris, inferioribus pinnatifidis et dentatis. (G.)

Ad vias et in agris incultis frequens est. Floret Iulio. ♂ Скрипуха двулѣшняя. Russ. Sob.

HYPOCHAERIS. Receptaculum paleaceum. Calyx subimbricatus, basi ventricosus. Pappus plumosus stipitatus.

509. HYPOCHAERIS MACULATA. Caule subnudo: ramo solitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis, (flore magno: hirsutiae incana, femina rugosa, foliis maculis rubris.) (G.) Fl. dan. t. 149.

Habitat in pratis elatioribus sylvosis ad fluvium Strelnaja, in montosis Duderovi, Crasnoselii et ad viam Wiburgensem, Pargelovii, ahisque in locis similibus. Floret Iunio. ♀ Ястребная трава. Russ. Ястребка пятнистая. Sobol.

510. HYPOCHAERIS RADICATA. Caule ramofo nudo laevi, foliis runcinatis optufis fcabris, pedunculis fquamofis. (Calycum fquamulae carina ciliata, fpinulofae, pappus fetis triginta.) (G.) Flor. dan. t. 150.

Habitat in pratis et fylvis, circa Caterinhoffium in monte Poclonnaja et ad viam Peterhoffianam. Floret Iunio, Iulio. ♀ Ястребка коренастая. Russ. Sob.

LAPSANA. Receptaculum nudum. Calyx calyculatus, ovatus, angulatus, fquamis tubi octo linearibus, cavo-canalicalatis, carinatis, bafeos fex, alternis minimis. Pappus nullus.

511. LAPSANA COMMUNIS. Calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramofiffimis. (Foliis pinnatifidis, segmento ultimo ovato finuato dentato, inferioribus lyratis planis; flofculis octo-decim ant viginti duobus.) (G.) Flor. dan. t. 500.

Habitat in cultis et ad rudera domorum frequens. Floret Iunio, Iulio. ☉ Бородавочная трава. Russ. Бородавчица обыкновенная. Sob.

CICHORIUM. Receptaculum subpaleaceum. Calyx calyculatis, iterior fquamis octo, exterior quinque. Pappus subquinquedentatus obfolete pilofus.

512. CICHORIUM INTYBUS. Floribus geminis fessilibus, foliis runcinatis, (fquamis calycinis octo longioribus, quinque brevioribus, floribus caeruleis.) (G.) Flor. dan. t. 907. Cichorium, officin.

CL. XIX. SYNGENES. POLYHAM. AEQUALIS. 187

Habitat ad margines agrorum circa Ribaciam, et in superiori regione Nevae fluvii, in prato vero juxta hortum Palatii imperialis aestivi omnes plantae nunc destructae sunt. Floret. Junio, Julio. 2 Цихорій дикій. Russ.

ARCTIUM. Calyx globosus, squamis apice hamis inflexis.

513. **ARCTIUM LAPPA.** Foliis cordatis inermibus petiolatis, capitulis tomentosis. (G.) Flor. dan. t. 642. Bardana, officin. Variet. β Arctium glabrum, foliis cordatis inermibus, calycibus glabris primo conicis, demum haemisphaericis. (Sob.) Schkuhr Handb. 49. t. 227.

Habitat *a*, in locis cultis et ruderalibus ubique. Var. β in meridionali regione Nevae fluvii; prope vicum Uljankam, et ad sepes hortorum. Sob. Floret Julio, Augusto. ♂ Лопушникъ five Репейникъ. Russ.

SERRATULA. Calyx subcylindricus, imbricatus, muticus; squamis lanceolatis acutis.

514. **SERRATULA TINCTORIA.** Foliis lyratopinnatifidis; pinna terminali maxima, flosculis conformibus. (Folia ciliata; calycis squamae margine albidae.) Variat foliis integris. (Sob. R.) Flor. dan. t. 281.

Habitat in pratis sylvestribus circa pagum Ochtam et prope ejus Ecclesiam, atque in viciniis Sarfkofelii et montis Pulcovi. Floret Julio, Augusto. 2 Серпуха. Russ. Серпуха красивая. Sob.

515. **SERRATULA ARVENSIS.** Foliis dentatis spinosis, (lanceolatis; floribus purpurascensibus.

188 CL. XIX. SYNGENES. POLYGAM. AEQUALIS.

Variat foliis glabriusculis, subtus albedo-tomentosis.) (G.) Flor. dan. t. 644.

Habitat in sylvis ad ripas Nevae fluvii et inter fegetes Pargelovii, prope Ligovo et Cresnoy cabac et passim. Floret Iunio, Iulio. ♀ Серпуха полевая. Russ. Sobol.

CARDUUS. Calyx ventricosus, imbricatus, squamis numerosis spinosis. Receptaculum pilosum. Pappus sessilis pilosus.

516. **CARDUUS LANCEOLATUS.** Foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis: laciniis divaricatis, lanceolatis calycibus ovatis spinosis villosis, caule piloso. (Flore purpureo.) (G.) Tabern. Kraeuterb. p. 699. ic.

Habitat ad sepes et ad ductus aquarum ubique. Floret Iulio, Augusto. ♂ Колючка копьелистая. Russ. Sob.

517. **CARDUUS CRISPUS.** Foliis decurrentibus sinuatis margine spinosis, floribus aggregatis terminalibus; squamis calycis inermibus subaristatis patulis. (Caulis ramosissimus divaricatus, flores nutantes.) (G.) Flor. dan. t. 621.

Ad sepes hortorum et ad vias passim. Floret Iunio, Iulio. ☉. Колючка кудрявая. Russ. Sob.

518. **CARDUUS PALUSTRIS.** foliis decurrentibus dentatis margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. (Folia linearia spinosissima, caule alto ut plurimum simplici crispo, floribus conglomeratis subverticillatis terminalibus rubris, calycis squamis viscosis rubentibus.) (G.) Moriss. hist. pl. 3. t. 32. 13.

Habitat in sylvis paludosis circa Murinam, Strelinam, Caterinhoffii, et in multis aliis locis similibus. Floret Iulio. 2/4 Колючка болотная Russ. Sob.

519. **CARDUUS HETEROPHYLLUS.** Foliis amplexicaulibus lanceolatis ciliatis integris laciniatisque, caule subunifloro, calyce inermi, (foliis inaequaliter spinuloso-ciliatis, subtus niveis tomentosis, caule sub trifloro. Caulis niveo obductus tomento.) (G.) Flor. dan. t. 109.

In ripa fluvii Nevae circa Caterinhoffium, in infulis lapidea rotundaque et ubique in pratis humidis sylvosis frequens est. Floret Iunio, Iulio. 2/4 колючка разнолистная. Russ. Sob.

520. **CARDUUS TATARICUS.** Foliis amplexicaulibus lanceolatis: ferraturis spinoso-fetaceis, floribus triphyllis. (Flores odorati albidi antheris principio purpureis, dein fuscis. Calyces externe villis arachnoideis.) (Sob.) Jacq. flor. austr. s. t. 90.

Habitat in monte Pulcovo, tum in sylvis humidis inter Sarcoje selo, Gatzinam, et Montem Duderovium. Floret Iunio, Iulio. 2/4 колючка татарская. Russ. Sob.

CNICUS. Calyx ovatus, imbricatus, squamis ramoso-spinosis, (сапе) obvallatus bracteis. Corollulae aequales. Receptaculum planum villosum, pappo sessili plumoso.

521. **CNICUS OLERACEUS.** Foliis amplexicaulibus pinnatifidis glabris, bracteis concavis integris subcoloratis. (Flores ochroleuci, calycibus

inermibus, inter folia flavicantia.) (G.) Flor. dan. tab. 860.

Crescit in fylvis subhumidis et in hortis oleraceis passim. Floret Iulio, Augusto. ♀ Осомб, five осемб. Russ. Осомб кухонный Sob.

CARLINA. Calyx radiatus imbricatus, squamis marginalibus longis coloratis. Receptaculum paleis ternis fissis.

522. **CARLINA VULGARIS.** Caule multifloro corymbofo, floribus terminalibus, calycum radio albo. (Caule folioso.) (G.)

Habitat in locis ficcioribus elevatis passim, praefertim circa montem Duderovium, et Crasnoje Selo. Floret Iulio, Augusto. ♂ Пуховник Russ. Пуховник обыкновенный. Sob.

BIDENS. Receptaculum paleaceum, paleis deciduis. Pappus aristis duabus pluribus ve duabus majoribus erectis scabris. Calyx imbricatus. Corolla rarius flosculo uno altero ve radiante instructa.

523. **BIDENS TRIPARTITA.** Foliis trifidis, calycibus subfoliosis, feminibus erectis. (Foliis trilobatis et quinque lobatis serratis.) (G.) Knorr del. hort. 2. t. B. 1. f. 2.

In paludibus insulae apothecariae et passim ad ductus aquarum circa vias frequentissima planta est. Floret Iunio, Iulio. ⊙ двузубец. Russ. двузубец прилистный. Sob.

524. **BIDENS MINIMA.** Foliis lanceolatis integerrimis sessilibus, flore recto solitario basi involucreto bracteis duabus, radice repente. (Radix repens, filiformis articulata. Folia plerumque ci

CL. XIX. SYNGENES. POLYGAM. AEQUALIS. 191

liata hinc inde subdentata. Flos erectus basi tantum bracteis duabus, rarissime tribus suffultus.) (B.) Flor. dan. t. 312.

Habitat in locis uliginosis circa urbem Jamburgum. Floret Iunio, Iulio. ☉ Двузубецъ малѣйшій. Russ. Sob.

525. BIDENS CERNUA. Foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, seminibus erectis. (Flore luteo, radicibus nudis.) (G. Flor. dan. t. 841.

Habitat in paludibus circa Ceterinhoffium ad ripas Nevae fluvii et in insulis apothecaria lapidea et Basileenſii alibique sed in minori quantitate quam B. tripartita. Floret Iunio, Iulio. ☉ Двузубецъ кривоцвѣтный. Russ. Sob.

EUPATORIUM. Receptaculum nudum. Pappus plumosus. Calyx inbricatus oblongus, squamis linearibus. Stylus ad stamina usque bifidus longifimus.

526. EUPATORIUM CANNABINUM. Calycibus quinquefloris, foliis digitatis, (Squamae calycinae oris rubellis.) (G.) Flor. dan. t. 745. Eupatorium, officin.

In insula Narovae fluvii, quae supra cataractas freques est, alias nullibi visa. Floret Iulio. ☉ конопельникъ, sive посконникъ Russ. Благородникъ конопельный. Sob.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

TANACETUM. Receptaculum nudum. Pappus nullus, vel membranaceus submarginatus. Calyx

imbricatus haemisphaericus. Corollae radii obsoletae, trifidae, lineari ligulatae, interdum nullae.

527. TANACETUM VULGARE. Foliis bipinnatis inciso ferratis. (Radius calidiore aestate prodit.) (G.) Flor. dan. t. 871. Tanacetum, officin.

Habitat in sylvis montosis, ad fabricam pyriam Ochtersen, Pargelovii, in monte Pulcovo, in insulis apothecaria, lapidea, petri, Basileensi et passim. Floret Julio, Augusto. 2 Дикая рябинка, five пижма. Russ. Пижма обыкновенная. Sob.

Variet. 3 Tanacetum vulgare foliis crispis.

Crescit in quantitate Petropoli in hortis cultis, oleraceis, et in sylvis circa Strelinam. Floret eodem tempore. 2 Пижма кудрявая. Russ. Sob.

ARTEMISIA. Receptaculum subvillosum vel nudiusculum. Pappus nullus. Calyx imbricatus: squamis rotundatis conniventibus. Corollae radii nullae.

528. ARTEMISIA CAMPESTRIS. Foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. (Flosculi racemosi alterni, solitarii, ultra quadraginta in calyce.) (G.)

Habitat in pratis ficcioribus, in monte Poclonnaja, Pulcovo, circa fabricam pyriam Ochtersen, et passim. Floret Julio, Augusto. 2 Чернобыльник полевой. Russ. Sob.

Variet. 3 Artemis. Camp. Caule foliisque atro rubris. (Sob.) Crescit ad viam Pargeloviensem in

CL. XIX. SYNGEN. POLYG. SUPERFLUA. 193

tis ficcioribus. Floret Iulio, Augusto. 2 Чернобыльникъ полевой темнокрасный. Sob.

529. ARTEMISIA ABSINTHIUM. Foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo villosis. (G.) Knorr. del. hort. 2. t. A. 17. Absinthium, officin.

Habitat circa pagos montis Duderovii et Crasnofelium, et circa urbem Staraja Ladoga frequens. Floret Iulio, Augusto. 2 Полынь, five Глициникъ. Russ.

530. ARTEMISIA VULGARIS. Foliis pinnatifidis planis incis, subtus tomentos, racemis simplicibus recurvatis, floribus radio quinquefloro. (Floribus rubellis, duodecim in calyce.) (G.) Blackw. herb. t. 431. Artemisia, officin. (Variat caule fusco purpureo.) Sob.

Habitat in ruderatis et cultis, circa sepes hortorum et in hortis oleraceis ubique frequentissima planta est. Floret Iulio, Augusto. 2 Чернобыльникъ, Russ. Чернобыльникъ обыкновенный. Sob.

GNAPHALIUM. Receptaculum nudum. Pappus plumosus vel capillaris. Calyx rotundatus imbricatus: squamis marginalibus rotundatis, scariofis, coloratis.

531. GNAPHALIUM DIOICUM. Sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici, floribus dioicis. (Foeminae calycibus rubellis. Variat folio longiore incano, flore albo svave-rubente purpureove. Pappi radii plurimi basi fetacei, apice penicillato-plumosi.) (G.)

Gaertn. de fruct. 2. p. 410. t. 167. f. 3. Gnaphalium, officin.

Habitat in infulis apothecaria, lapidea, et ubique in pratis ficcioribus. Floret Мајо, Iunio. ♀ Кошечья лапа, five Змбевикъ. Russ. Змбевикъ двудомный. Sob.

532. GNAPHALIUM ALPINUM. Sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, capitulo aphylo, floribus oblongis, (dense spicatis; foliis linearibus, villosulis.) (G.) Flor. dan. t. 332.

Habitat in montosis circa Novogrodium. Floret Iulio. ♀ Змбевикъ горный. Russ. Sob.

533. GNAPHALIUM SYLVATICUM. Caule simplicissimo erecto, floribus sparsis. (Pedunculis axillaribus multifloris, foliis lanceolato-linearibus femiamplexicaulibus.) (G.) Flor. dan. t. 254.

Habitat in fylvis, circa cemeteryum fti. Iohannis, in infulis apothecaria, lapidea et passim ad ductus aquarum. Floret Iulio. ♂ Змбевикъ лѣсный. Russ. Sob.

534. GNAPHALIUM ULIGINOSUM. Caule ramoso diffuso, floribus confertis terminalibus. (Calycibus fusco spadiceis, aridis, laxis.) (G.) Flor. dan. t. 859.

Habitat in locis uliginosis humidis apricis, et passim in hortis oleraceis. Floret Iunio, Iulio. ⊙ Змбевикъ болотный. Russ. Sob.

CONYZA. Receptaculum nudum, planum. Pappus capillaris. Calyx imbricatus subrotundus, squamis exterioribus patentiusculis. Corollae radii trifidae.

CL. XIX. SYNGEN. POLYG. SUPERFLUA. 195

535. *CONYZA SQUARROSA*. Foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymbofo, calycibus squarrosis. (Folia fere verbasci.) (vid. descript. Gubern. Petropol. Georgi.) Flor. dan. t. 622.

Habitat in pratis ficcis gramineis circa Petropolim rarius. Floret Iunio, Iulio. ♂ Богашница. Russ. Богашница чешуйчатая. Sobol.

ERIGERON. Receptaculum nudum. Pappus capillaris. Calyx oblongus squamis subulatis. Corollae radii lineares angustissimae.

536. *ERIGERON CANADENSE*. Foliis lanceolatis ciliatis, caule floribusque paniculatis hirtis. (R.) Hoffmann bot. Taschenb. 1791. t. 12.

Habitat circa Petropolim in agris cultis, rarius. Floret Iunio. Iulio. ☉ Блошница канадйская. Russ. Sob.

537. *ERIGERON ACRE*. Pedunculis alternis unifloris. (Flore caeruleo.) (G.) Iungh. pl. officin. ic. t. 12. Erigeron, officin.

Habitat in pratis ficcis sylvosis et montosis, in infulis apothecaria, lapidea, in monte Poclonnaja, et passim in locis similibus. Floret Iunio. 2 Блошница бдкая. Russ. Sob.

TUSSILAGO. Receptaculum nudum. Pappus capillaris. Calyx squamis quindecim aut viginti aequalibus, discum aequantibus, submembranaceis.

538. *TUSSILAGO FARFARA*. Scapo unifloro imbricato, foliis subcordatis angulatis denticulatis. (G.) Flor. dan. t. 595. Farfara, officin.

Habitat in locis editioribus argillofis humidis in utraque ripa Nevae fluvii circa Ochtam, et Fabricam Porcellaneam, in monte Pulcovo, et Strelina et passim. Floret Aprili, Majo. 2 Бблокопышникъ, five машъ да мачиха. Russ.

539. TUSSILAGO PETASITES. Thyrsu ovato, flosculis faemineis nudis paucis. (Flosculi faeminei inter hermaphroditos duo five tres, vix petaloidei, ligulati, albi. Pistillis exsertis clavatis.) (G.) Flor. dan. t. 842. Petasites, officin.

Habitat ad fluvium Lugam infra pagum Howskaia. Floret Aprili, Majo. 2 Подбѣлъ, five Чумный корень. Russ.

SENECIO. Receptaculum nudum. Pappus capillaris longus. Calyx conicus, calyculatus, squamis parallelis apice sphacelatis, paucioribus basin imbricatim tegentibus.

540. SENECIO VULGARIS. Corollis nudis foliis pinnato-finuatis amplexicaulibus, floribus sparsis. (Squamae omnes sphacelatae, calycis lacinae vero non omnes. Folia plana glabra.) (G.) Flor. dan. t. 515. Senecio, officin.

Crescit ubique in cultis et ruderatis. Floret a Majo, ad Octobrem. ☉ Старина обыкновенная. Russ. Sob.

541. SENECIO IACOBAEA. Corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto. (Flores lutei.) (G.) Flor. dan. t. 945.

Habitat ad ductum agrarum Ladogensem et in declivibus et pratis humidis sylvosis Ofinovae

CL. XIX. SYNGEN. POLYG. SUPERFLUA. 197

Rofchczae, et Dranicinae. Floret Iunio, Iulio. 2
Старина яковля. Russ. Sob.

542. **SENECIO PALUDOSUS.** Corollis radiantibus, foliis ensiformibus acute ferratis subtus villosis, caule stricto. (Foliis viscidulis semiamplexicaulibus floribus luteis.) (G.) Flor. dan. t. 385.

Habitat ad ductum aquarum Ladogensem in paludosis. Floret Iunio, Iulio. 2
Старина болотная. Russ. Sob.

543. **SENECIO SARRACENICUS.** Corollis radiantibus, foliis lanceolatis ferratis glabriusculis, floribus corymbosis. (Foliis anguste confertis, corollulis luteis subfoetentibus, radii flosculis octo. Radix amaricans, longissima, late reptans fibras numerosas emittens, hinc caules plures angulati glabri vestiti foliis angustis confertis. Corymbus foliis superioribus vix altior: ramis plerumque villosis.) (G.) Jacq. Flor. aust. 2. t. 186.

Habitat circe Ostium Narovae fluvii in salicto. Floret Iulio, Augusto 2
Старина сарацинская. Russ. Sob.

SOLIDAGO. Receptaculum nudum. Pappus capillaris. Corollae radii circiter quinque, remotae. Calyx squamis imbricatis angustis conniventibus.

544. **SOLIDAGO VIRGAUREA.** Calyce erecto tereti pubescente superne ramoso, racemis erectis foliis inferioribus ellipticis ferratis. (Flosculi in radiis quinque aut decem.) (G.) Flor. dan. t. 663. Virga aurea. officin.

Crescit in sylvis et pascuis passim. Floret Iulio. 2
Золотушникъ, five Золотая розга, Russ.

CINERARIA. Receptaculum nudum. Pappus capillaris. Calyx simplex polyphyllus, foliolis aequalibus.

545. **CINERARIA SIBIRICA.** Racemo simplici, foliis cordatis obtusis denticulatis laevibus, caule simplicissimo monophyllo. (Bractee duae, emarcescentes.) (Sob. B.) Amman. ruth. t. 24.

Habitat circa urbem Gatzinam et in monte Duderovo. Floret Iulio. 24 Пепельникъ сибирскій. Russ. Sob.

546. **CINERARIA GLAUCA.** Racemo simplici, foliis spathulatocordatis integerrimis, caule simplicissimo. (Folia colore crambes maritimae, subcarnosa, glauca, petiolis marginato-spathulatis.) (Sob. R.) Gmelin. Flor. sib. t. 74.

Habitat in monte Duderovo et circa pagum colodeci in sylvis montosis. Floret Iunio, Iulio. 24 Пепельникъ сизый. Russ. Sob.

INULA. Receptaculum nudum. Pappus capillaris. Antherae basi in fetas duas desinentes.

547. **INULA HELENIUM.** Foliis amplexicaulibus ovatis rugosis subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. (G.) Flor. dan. t. 728. Enula, officin.

Habitat ubique in hortis et ad saepes hortorum spontanea. Floret Iulio, Augusto. 24 Девясилъ, Russ. five девясилъ большій.

548. **INULA DYSENTERICA.** Foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, caule villoso paniculato,

calycis squamis fetaceis, (floribus subdorymbosis.)
(G.) Flor. dan. t. 410.

Habitat ad fossas et canales infularum basileensis, et lapideae, nec non ad vias prore. Nofocomium pedestre, et in aliis locis humidis. Floret Iulio, Augusto. 2 Девясилъ меншій. Russ.

549. INULA SALICINA. Foliis lanceolatis recurvis ferrato-scabris, ramis angulatis, floribus inferioribus altioribus, (squamarum calycinarum ordine inferiori rufescente erecto, foliis villosis.)
(G.) Flor. dan. t. 786.

Habitat in pratis ficcioribus herbosis et sylvosis in monte Duderovo, et circa Gatzzinam. Floret Iulio. 2 Девясилъ верболистый. Russ. Sob.

CHRYSANTHEMUM. Receptaculum nudum convexum, punctatum. Pappus marginatus, vel nullus. Calyx hemisphaericus imbricatus: squamis marginalibus membranaceis, intimis terminatis squama scariofa. Semina coronata.

550. CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM. Foliis amplexicaulibus oblongis superne ferratis inferne dentatis. (Germina flosculorum decagona, stylis croceis.) (G.) Blackw. herb. t. 42.

In pratis ficcioribus frequens est. Floret Iunio, Iulio. 2 Ивановъ цвѣтъ. Russ.

551. CHRYSANTHEMUM INODORUM. Foliis pinnatis multifidis, caule ramofo diffuso. (Semina quadrangularia marginata, latere transversim fulcata. Pedunculi nudi apice inprimis fulcati. Petioli deorsum latiusculi. Receptaculo conico to-

to nudo et squamis margine nigricantibus, nec non odoris defectu ab Anthemide arvensi et Cotula etc, facile dignoscitur.) (R. B.) Flor. dan. t. 896. Habitat in sylvis montosis circa Petropolim rarius. Floret Iulio. ☉ Ивановъ цвѣтъ бездушный. Russ. Sob.

552. CHRYSANTHEMUM SEGETUM. Foliis amplexicaulis: superne laciniatis, inferne dentato-ferratis. (Sob. R. B.) Flor. dan. t. 995.

Habitat inter fegetes et ad margines agrorum. circa Ligovo et Crafoje selo. Floret Iunio, Iulio. ☉ Ивановъ цвѣтъ нивяный, five полевой. Russ. Sob.

MATRICARIA. Receptaculum nudum, convexum. Pappus nullus. Calyx haemisphaericus imbricatus: squamis marginalibus solidis, acutiusculis, non scariosis.

554. MATRICARIA PARTHENIUM. Foliis compositis planis: foliolis ovatis incisis, pedunculis ramosis. (Sob. B.) Flor. dan. t. 674. Matricaria officin.

Habitat circa Petropolim et in ipsa urbe ad fepes hortorum et in hortis oleraceis, atque in ruderatis. Floret Iunio, Iulio. ♂ Мамочная трава. Russ. Мамочница. Sob.

554. MATRICARIA CHAMOMILLA. Receptaculis conicis, radiis patentibus, squamis calycis margine aequalibus. (Tota glaberrima dilute viridis. Foliis pinnatis, pinnis capillaribus multifidis. Calyx margine scariosus, flosculis viginti aut vigintiduobus. Receptaculum acute conicum. Semina striata.) (G.) Zorn pl. officin. ic. 139. Chamomilla vulgaris, officin.

CL. XIX. SYNGEN. POLYG. SUPERFLUA. 201

Ad ductus aquarum in locis arenosis, et agris desertis, nec non inter fegetes circa Ribacziam, et Ligovo, atque in hortis oleraceis et ruderatis in urbe Petropoli frequens est. Floret Iunio, Iulio. ☉ Ромашка просная. Russ.

ANTHEMIS. Receptaculum paleaceum, conicum. Pappus nullus. Calyx haemisphaericus, subaequalis. Flosculi radii plures quam quinque.

555. ANTHEMIS ARVENSIS. Receptaculis conicis: paleis fetaceis, feminibus coronato-marginatis. (Foliis duplicato-pinnatis, caule striato, radio discolori five albo.) (Sob. B.) Kniph. bot. orig. cent. 11. n. 5.

Habitat in pratis ficcis argillofis et inter fegetes circa Ligovo, Goreloy cabac, et Ofinova Roschcza. Floret Iulio, Augusto. ♂ Пупавка полевая. Russ. Sob.

556. ANTHEMIS COTULA. Receptaculis conicis: paleis fetaceis, feminibus nudis. (Foliis duplicato-pinnatis glabris pinnulis linearibus, nervo foliaceo: caulibus diffusis, radio albo; Semine laevi. Odore foetido.) (Sob.) Blackw. herb t. 67. Cotula foetida, officin.

Crescit in regionis petropolitanae hortis oleraceis, et ubique ad pagos et vias in locis ruderatis et inter fegetes. Floret Iunio, Iulio. ☉ Собачья ромашка. Russ. Пупавка вонючая. Sob.

557. ANTHEMIS PYRETHRUM. Caulibus simplicibus, foliis pinnato-multifidis. (Radio albo; foliis glabris, imis petiolatis palmatis, ad caulem femipinnatis. Facies matricariae, sed flos specio-

fior, disco luteo, radiis albis nervosis, plerumque bidentatis.) (G.) Mill. hort. angl. t. 38. Pyrethrum, officin.

Habitat ad fluvium Wolchow, in pratis circa pagum Czortovo. Floret Iunio, Iulio. 2 Огневица five Пупавка огневая. Russ. Sob.

558. ANTHEMIS TINCTORIA. Radio flavo, concolore, foliis bipinnatis ferratis subtus tomentosis, caule corymbofo. (Foliorum laciniis linearibus, floribus pedunculatis, luteis.) (G.) Flor. dan. t. 741.

Habitat in montosis asperis sylvaticis et agris, circa pagum Ostrowki, ad vias Ligovi, Crasnofelii et in monte Duderovo, nec non Pargelovii, aliisque in locis similibus. Floret Iulio, Augusto. 2 Пупавка красильная. Russ. Sob.

ACHILLEA. Receptaculum paleaceum, elevatum. Pappus nullus. Calyx ovatus imbricatus, squamis conniventibus ovatis. Flosculi radii quinque aut decem.

559. ACHILLEA PTARMICA. Foliis lineari-lanceolatis amplexicaulibus ferrulatis. (Flore albo.) (G.) Flor. dan. t. 643. Ptarmica, officin.

In sylvis et ad margines agrorum nusquam hospes est. Floret Iunio, Iulio. 2 Чихотная трава. Russ.

560. ACHILLEA MILLEFOLIUM. Foliis bipinnatis nudis, pinnarum laciniis linearibus dentatis, caulibus superne sulcatis. (Variat flore albo et rubro.) (G.) Flor. dan. t. 737. Millefolium, officin.

In locis ficcioribus et ad vias passim occurrit. Floret Iunio, Iulio. 2 Гулявица, five деревей. Russ. Variet. β flore rubro, in montosis Pargelovii, et Ofinovae Roschcaez, Peterhovii et in Oranienbaum, atque Strelina copiose provenit. (Sob.)

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

COREOPSIS. Receptaculum paleacem. Semina cincta margine membranaceo, apice bicorni aut quadricorni. Calyx erectus polyphyllus; exterior foliolis saepe octo (floribus totidem) in orbem positus, interior totidem majoribus membranaceis coloratis.

561. **COREOPSIS BIDENS.** Foliis lanceolatis ferratis oppositis amplexicaulibus, pappo bicorni. (R.) Moris. hist. 3. t. 5. 25.

Crescit ad fossas et ductus aquarum circa Petropolim. Floret Iulio, Augusto. ☉ Клоповница двузубая. Russ. Sob.

CENTAUREA. Receptaculum setosum. Pappus plumosus vel capillaris. Corollae radii infundibuliformes longiores, irregulares.

562. **CENTAUREA PHRYGIA.** Calycibus recurvato plumosis, foliis indivisis oblongis scabris. (Caulis fulcatus multiflorus. Folia lanceolata subferrata. Ciliis calycis longis reflexis fuscis.) (G.) Flor dan. t. 520.

Habitat in pratis circa Caterinhoffium et passim in sylvis montosis. Floret Iunio, Iulio. 2 Чер-

шополохъ, five Лоскутный цвѣтъ. Russ. Лоскушница пѣристая. Sob.

563. **CENTAUREA CYANUS.** Calycibus ferratis, foliis linearibus integerrimis, infimis dentatis. (Corollis radiantibus horizontalibus novem.) (G.) Flor. dan. t. 993. Cyanus, officin.

Est vulgetissima inter fegetes. Floret Iunio, Iulio. ☉ Василекъ. Russ.

564. **CENTUAREA SCABIOSA.** Calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis. (Caulis et folia scabra. Ramo terminari flore perpetuo brevior. Variat: foliorum pinnis lanceolatis et linearibus.) (G.) Sowerby engl. bot. t. 56.

Habitat in monte Pulcovo. circa Strelinam, in monte Poclonnaja et Murinae, aliisque in locis montosis et sylvosis. Floret Iunio, Iulio. 2 Лоскушница свербѣжнолистная. Russ. Sob.

565. **CENTAUREA JACEA.** Calycibus scariofis laceris, foliis lanceolatis: radicalibus finuato-dentatis, ramis angulatis. (Squamis calycinis lamina fusca. Variat foliis radicalibus integris et pinnatifidis.) (G.) Flor. dan. t. 519.

Habitat in sylvis et pratis passim. Floret Iulio, Augusto. 2 Лоскушница шелушчатая. Russ. Sob.

POLYGAMIA NECESSARIA.

FILAGO. Receptaculum nudum, paleis ad latera calycis flosculos distinguentibus. Pappus nullus, vel brevis simplex. Calyx imbricatus. Flosculi foeminei partim apetalii inter squamas calycis locati.

566. **FILAGO MONTANA.** Caule subdichotomo erecto, floribus conicis terminalibus axillaribusque. (Sob.) Lob. ic. 481.

In monticulis arenosis et sylvosis Pargelovii factis raro occurrit. Floret Iunio, Iulio. ☉ Жабная права, sive Горлянка. Russ. Горлянка горная. Sob.

567. **FILAGO ARVENSIS.** Caule paniculato, floribus Conicis lateralibus. (Foliis mollissimis tomentosis, florum acervis sessilibus in spicas continuatis.) (Sob. R.)

Habitat in arvis montosis Ligovi, Crasnofelii, et ad pagum Rjabowa, rarius. Floret Iunio, Iulio. ☉ Горлянка полевая. Russ. Sob.

MONOGAMIA.

LOBELIA. Calyx quinquefidus. Corolla monopetala, irregularis. Tubus calyce longior superne divisus. Limbus quinquepartitus. Capsula infera, bi-five trilobularis, bi-five trivalvis.

568. **LOBELIA DORTMANNIA.** Foliis linearibus bilobularibus integerrimis, caule subnudo. (L.) Flor. dan. t. 39.

Habitat ad littus insulae Crucis et passim in aqua ad ripas minorum ramorum Nevae fluvii. Floret Iulio. ☽ Лобелия дортманская. Russ. Sob.

VIOLA. Calyx pentaphyllus, supra basin corollae adhaerens. Corolla pentapetala, irregularis, postice cornuta. Stamina lamina germen tegentia, antheris apice cohaerentibus. Capsula trivalvis unilobularis.

569. VIOLA HIRTA. Foliis cordatis piloso-hispidis. (Flores dilute violacei albidique, petalo inferiore emarginato.) (G.) Flor. dan. t. 618.

Habitat in montosis et umbrosis Duderhovii. Floret Majo. 24 Фіялка. Russ. Виолешка мохнатая. Sob.

570. VIOLA PALUSTRIS. Foliis reniformibus, Crenulatis, longe petiolatis, scapo medio squamis duabus sessilibus, petalis duobus superioribus dilute caeruleis decurrentibus in unguem, lateralibus transverse villosulis albidis, infimo maximo integro.) (G.) Flor. dan. t. 83.

In pratis humidis sylvosis infularum basileensis, apothecariae, et lapideae alibique copiose provenit. Floret Majo. 24 Виолешка болотная. Russ. Sob.

571. VIOLA ODORATA. Foliis cordatis, stolonibus reptantibus. (G.) Flor. dan. t. 309. Viola martia, odorata, officin.

Habitat in montosis et umbrosis Duderovii, et in ejus viciniis. Floret Majo. 24 Виолешка пахущая. Russ. Sob.

572. VIOLA CANINA. Caule adultiore ascendente, foliis oblongo cordatis, floribus caulinis apetalis. (Stigma ascendens; ligulae nectarii lineares, inodora, deflorata odorata. Calcar longius, fulco exaratum.) (G.) Curtis Flor. Londin t. 108.

Habitat ubique in sylvis humidis, praesertim circa fabricam pyriam Ochtershem et Murinam. Floret Junio. 24 Виолешка собачая. Sob.

573. VIOLA MIRABILIS. Caule triquetro, foliis reniformi-cordatis, floribus caulinis apetalis. (Folia glabra. Flores radicales albido-purpurascens steriles, caulini apetalii fertiles breviter pedunculati, stylo circulariter incurvato. Stolones nulli. Capsulae elateres.) (G) Jacq. Fl. austr. t. 19.

Habitat in fylvis montosis umbrosissimis, uti in montibus Pulcovo, et Duderovo, atque ad pagum Colodeci, et circa ostium fluvii Strelna. Floret Majo. 24 Виолетка удивительная. Russ. Sob.

574. VIOLA TRICOLOR. Foliis ovatis dentatis, corollis calyce glabro duplo majoribus. (Pedunculi angulati, stigma utrinque ad latera denticulo.) (G.) Flor. dan. t. 623.

In arvis et agris incultis et ad margines fylvarum circa Caterinhoffium, in monte Poclonnaja et passim, copiose provenit. Floret Junio, Julio, et Augusto. 24 Троицной цвѣтъ, Веселыя глазки. Russ. Виолетка прицвѣтная. Sob.

575. VIOLA ARVENSIS Foliis ovato oblongis dentatis, corollis calyci hirsuto aequalibus. (Caule procumbente diffuso: corolla albida, luteola minore.) (Sob.)

Habitat in arvis et ad vias, Pargelovii, Osinovae Roschczae, Murinae, in monte Poclonnaja et passim in pratis siccis incultis. Floret Junio, Julio, Augusto. 24 Виолетка полевая. Sob.

IMPATIENS. Calyx diphyllus. Corolla pentapetala irregularis, nectario monophyllo cucullato. Stamina cohaerentia. Capsula supera unilocula-

ris, in valvas quinque spiraliter diffiliens. (Antherae connatae. Calyx deciduus.)

576. IMPATIENS NOLI TANGERE. Pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. (Caulis ramosissimus. Flores flavi punctis purpureis.) (G.) Flor. dan. t. 588.

Habitat in fylvis et locis humidis arenoso-argillofis, umbrosis, uti ad fabricam pyriam Ochtershem, in vico Strelina et Caterinhoffii, et passim. Floret Iunio, Iulio. 24 Бальсамина неприкосновенная. Russ. Sob.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA

DIGYNIA.

ORCHIS. Nectarium cornu referens pone florem. Corolla ringens.

577. ORCHIS BIFOLIA. Bulbis indivisis, nectarium labio lanceolato integerrimo, cornu longissimo, petalis patentibus. (Scapus strictus, foliis duobus magnis; flores in spica longa, rara, sive volentes albi, cornu fetaceo, labello lineari, ad basin aucto, fovea nectarifera patentissima, antheris albis loculamentis fulvescentibus.) (G.) Flor. dan. t. 235. Satyrium, officin. Variat, floribus paucioribus foliis binis ovatis, pumila.

Habitat in pratis apricis, et butulelis verno tempore humidis; erat in insula apothecaria, sed nunc eliminata, occurrit in quantitate circa fabricam pyriam Ochtensem, montem Pulcovum, et Crafnoje selo, Murinam, et Murzincam. Floret Iunio. 2 Ядрушья, яички, дѣтская права, кокушкины слезы, бѣлый саширѣ. Russ. Кокушница двулистая. Sob.

578. ORCHIS LATIFOLIA. Bulbis subpalmatis rectis, nectaril cornu conico, labio, trilobo, lateralibus reflexis, bracteis latis flore longioribus, (cordatis, petalis tribus conniventibus, tegentibus stylum, duobus erectis in cornu. Caulis fistulosus, apice polygonus. Folia maculata.) (G.) Flor. dan. t. 268.

Habitat in pratis paludosis et sylvosis circa pagum Murina, et strelinam, Rumkinam, atque in aliis locis similibus. Variat bracteis florum longitudine, et flore brevioribus. Floret Iunio. 2 Кокушница широколистая. Russ. Sob.

579. ORCHIS MACULATA. Bulbis palmatis patentibus. nectarii cornu germinibus brevioribus, labio plano, petalis dorsalibus erectis, (bracteis ferratis, longitudine germinis, cornu recurvo, labio trilobo, lacinia intermedia acuminata: caulis solidus. Folia lanceolata maculata. Nectarium rectum floribus dilute violaceis. Lineis saturatioribus. Variat flore albo, staminibus flavescens.) (G.) Regnaut bot. t. 353.

Habitat in pratis laetioribus humidis, ad coemeterium sti. Iohannis et ubique in sylvis gramino-fis. Floret Iunio, Iulio. 2 Кокушкины слезы. Russ. Кокушница пятнистая. Sobol.

580. ORCHIS ODORATISSIMA. Bulbis palmatis, nectarii cornu recurvo brevior, labio trilobo, foliis linearibus, (scapo adpressis: spicae laxiusculae; bracteis germine longioribus, longearistatis, coloratis, floribus albis, carneisve, aut purpureis, petalis duobus lateralibus revolutis, antheris flavescentibus.) (Sob.) Iacq. flor. austr. 3. t. 264.

Habitat in pratis sylvosis humidis et montosis Murinae, Strelinae et Peterhoffii. Floret Iunio. 2
Кокушница благовоннѣйшая. Russ. Sob.

581. ORCHIS CONOPSEA. Bulbis pulmatis, nectarii cornu setaceo germinibus longiore recurvo, labio trifido, petalis duobus patentissimis. (Folia longa angusta in scapo purpurascente, bracteis lanceolatis, obscure purpureis; floribus violaceis, rubris, carneis albisve, odore dianthi caryophylli. Labium trifidum aequale crenulatum. Nectarii cornu longissimum incurvum.) (G.) Flor. dan. t. 224.

Habitat in pratis montosis circa fabricam pyriam Ochtensem, et frequentissima in betuletis circa Nevam et Wolchow, fluvios. Floret Iunio, Iulio. 2
Кокушница гвоздичная. Russ. Sob.

OPHRYS. Nectarium subtus subcarinatum.

582. OPHRYS NIDUS AVIS. Bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato aphylo, nectarii labio bifido. (Flores scapo concolores, viridescentes labio obliquo, subbicorni, petalis carnofis emarcescentibus omnibus, integerrimis, staminibus ferrugineis, abditis, germine pedicellato, capsu-

lis erectis. Tota succulenta fragilis, interdum scapo lignoso.) (G.) Flor. dan. t. 181.

- Habitat in monte Duderovo, ad pagum Colodeci et circa Gatzinam in sylvis umbrosis. Floret Majo, Iunio. 2 Пшичье гнѣздо. sive дѣтская шрава. Russ. Младенчица гнѣздичная. Sob.

583. OPHRYS OVATA. Bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido, (epiglottide expansa antheras tegente, labii laciniis luteo-viridibus, germine sulcato pedicellato.) (G.) Flor. dan. t. 137.

Habitat in montosis humidis umbrosis circa farsoje selo et Duderovium. Floret Iunio, Iulio. 2 Младенчица листовичная. Russ. Sob.

584. OPHRYS CORDATA. Bulbo fibroso, caule bifolio, foliis cordatis. (Caule herbaceo superne purascente, foliis subtriangularibus glaucis, floribus quinque aut sex rubellis, labio inferiore bi aut trifido, purascente, laciniis acutis, expansis, germine in sex valvulas dehiscente. Tenella.) (L.) Haller histor. stirp. helv. t. 22. f. 4.

Habitat in sylvis paludosis umbrosis vastissimis rarius. inter myriades rubi Chamemori, in sylva paludosa circa Crafnoy sabak quatuor tantum specimina legit D. Laxmannus. Gort. Floret Iunio. 2 Младенчица листосердечная. Russ. Sob.

585. OPHRYS LILIFOLIA. Bulbo subrotundo, scapo nudo, foliis lanceolatis, nectarii labio integro, petalis dorsalibus linearibus. (G.) Ehret. act. angl. 1764. n. 53. p. 81. t. 4.

Habitat in monte Duderovo. Floret Iunio. 24
Младенчица лилейная. Russ. Sob:

586. OPHRIS PALUDOSA. Bulbo subrotundo, scapo subnudo pentagono, foliis apice scabris, nectarii labio integro. (L.) Flor. dan. t. 877.

Habitat in paludosis cum antecedente circa Crafnou sabac, rarius. Floret Iunio, Iulio. 24 Младенчица болошная. Russ. Sob.

587. OPHRYS MONORCHIS. Bulbo globofo, scapo nudo, nectarii labio trifido cruciato. (Bulbus fusco-rubens; folia caulina duo vaginantia, flores viridescentes, parvissimi, petalis nec sursum conniventibus nec nectario carinato, labio superiore operculo barbae simili; stamina ferruginea. Variat floribus luteis hirsutis.) (G.) Flor. dan. t. 102.

Habitat in monte Duderovo, et ad pagum Colodeci, in pratis montosis humidis umbrosis. Floret Iunio. 24 Младенчица однокоренная Russ. Sob.

SERAPIAS. Corolla patens, hexapetala. Nectarium ovatum gibbum: labio ovato. Capsula infera, unilocularis, trivalvis, fenestrata.

588. SERAPIAS LATIFOLIA. Bulbis fibrosis, foliis ovatis amplexicaulis, floribus pendulis. (Caule multifolio, multifloro, floribus virentibus, labello plicato-emarginato-cordiformi, patalis villosulis, antheris glandula flava. Variat foliis elliptico-ensiformibus, floribus erectis albis magnis, nectarii labio acutiusculo nunc, nunc obtusiore.) Helleborine. (G.) Flor. dan. t. 811.

Habitat in montosis ad Duderovium et Colodeci atque sylvis humidis Sarskofelii frequens. Floret Iunio, Iulio. ♀ Ядро лисье. Russ. Лисье ядро широколистное. Sob.

589. SERAPIAS RUBRA. Bulbis fibrosis, foliis eniformibus, floribus erectis, nectarii labio acuto. (Folia ovato-lanceolata amplexicaulia disticha, bracteis floribus longioribus. Variat, flore minimo atro-rubente, labello vomeriformi, per oras crenulato, medio rugoso, cymba dura cartilaginosa; foliis variis, radice profundissima; floribus rubiginosis.) (Sob. B.) Flor. dan. t. 345.

Habitat in sylvis circa Sarskoje selo, et in ipso horto imperiali Sarskofeliensi nec non in monte Duderovo, Colodeci, et in viciniis urbis Gatzinae. Floret Iunio, Iulio. ♀ Лисье ядро красное. Russ. Sob.

CYPRIPEDIUM. Nectarium ventricosum, inflatum cavum.

590. CYPRIDIUM CALCEOLUS. Radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis caulinis alternis. (Similibus Veratro albo, floribus purpureo-rubiginosis, tetrapetalis, petalis duobus patentibus, exterioribus, majoribus, capsulis lateralibus, in quibus antherae.) (G.) Mill. ic. t. 242.

Habitat in monte Duderovo in sylvis montosis umbrosisque prope Colodeci, frequens. Floret Majo, Iunio. ♀ Кокушкины сапожки, five Ма-ринъ башмачокъ. Russ. Sob.

P O L Y A N D R I A.

CALLA. Spatha monophylla, ovato-cordata, plana. Spadix digitiformis, simplicissimus fructificatio-

nibus tectus. Corolla nulla. Stamina longitudine pistillorum germinibus intermixta. Bacca tetragono-globosa, unilocularis, polysperma. (Stamina sex, in singulo flosculo numerus appropriatus.)

591. **CALLA PALUSTRIS.** Foliis cordatis, spathe plana, spadice ubique hermaphrodito. (Spatha supra alba, subtus viridi, filamentis et antheris albis, germinibus nitentibus in baccas ruberrimas mutandis. Piperita.) (G.) Flor. dan. t. 422.

Habitat in insulis apothecaria, lapidea, et basileensi, et ubique in palustribus. Хлѣбница болотная. Russ. Sob.

CLASSIS XXI.

MONOECIA

MONANDRIA.

CHARA. Masculus flos. Calyx nullus. Corolla nulla. Anthera germini subjecta.

Foemineus flos. Calyx tetraphyllus. stigma quinquefidum. Pericarpium, bacca spiraliter striata, unilocularis, polysperma. Semina plurima spherica minutissima.

592. **CHARA VULGARIS.** Caulibus laevibus, frondibus interne dentatis. (Cespites lati foetidi,

caulibus fragilibus. *Baccae oblongae polyspermae.*) (G.) Vaillant. act. parif. 1719. t. 3. f. 1.

Habitat in aquis lente fluentibus Lugae. Floret Iunio. ☉ Рукосвѣчникъ обыкновенный, Russ. Sob.

D I A N D R I A.

LEMNA. Mas. Calyx monophyllus, latere vel parte superiore dehiscens. Corolla nulla.

Foemina. Calyx monophyllus. Corolla nulla. Stili unus. Capsula uni-vel bilocularis, monosperma aut disperma, globosa, compressa.

593. **LEMNA TRISULCA.** Foliis petiolatis lanceolatis (oblongis, ad dichotomias caulis dichotomi.) (G.) Mich. nov. plant. gen. 26. t. 11. f. 5.

Habitat passim in paludibus et aquis stagnantibus. Floret Iunio. 2/ Ряска. Russ. Ряска прижолобная. Sob.

594. **LEMNA MINOR.** Foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis, (Foliis utrinque viridibus.) (G.) Blackw. herb. t. 380.

Nusquam non obvia est in aquis stagnantibus. Floret Iunio, Iulio. 2/ Ряска меньшая. Russ. Sob.

595. **LEMNA POLYRRHIZA.** Foliis sessilibus, radicibus confertis, (inferne atro-purpureis.) (Sob. R.) Mich. n. plant. gen. 16. t. 11. f. 1.

Habitat Caterinhoffii, et passim in aquis fossarum stagnantibus. Floret Iunio. 2/ Ряска многокоренная. Russ. Sob.

T R I A N D R I A.

TYPHA. Amentum cylindricum densissimum. Corolla nulla. Mas. Calyx obsoletus triphyllus, fetaceus; floribus magis terminalibus.

Foemina. In eadem planta infra. Calyx capillo papposo. Semen unicuiv infidens setae pappove capillari, Stylo persistente.

596. **TYPHA LATIFOLIA.** Foliis subensiformibus, spica mascula foemineaque approximatis. (Major, culmo brevior. Filamenta antheris longiora.) (G.) Flor. dan. t. 645.

Habitat in paludibus ad viam regiam Strelinae, Peterhovianam, et ad viam Sarfcoseliensem circa montem Pulcovum. Floret Julio, Augusto. 24
Рогоза широкая. Russ. Sob.

597. **TYPHA ANGUSTIFOLIA.** Foliis femicylindricis, spica mascula foemineaque remotis. (Foliis sublinearibus culmo longioribus. Filamenta antheris breviora.) (G.) Flor. dan. t. 815.

Habitat in insula lapidea, et circa insulas finis Cronstadiensis; atque in paludosis ad viam regiam Peterhovianam frequentissima occurrit. Floret Julio, Augusto. 24 Рогоза узкая. Russ. Sob.

SPARGANIUM. Flores conglobati in capitulum. Corolla nulla. Mas: Calyx triphyllus, linearis, deciduus.

Foemina. Calyx hexaphyllus. (Aut triphyllus.) Stylus unus aut duo, stigmatibus bifido. Drupa ex-

fuca, supera, unilocularis monosperma aut disperma.

598. SPARGANIUM ERECTUM. Foliis erectis lineari-lanceolatis: nervo elevato. (Staminibus glumis duplo longioribus, antheris erectis fusciscentibus.) (G.) Gaertn. defr. et sem. cent. 1. t. 19. f. 4.

Habitat in infulae apothecariae locis verno tempore inundatis e regione septentrionali; et ubique in lacubus et paludibus frequens est. Floret Junio, Julio. ♀ Ежова головка, волчьи бобки, five пырей водяной. Russ. Ежоголовка прямая. Sobol.

CAREX. Amentum spicatum imbricatum glumis. Calyx monophyllus. Corolla nulla.

Mas: squamis unifloris. Foemina: Nectarium inflatum, apice bi-aut tridentatum. Stigmata duo aut tria, vel simplex, aut trifidum singulum. Semen triquetrum, pedicellatum intra nectarium sen nux coriacea.

* Spica unica simplici.

599. CAREX DIOICA. Spica simplici dioica. (Stigma bifidum; folia tenuissima triangularia.) (R.) Flor. dan. t. 369.

In pratis humidis circa Petropolim. Flotet Majo, Junio. ♀ Осока. Russ. Осока двудомовная. Sobol.

600. CAREX PULICARIS. Spica simplici androgyna superne mascula, capsulis divaricatis reflexis: feminibus teretibus. (Caulis foliaque capil-

lacea, culmus teres. Stigma bifidum. (Sob. R.)
Flor. dan. t. 166.

In paludosis circa Petropolim frequens est.
Floret Majo, Iunio. 2 Осока шонколистая.
Russ. Sobol.

** Spicis androgynis.

601. CAREX ARENARIA. Spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo triquetro. (Spiculis ferrugineis sessilibus. Terminalibus masculis; inferioribus foemineis, culmo incurvo. Stigmate bifido.) (G.) Flor. dan. t. 425. Carex arenaria, officin.

Ad ripam Nevae fluvii circa Caterinhoff. Floret Iunio. 2 Осока песочная. Russ. Sob.

602. CAREX ULIGINOSA. Spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo tereti. (R.) Habitat in locis humidis uliginosis. Floret Iunio. 2 Осока болотная. Russ. Sob.

603. CAREX LEPORINA. Spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis. (Stigmate bifido. Spiculae huic solummodo tres.) (Sob. R.) Scheuchz. gram. t. 10. f. 15.

In pratis humidis ad viam Sarcofodiensem et passim. Floret Iunio. 2 Осока заячья. Russ. Sobol.

604. CAREX VULPINA. Spica supradecomposita inferne laxiore, spiculis ovatis androgynis glomeratis: superne masculis. (Capsula squama longi-

ore, nectario digyno bifido. Variat: panicula flavo-viridi compacta; panicula spadiceo-fusca, spiculis laxioribus; panicula fusco-rubra, spiculis oblongis se se contingentibus.) (G.) Flor. dan. t. 308.

In palustribus circa Caterinhoffium et in ripis insularum apothecariae et lapideae. Floret Majo, Junio. 2 Осока лисичья. Russ. Sob.

605. CAREX MURICATA. Spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, superne masculis, capsulis acutis divergentibus bicuspidatis. (Stigma bifidum. Ore fissio radice fibrosa.) (G.) Flor. dan. t. 284.

In filvis humidis non infrequens est. Floret Majo, Junio. 2 Осока колючая. Russ. Sob.

606. CAREX ELONGATA. Spiculis oblongis sessilibus remotis androgynis, capsulis ovatis acutis. (Stigma bifidum.) (R.) Leers fl. herb. t. 14. f. 7.

In humidis circa Petropolim. Floret Majo, Junio. 2 Осока долгая. Russ. Sob.

*** Spicis sexu distinctis: foemineis sessilibus.

607. CAREX FLAVA. Spicis confertis subsessilibus subrotundis: mascula lineari, capsulis acutis recurvis, (echinatus. Culmus subteres. Stigma trifidum.) (G.) Flor. dan. t. 1047.

Variet. a. Spica mascula gemina.

β. Spica mascula in summo feminifera. Gort.

In paludibus quae aestate exsiccantur, nihil hac planta frequentius est, uti circa Caemete-

rium fti. Iohannis. Floret Majo, Iunio. 2/ Осока желтая. Russ. Sob.

608. CAREX GLOBULARIS. Spicis ternis approximatis: mascula filiformi; foemineis subrotundis superne echinatis. Spica foeminea sessili ovata folio florali breviori approximata.) (R.) Villar. pl. Delph. 2. p. 211. n. 27.

In fylvis humidis circa Petropolim. Floret Iunio. 2/ Осока шароголовная. Russ. Sob.

*** Spicis sexu distinctis: foemineis pedunculatis.

609. CAREX LIMOSA. Spicis ovatis pendulis: mascula longiore erectiore, radice repente. (Capsulae ovatae subcompressae nervosae mucronatae, ore integro, bractea breviores. Culmus triqueter, spiculae tres.) (R.) Flor. dan. t. 646.

In paludibus circa Petropolim. Floret Majo, Iunio. 2/ Осока грязная. Russ. Sob.

610. CAREX PANICEA. Spicis pedunculatis erectis remotis; foemineis linearibus, capsulis obtusis inflatis. (R.) Flor. dan. t. 261.

In uliginosis circa Petropolim. Floret Majo, Iunio. 2/ Осока просяная. Russ. Sobol.

611. CAREX CAESPITOSA. Spicis erectis cylindricis ternis sessilibus: mascula terminali, culmo triquetro. (Digyna, vaginis nullis, spicis subcylindricis obtusis, foliis erectis molliusculis.) (G.) Scheuchz. agrostogr. t. 10. f. 11.

In pratis uliginosis. Floret Iunio, Iulio. 24 Осока дернистая. Russ. Sob.

**** Spicis sexu distinctis: masculis pluribus.

612. CAREX ACUTA. Spicis masculis pluribus, foemineis subsessilibus, capsulis obtusiusculis, (villosulis, staminibus dextrorsum declinatis, sexu vario.) Varietas α . nigra vulgaris. Curtis Flor. Londin. t. 281. β . Ruffa five maxima. Sc. spicis longissimis, foemineis quatuor aut quinque pendulis, capsulis confertis acutis. (G.)

Nihil vulgatius hac planta tum alibi, tum praecipue in insula Basileensi. Floret Majo, Iunio. 24 Осока острая. Russ. Sobol.

613. CAREX VESICARIA. Spicis masculis pluribus, foemineis pedunculatis, capsulis inflatis acuminatis. (Spicae culmique trigoni.) (G.) Flor. dan. t. 647.

Habitat circa paludes insulae Basileensis et lapideae frequens. Floret Majo, Iunio. 24 Осока пузыристая. Russ. Sob.

614. CAREX HIRTA. Spicis remotis: masculis pluribus: foemineis subpedunculatis erectis, capsulis hirtis. (Sob. B.) Flor. dan. t. 379.

Habitat in pratis arenosis ficcis, Caterinhoffii et ad fabricam pyriam Ochtensem, necnon ad littora sinus Cronstadiensis alibique. Floret Majo, Iunio. 24 Осока мохнатая. Russ. Sob.

T E T R A N D R I A.

BETULA. Calyx monophyllus, trifidus aut quinquefidus. Corolla quadripartita.

Mas: in amento et squamis trifloris.

Foemina: calyx biflorus, squamis pedicellatis, cordatis cum acumine. Semina duo aut tria, utrinque membrana alata.

615. **BETULA ALBA.** Foliis deltoidibus acutis duplicato-ferratis glabris, ramis erectis strictis. (Cortice abo. Amenta mascula, ut coryli, autumnopullulant.) (G.) Blackw, herb. t. 240. Betula alba, officin.

Nullibi non crescit. Florêt sub medium Maij, vix explicatis foliis. † Береза. Russ. Береза бѣлая. Sob.

616. **BETULA PENDULA.** Foliis deltoidibus acutis duplicato-ferratis glabris, ramis flaccidis pendulis. (Sob.) Roth. flor. germ. 1. p. 405.

Habitat in sylvis humidiusculis cum Betula alba. Floret majo. † Береза. Russ. Non distigitur vulgo a Betula alba. Береза повислая. Sobol.

617. **BETULA NANA.** Foliis orbiculatis crenatis. (Arbor ramosissima procumbens, cortice gemmisque atro-rubentibus, amentis singulis alaribus, floribus tribus in mare, duobus in foemina.) (G.) Flor. dan. t. 91.

Habitat in filvis humidis paludosis, ad ductum aquarum Ladogensem, circa Monasterium Alexandro Newsky, Pargelovil, et passim. Floret Majo. † Березовой ерикѣ in Sibiria vocatur. Береза приземистая. Sobol.

618. **BETULA ALNUS.** Pedunculis ramosis cunei formibus obtusissimis, foliis subrotundis glutinosis, venarum axillis subtus villosis. (Variat: foliis

rotundis, glutinosis viridibus ; et foliis incanis hirsutis.) (G.) *Bátula alnus incana.* (Sob.) *Regn. bot. t. 326. Alnus officin.*

Ubivis in sylvis. var. *incana.* locis elevatis gaudet. Floret Aprili, Majo. † О́льха. Russ.

619. *BETULA FRUTICOSA.* Foliis ovato-rhomboides versus apicem acuminatum inaequaliter ferratis. (Sob.) *Pall. flor. ross. t. 40.*

Habitat in sylvis humidis montosis circa urbem Gatzinam, et ejus viciniis, similibus. Floret Aprili, Majo. † Бе́реза куспарная. Russ. Sob.

URTICA. Calyx quadrifidus. Corolla nulla.

Mas : Nectarium centrale, cyathiforme.

Foemina : Calyx foliola duo opposita exigua. Stigma villosum. Semen unicum ovatum, nitidum.

620. *URTICA URENS.* Foliis ovalibus, caule ramoso. (Racemis erectis.) (G.) *Flor. dan. t. 739. Urtica minor, officin.*

Crescit copiosissime in ruderatis, ad fepes hortorum, imo et in ipsis hortis odiosa planta. Floret Junio. ☉ Кра́пива five кра́пива меньшая. Russ.

621. *URTICA DIOICA.* Foliis cordatis oppositis, racemis geminis, (pendulis, majoribus.) (G.) *Flor. dan. t. 746. Urtica major, officin.*

Habitat ad vias et fepes hortorum nec non in marginibus sulvarum frequentatarum. Floret Junio. † Кра́пива большая. Russ.

P E N T A N D R I A.

AMARANTHUS. Calyx triphyllus aut pentaphyllus coloratus. Corolla nulla.

Mas: Stamina duo aut quinque.

Foemina: Styli tres. Capsula unilocularis, circumscissa, monosperma.

622. **AMARANTUS BLITUM.** Glomerulis lateralibus, floribus trifidis, foliis ovatis retusis, caule diffuso. (Folia maculata, floribus polygamis.) (Sob. R.) Pluckn. phyt. 212. f. 2.

Habitat in ruderatis cultis et ad sepes hortorum, Petropoli, praecipue inter Regimenta Praetoriana. Floret Iulio. ☉ Амарантъ кухонный. Russ. Sobol.

P O L Y A N D R I A.

MYRIOPHYLLUM. Calyx tetraphyllus. Corolla nulla. Mas. Stamina octo. Foemina. Pistilla quatuor. Styli nulli. Stigmata pubescentia. Semina quatuor nuda.

623. **MYRIOPHYLLUM SPICATUM.** Caule ramoso, spicis terminalibus nudis interruptis, floribus bracteatis, foliis pinnatis capillaribus. (Verticilli floribus quatuor plerumque.) (G.) Flor. dant. 681.

In lacubus et aquis stagnantibus frequens est. Floret Iunio, Iulio. 24 Водоприца колосистая. Russ. Sob.

624. **MYRIOPHYLLUM VERTICILLATUM.** Caule simplici, floribus verticillatis hermaphroditis,

foliis pinnatis; pinnis linearibus carnosis. (Frequentius monoicum: flores masculini nimirum superiorem spicae partem; foemini inferiorem occupant. Etiam petala ovalia decidua a Sowerby sunt observata.) (G.)

In fluvio Neva locis vadosis non raro occurrit, nec non in rivo prope Goreloy sabac fluente. Floret Iunio, Iulio. 24 Водопрница колесоцвѣтная? Russ. Sob.

SAGITTARIA. Calyx triphyllus. Corolla tripetala.

Mas: Stamina viginti quatuor.

Foemina: styli nulli. Pistilla multa. Capsulae utriculares semilunatae numerosissimae. Semina multa, nuda, teretiuscula, conduplicata, (in capitulo haemisphaerico infra masculos.

625. **SAGITTARIA SAGITTIFOLIA.** Foliis sagittatis acutis. (G.) Flor. dan. t. 172.

Habitat in paludibus et aquis stagnantibus fluviorum, uti ad rivum Nevae fluvii Карповсам, et circa infulas lapideam, basileensem, et apothecariam. Floret Iulio, Augusto. 24 Спрѣла five Желтая вахта. Russ. Спрѣла водяная. Sob.

QUERCUS. Corolla nulla.

Mas: in amento. Calyx quinifidus aut septemfidus. Stamina quinque ad decem.

Foemina: in gemma, squamis imbricatis, in cupulam coalitis. Calyx minimus monophyllus sexfidus, vel integerrimus, scaber. Styli duo ad

quinque, unicus, bifidus aut quinquefidus. Nux ovata, coriacea, monosperma, matura unilocularis, cupula excepta.

626. QUERCUS ROBUR. Foliis petiolatis oblongis superne latioribus: sinubus acutioribus, angulis obtusis, fructibus subseffilibus. (Styli tres.) (G.) Von. Gleichen das neueft. aus dem Reiche der Pflanz. t. 29. Quercus, officin.

Habitat in variis locis circa Petropolim et ad montem Duderovium. Cronftadii duae tantum erbores annosae et procerae reperiuntur, sub quibus gloriosae memoriae Petrus Magnus refidere solebat, cum urbis illius fundamenta jacerentur, et in una arborum cistam ad reponenda, quae ad victum spectant, fieri curavit. Floret Majo. † Дубъ. Russ.

CORYLUS. Corolla nulla.

Mas. Amentum ex squamis trifidis, lacinia media latissima, unifloris.

Foemina: Involucrum diphyllum, lacerum, ex gemma. Calyx obsoletus ex margine epidermidis nucis brevissimo. Nux ovata. (Receptaculum villosum, gemma foliacea.)

627. CORYLUS AVELLANA. Stipulis lanceolatis, ramulis pilosis. (Foliis dentatis nervosis, dentibus arista herbacea.) (G.) Blackw. herb. t. 293.

In fylvis montosis Pargelovii, Ofinovae Roschczae et in monte Duderovo atque circa urbem Gatzzinam et Colodeci copiosissime invenitur. Floret Aprili. † Орѣшникъ, sive Лѣщина. Russ. Орѣшникъ лѣсный. sob.

MONADELPHIA.

PINUS. Corolla nulla.

Mas: Calyx racemi squamae hiantes. stamina plurima Antherae nudaе. (Calyx tetraphyllus?)

Foemina: Calyx strobili: squamae biflorae. Pistillum unicum. Nux cincta ala membranacea, unilocularis evalvis.

628. **PINUS SYLVESTRIS.** Foliis geminis rigidis, primordialibus solitariis glabris, strobilis ovato-conicis subgeminis foliorum longitudine, squamis oblongis obtusis. (G.) Oelhaf. Abb. t. 1-4. Pinus, officin.

Nusquam non obvia est, praesertim autem montosa tractus Coporiensis notari merentur, quae admodum proceris hujus generis arboribus superbiunt. Floret Majo. † Cocha. Russ.

629. **PINUS ABIES.** Foliis solitariis subulatis mucronatis laevibus bifariam versis. (Folia compressa, utrinque subcarinata, supra lucida. strobilis subcylindricis pendulis.) (G.) Flor. dan. t. 193. Abies, officin.

Variet. β P. Abies strobilorum squamis margine undulatis. (sob) Syft. Nat. edit. Gmelin. Pinus Picea.

Ubique in sylvis obvia est; variet. β Caterinhoffii. Floret Majo. † Ель. Russ.

C L A S S I S X X I I .

D I O E C I A .

D I A N D R I A .

SALIX. Amenti squamae uniflorae imbricatae ; involucro coriaceo e gemma. Corolla nulla.

Mas: Glandula baseos nectarifera vel simplex vel duplex. (Antheris una ad quinque.)

Foemina: Stylus bifidus. Capsula unilocularis, bivalvis, valvulis revolutis, femina papposa, basi pappo simplici.

630. **SALIX HERMAPHRODITICA.** Foliis ferratis glabris, floribus hermaphroditis diandris. (sob.)

Habitat in sylvis prope viam quae ducit a farcofelo, ad Gatzinam. Floret Aprili, Majo. † Ива, five верба. Russ. Верба женомужная. Sob.

631. **SALIX TRIANDRA.** Foliis oblongo-lanceolatis ferratis glabris, floribus triandris. (squamae remotae patulae fusco-virides.) (G.) Hoffm. Salic. 1. t. 9. 10. f. 1-4.

Habitat passim in ingria; frequens ad ductus aquarum circa viam Peterhovianam et Wiburgensem. Floret Aprili, Majo. † Вешла, five Верба. Russ. Верба примужная. Sob.

632. **SALIX PENTANDRA.** Foliis ovatis acutis ferratis glabris floribus pentandris. (Petioli multiglandulosi.) (G.) Flor. dan. t. 943. *Salix pentandra*, officin.

In insula Petri copiosa arbuscula est sed nec alibi hospes. Floret Majo. † Вешла, five Ива, Russ. Верба пятимужная. Sob.

633. **SALIX FRAGILIS.** Foliis ferratis glabris ovato-lanceolatis, petiolicis dentato-glandulosis. (Folia juniora utrinque pilis albidis adpressis obfita.) (Sob.) Flor. lapp. t. 8. f. B.

Ad sepes hortorum in regione Wiburgensi, et insula apothecaria aliisque Arbor procera satis vulgaris. Floret Majo. Ива, five Верба. Russ. Верб ломкая. Sob.

634. **SALIX PURPUREA.** Foliis ferratis glabris lanceolatis, inferioribus oppositis. (Sob.)

Habitat in sylvis circa Strelinam et ad sepes hortorum ubique Petropoli, arbor mediocris altitudinis. Floret Aprili, Majo. † Верба красная. Russ.

635. **SALIX MYRTILLOIDES.** Foliis integris glabris ovatis acutis. (R.) Flor. lapp. t. 8. f. K.

Habitat in montosis circa Petropolim. Floret Majo. † Верба черникалистая. Sob.

636. **SALIX AURITA.** Foliis integerrimis utrinque villosis obovatis, appendiculatis. (R.) Hoffm. *Salic.* 1. p. 30. t. 4. f. s. 2. et t. 5. f. 3.

Habitat ad ductus aquarum passim. Floret Majo. † Тальникъ, five Вешла. Russ. Верба ушистая. Sob.

637. *SALIX LANATA*. Foliis integerrimis utrinque lanatis subrotundis acutis. (R.) Flor. lapp. t. 7. f. 7. et t. 8. f. N. et X.

Habitat in montosis humidis circa Petropolim. Floret Majo. † Тальникъ, five Ветла. Russ. Вербa мохнатая. Sob.

638. *SALIX ARENARIA*. Foliis integris ovatis acutis supra subvillosis, subtus tomentosus, (candicantibus, non nigris.) (G.) Flor. dan. t. 197.

Crescit ad ductum aquarum Ladogensis, et circa Fabricam pyriam Ochtersen copiose. Floret Majo. † Тальникъ. Russ. Вербa песочная. Sob.

639. *SALIX INCUBACEA*. Foliis integerrimis lanceolatis: subtus villosis nitidis, stipulis ovatis acutis. (Radice repente, ramis decumbentibus, foliis subtus glaucis.) (G.)

Habitat passim in pratis et fructicetis humidis. Floret Majo. † Тальникъ. Russ. Вербa лежащая. Sob.

640. *SALIX FUSCA*. Foliis integerrimis ovatis subtus pubescentibus. (Caules diffusissimi, ramis fuscis, foliis fusco-viridibus subsessilibus; amento oblongo, squamis ciliatis atrorubentibus, intus fuscescentibus, genitalibus rubris.) (R. Sob.) Jacq. Flor. austr. 5. t. 409.

Habitat in pratis humidis circa Murinam, et Pargelovium. Floret Majo. † Вербa темная. Russ. Sob.

641. *SALIX ROSMARINIFOLIA*. Procumbens foliis integerrimis lanceolato-linearibus strictis subsessilibus subtus tomentosus. (Supra furcate

viridescentibus, nudis, subtus ex decumbente pube albidis, margine revoluto. Caulis saepe in terra latens.) (Sob.) Lobel. ic. 2. p. 137.

Habitat in sylvis humidis, circa Fabricam pyriam Ochtersen, ad pagos Rjabova, et Murina. Floret Majo. † Вербa розмаринная. Russ. Sob.

642. SALIX CAPREA. Foliis ovatis rugosis subferratis subtus tomentosis undatis superne denticulatis. (Filamentis duobus distinctis, amenta ex gemmis superioribus.) (G.) Hoffm. falic. 1. p. 25. t. 3. f. 1.2. et t. 5. f. 4.

In sylvis humidis, circa fabricam pyriam Ochtersen, ad pagos Rjabova, et Murina. Floret Majo. † Вербa козья. Russ. Sob.

643. SALIX VIMINALIS. Foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus fericeis, ramis virgatis. (Amenta flava copiosa reflexa, involucrum marium flavo-rubrum; squamulae virides in foeminis.) (G.) Hoffm. falic. 1. t. 2. f. 1. et t. 5. f. 2.

Ad pagos passim. Floret Aprili, Majo. † Ива, sive Лоза. Russ. Вербa лозная. Sob.

644. SALIX CINEREA. Foliis subferratis oblongo-ovatis subtus subvillosis, stipulis dimidiato-cordatis. (Amenta florum fusca, infra folia collocata. Pedunculo foliolis aliquot minimis, lanceolatis. Stipulae dimidiato-cordatae, utrinque ferratae glandulis tribus.) (Sob.)

Habitat in monte Pulcovo et passim in sylvis humidis. Floret Aprili, Majo. † Вербa сѣрая. Russ. Sob.

645. SALIX ALBA. Foliis lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pubescentibus : ferraturis infimis glandulosis. (Folia subtus albida, quasi polline inspersa; involucrium marium bifidum, squamæ patulae villosae.) (Sob.) Blackw. herb. t. 327.

Habitat circa sepes hortorum in vico Strelina et passim in sylvis arbor prosera, excelsa. Floret Aprili, Majo. † Вѣрба бѣлая. Russ. Sobol.

T R I A N D R I A.

EMPETRUM. Calyx tripartitus. Corolla tripetala.

Mas : Stamina longa.

Foemina : Stigmata novem. Bacca orbiculata unilocularis. Semina novem articulatim in orbem posita.

646. EMPETRUM NIGRUM. Procumbens. (G.) Mill. illust. ic. Flora dan. t. 975.

Circa urbem Schlüsselburg tam in pratis quam etiam in sylvis inter ericam et ad ductum aquarum Ladogensis frequens est. Crescit etiam in monte Poclonnaja, Pargelovii et Osinova Roschza, et prope Czesma; locis humidis. Floret Aprili, Majo. † Ерникъ ягодный. Russ. Sobol.

T E T R A N D R I A.

MYRICA. Flores amentacei. Amentum squamis lunatis. Calyx diphyllus. Corolla nulla.

Foemina: Styli duo. Bacca, five drupa monosperma, supera, unilocularis.

647. MYRICA GALE. Foliis lanceolatis subferratis, caule suffruticoso. (Fructu ficco.) (G.) Flor dan. t. 327.

Habitat in Insulis Nevae fluvii praesertim in ea quae nomen a rotunditate habet. Floret Iunio, Iulio. ♀ Пахучка сухоягодная. Russ. Sob.

PENTANDRIA.

HUMULUS. Corolla nulla.

Mas: Calyx pentaphyllus.

Foemina: Calyx monophyllus, oblique patens, integer; involucrium tetraphyllum. Styli duo. Semen unicum intra calycem foliatum.

648. HUMULUS LUPULUS. (Caulis volubilis, folia inferiora triloba.) (G.) Knorr del. hort. 2. t. 1. 5. Lupulus, officin.

Habitat in sylvis umbrosis circa Caterinhoffium, ad pagum Camennoy Nos et passim. Floret Iulio, Augusto. ♂ et ♀ Хмѣль. Russ.

OCTANDRIA.

POPULUS. Flores amentacei. Calyx, lamina lacera. Corolla turbinata obliqua integra.

Foemina: Stigma quadrifidum. Capsula unilocularis aut bilocularis, bivalvis. Semina multa papposa.

649. **POPULUS TREMULA.** Foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. (Glandulis duabus ad basin coadunatis. Petioli apice compressi, unde folia tremula.) (G.) Blackw. herb. t. 248.

Ubivis in sylvis frequens est. Floret Aprili, Majo.
 ½ Осина. Russ.

E N N E A N D R I A.

MERCURIALIS. Calyx tripartitus. Corolla nulla.

Mas : Stamina novem, aut duodecim. Antherae globosae, didymae.

Foemina : Styli duo. Capsula dicocca, bilocularis, monosperma.

650. **MERCURIALIS PERENNIS.** Caule simplicissimo, foliis scabris. (G.) Flor dan. t. 400. Mercurialis, officin.

Habitat in sylvis humidis umbrosis prope fluvium sistam, in montibus Pulcovo et Duderovo, atque in aliis locis similibus. Floret Majo, Junio. ¼ Полѣска. Russ. Полѣска многолѣпная. Sob.

HYDROCHARIS. Calyx trifidus. Corolla tripetala.

Mas : Spatha diphylla. Filamenta tria interiora stylifera; (exteriora mediaque basi connata.)

Foemina : Styli sex. Capsula sexlocularis, polysperma, infera.

651. HYDROCHARIS MORSUS RANAE. (Foliis circinatis, floribus albis.) (G.) Flor dan. t. 878.

Habitat ubique in paludibus, praecipue circa Caterinhoffium prope pagum Tenteleva, et ad viam Peterhoffianam. Floret Julio. ☉ et 24 Лягушникъ. Russ. Водопріяшность лягушная. Sobol.

MONADELPHIA.

JUNIPERUS. Mas: Amentum floribus ter tribus oppositis. Calyx, squama, corolla nulla. Stamina in flosculo terminali duo. Drupa succulenta, clausa, polypyrena.

Foemina: Calyx tripartitus. Petala tria. Styli tres, calycis tuberculis tribus inaequalis unilocularis, glandulis balsamiferis ad basin internam stipati. Bacca five Drupa trisperma.

652. JUNIPERUS COMMUNIS. Foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. (G.) Flor. dan. t. 1118. Juniperus, officin.

Habitat in fylvis circa Strelinam, Peterhoffium, ad pagum Rjabova, et passim. Floret Aprili, Мајо. † Можжевьельникъ, five можжуха. Russ.

C L A S S I S X X I I I .

P O L Y G A M I A .

M O N O E C I A .

HOLCUS. Hermaphroditus: Calyx, Gluma subbiflora bivalvis. Corolla. Gluma aristata. Stamina tria. Styli duo. Semen unicum.

Mas: Calyx, Gluma bivalvis. Corolla nulla. Stamina tria.

653. **HOLCUS LANATUS.** Glumis bifloris villosis: flosculo hermaphrodito mutico; masculo arista recurva. (Folia pubescentia, superiora alaria contracta; Vaginae laxae striatae villosae. Flosculi nonnulli in ramulis inferioribus paniculae steriles emarcidi: glumae antherae que virides rubreve.) (R. Sob.) Schreb. gramin. t. 20. f. 1.

Habitat in monte Poclonnaja, Pargelovii, et Ofinova Roszczza, et passim in pratis montosis declivibus. Floret Iunio, Iulio. 24 Просяникъ мохнапый. Russ. Sob.

654. **HOLCUS ODORATUS.** Glumis trifloris muticis acuminatis, flosculo hermaphrodito diandro. (Sob. R.) Loef. fl. pruff. t. 26.

Habitat in sylvis herbosis et pratis elevatis Ofinovae Roszczzae. Floret Iunio, Iulio. 24 Просяникъ пахучий. Russ. Sob.

PARIETARIA. Flores mere foeminei hermaphroditis in eodem trunco interfiti. Calyx quadrifidus. Corolla nulla.

Semen unicum superum, elongatum. (Flores hermaphroditi duo in involucro hexaphyllo, foliolis duobus exterioribus majoribus; hermaphroditus unus inter foeminas duas.)

655. **PARIETARIA OFFICINALIS.** Foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. (Folia hirsuta venosa; calyx segmentis rubellis. Flores foeminei tetragoni, pyramidati. Caule simplici, floribus inferioribus pluribus masculis pedicellatis: superioribus foemineis sessilibus. Filamenta antea summo artificio spiritaliter intorta, instante foecundatione elastice diffiliunt.) (R.) Flor. dan. t. 521. Parietaria, officin.

Habitat in ruderalis circa Petropolim. Floret Iunio, Iulio. 2 Сѣбнняя шрава, five день и ночь. Russ.

ATRIPLEX. Corolla nulla. Flores alii hermaphroditis, alii in eadem planta mere foeminei.

Hermaphroditus: Calyx pentaphyllus. Stamina quinque. Stylus bipartitus. Semen unicum depressum; erectum.

Foemina: Calyx diphyllus. Semen unum, compressum.

656. **ATRIPLEX PATULA.** Caule herbaceo patulo foliis subdeltoideolanceolatis, calycibus femininum disco dentatis. (Caulis diffusus subquadrangularis; ramis patentibus elongatis, folia

haftata lanceolataque integra. Flosculi masculi tetrandri, valvulae dentatae.) (G.) Lob. ic. 257.

Habitat in cultis, ruderatis hortisque oleraceis, prope pagum et fluvium Siftam, necnon in ipsa urbe Petropoli et passim. Floret Iulio, Augusto.
 ☉ Лебеда розвиллистая. Russ. Sob.

ACER. Flores multi mere masculi reliquis (hermaphroditis) interjecti. Calyx quinquefidus. Corolla quinquepetala. Stamina octo. Pistillum unum (hermaphroditis) capsulae duae aut tres, monospermae, ala terminatae.) (Samarae duae, unialatae.)

657. **ACER TATARICUM.** Foliis cordatis indivisis ferratis: lobis obsolete, floribus racemosis. (R.) Pallas fl. ross. t. 3.

Habitat in sylvis et insulis Nevae fluvii rarius. Floret Aprili, Majo. ♪ Кленъ татарскій. Russ.

658. **ACER PLATANOIDES.** Foliis quinque-lobis dentatis; dentibus acuminatis, glabris, corymbi simplici erecto. (Cortex laevis. Corymbus et samarae glabra: alis patentibus. Lactescit. (G.) Mill. ic. t. 8. f. 1.

Habitat in sylvis montosis circa vicum Hostilitza, et passim. Elegans arbor, et ad hortorum sepes et ambulacra in maximo usu. Floret Majo, Iunio.
 ♪ Кленъ. Russ.

D I O E C I A.

FRAXINUS. Calyx nullus, aut perianthium quadripartitum. Corolla nulla, aut quadripetala.

Hermaphroditus: Stamina duo. Pistillum unum. Semen unicum lanceolatum. (Samara.)

Foemina: Pistillum unum, lanceolatum. Capsula bilocularis, superne foliaceo-compressa. Semina pauca pendula.

659. FRAXINUS EXCELSIOR. Foliolis ferratis, floribus apetalis. (Flores omnes hermaphroditi. Gemmae laterales racemos, terminales folia promunt.) (G.) Flor. dan. t. 969. Fraxinus, officin.

Habitat in sylvis montosis circa Sarcoje Selo, et Peterhoffium, crescit etiam copiose in insula rotunda, atque ad sepes hortorum passim. Floret Majo. † Ясенъ, five ясень. Russ.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

EQUISETUM. Clava, seu spica ovato-oblonga multivalvis: fructificationes peltatae intus dehiscentes. Filamenta duo, apicibus duobus antheriferis.

660. EQUISETUM SYLVATICUM. Frondibus compositis, spica terminali flaccida. (Setis verticillatis viginti quatuor ad triginta.) (G.) Weinm. phytanth. t. 479. f. F.

Habitat in fylvis umbrosis passim. Floret Aprili, Majo. ♃ Хвоцъ лѣсный. Russ. Sob.

661. EQUISETUM ARVENSE. Scapo fructificante nudo, fronde sterili verticillato-ramoso decumbente.) (Simile Asparagis.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 285. Equisetum, officin.

Habitat in arvis et pratis arenosis ficcis. Floret Aprili, Majo. ♃ Хвоцъ полевой. Russ. Sob.

662. EQUISETUM PALUSTRE. Caule angulato, frondibus simplicibus (Setis verticillatis paucis.) (Sob.) Weinm. phytanth. t. 479. f. d. e.

Crescit abunde in paludibus circa Fabricam pyriam Ochtensem, et in infulis Nevae fluvii passim. Floret Majo. ♃ Хвоцъ болотный. Russ. Sob.

663. EQUISETUM FLUVIATILE. Caule striato, frondibus subsimplicibus, (vaginibus quatuordecim ad octodecim dentatis.) (Sob. R.) Blackw. herb. t. 2. 17. f. 2. Equisetum majus, officin.

Habitat in fluvio Neva et in rivulis circa insulam lapideam, et apothecariam atque aliis in locis similibus. Floret Iunio. ♃ Хвоцъ рѣчный. Russ. Sob.

664. EQUISETUM LIMOSUM. Caule subnudo laevi. (R. Sob.) Saj. Angl. 3. t. 5. f. 2.

Habitat in limosis circa Petropolim, uti circa fabricam porcellaneam, Murinam, Czornaja Reczsa, et passim. Floret Majo, Iunio. ♃ Хвоцъ иловасный. Russ. Sob.

665. **EQUISETUM HIEMALE.** Caule nudo scabro basi subramoso. (G.) Regn. bot. t. 401.

Passim ad paludes. Floret Augusto. 2/ Хвоцб. Russ. Хвоцб зимній, five обыкновенный. Sob.

LYCOPODIUM. Fructificationes in axillis squamarum in spicas oblongas imbricatas digestarum, vel (distinctae,) ipsorum foliorum, axillares, sessiles. Capsulae? reniformes, bivalves, elasticae diffilientes, polypermae. Flos masculus in alis foliorum, squama oblonga. Foemineus, perianthium tetraphyllum.

666. **LYCOPODIUM CLAVATUM.** Foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis. (Funiculis repentibus lanuginosis longis. Variat spicis sotilariis.) (G.) Flor. dan. t. 126. Lycopodium, officin.

Habitat in sylvis; Caterinhoffii, in insulis, apothecaria, baslensi et passim. Floret Iulio, Augusto. 2/ Плаунб. Russ. Волконожіе булавистое. Sobol.

667. **LYCOPODIUM SELAGO.** Foliis sparsis octofariis, caule dichotomo erecto fastigiato, capsulis sparsis. (G.) Flor. dan. t. 104. Muscus terrestris, officin.

Ad fluvium lugam et Lemodicham in sylvis, nec non Pargelovii, et passim in humidis. Floret Augusto. 2/ Баранецб. Russ. Волконожіе ельчатое. Sobol.

668. **LYCOPODIUM ANNOTINUM.** Foliis sparsis quinquefariis subserratis, furculis annotino-articulatis, spicis terminalibus glabris erectis. (Rami

plerumque in tres aut quatuor alios dividuntur. Glumae clavarum latae, submembranaceae nonnihil lacerae, in longum et piliformem apicem excurrunt.) (G.) Flor. dan. t. 127.

In infula bafileenfi, lapidea, apothearia, Cate-rinhoffii, et paffim in nemoribus. Floret Iulio, Augufto. 2 Волконожіе годочленішное. Russ. Sobol.

669. LYCOPODIUM COMPLANATUM. Foliis bifarium connatis; superficialibus folitariis, fpicis geminis. (Variat fpicis folitariis.) (G.) Flor. dan. t. 78.

Habitat in monte Poclonnaja, Pargelovii, et paffim in fylvis montofis arenofis, et ericetis fterilibus. Floret Augufto, Septembri. 2 Волконожіе плоское. Russ. Sob.

OPHIOGLOSSUM. Spica diftica, articulata: articulis tranfverfim dehiscentibus, fubglobofis. (Capfulae numerosae membrana connatae, maturaе tranfverfim dehiscentes, annulo nullo.)

670. OPHIOGLOSSUM VULGATUM. Fronde ovata, fcapo unifolio, (flavescente, folio avato-oblongo.) (L.) Flor. dan. t. 147.

Habitat in pratis fylvaticis fabhumidis rariffima. In fylva circa Caterinhoffium duo tantum fpecimina Inventit. D. Laxmann. In fulva infulae bafileenfis unum Exemplar legit Sobolewski. Floret Majo. 2 Змѣиный языкѣ. Russ.

OSMUNDA. Spica ramofa: capfulis fubglobofis, feffilibus, tranfverfe dehiscentibus. Annulo nullo.

671. OSMUNDA LUNARIA. Fructificationibus cauli ad basin frondis infidentibus, scapo solitario, racemo laterali, fronde solitaria pinnata. (Variat fronde simplici et composita.) (G.) Flor. dan. t. 18.

In infulis Nevae fluvii locis apertis et ficcis, atque in pratis montosis, et ad margines sylvarum Pargelovii, aliarumque. Floret Junio, Julio. 2 Богородицына ручка. Russ. Чистоустъ полумбсячный. Sobol.

672. OSMUNDA REGALIS. Fructificationibus frondi infidentibus, fronde bipinnata, racemo terminali supradecomposito. (Pinnis lanceolatis, apice racemiferis.) (L.) Flor. dan. t. 217.

Habitat in nemoribus humidis, ad rivulos, circa pagum Lembalova. Floret Augusto. 2 Чистоустъ царскій. Russ. Sob.

673. OSMUNDA STRUTHIOPTERIS. Fructificationibus frondi infidentibus, in frondibus distinctis: frondibus sterilibus bipinnatis, scapo fructificante pinnato disticho. (G.) Flor. dan. t. 169.

In infulis Nevae fluvii, lapidea, bafileenfi, crucis, et in umbrosis montis Pulcovi frequentissima planta est. Floret Julio, Augusto. 2 Черный папоротникъ. Russ. Чистоустъ струсопбрисный. Sob.

674. OSMUNDA RAMOSA. Racemis lateralibus, frondibus bipinnatis: pinnulis incisis. (Minor, ramis plerum tribus bipinnatis, scapo laterali, infra nudo, supra racemoso.) (Sob.) Roth. flor. german. p. 444.

Habitat in pratis declivibus, ad margines sylvarum, locis apricis, et in ripis lacuum Osinovae Roschcaae. Floret Augusto, Septembri. 2 Чистощоустъ въшвисшый. Russ. Sob.

PTERIS. Fructificationes five capsulae in lineam digestae, subtus cingentem frondis marginem.

675. **PTERIS AQUILINA.** Frondibus supradecompositis, pinnis pinnatis; pinnulis lanceolatis; infimis pinnatifidis, superioribus minoribus. (G.) Blackw. herb. t. 325. Filix foemina, officin.

Crescit copiosissime in sylvis ceduis montosis; in monte Poclonnaia, Pargelovii, circa fabricam pyriam Ochtensem et passim. Floret Augusto, Septembri. 2 Орлякъ, five женскій папорощникъ. Russ. Крыло орлиное. Sob.

ASPLENIUM. Fructificationes five capsulae in lineas rectas subparallelas in disco frondis paginae inferioris congestae.

676. **ASPLENIUM TRICHOMANOIDES.** Frondibus pinnatis, pinnis subrotundis crenatis. (R.) Flor. dan. t. 119. Polytrichum, officin.

Habitat in montosis circa Petropolim. Floret Majo. 2 Роса каменная. Russ.

POLYPODIUM. Fructificationes five capsulae per inferiorem frondis partem in globulos dispositae.

677. **POLYPODIUM VULGARE.** Frondibus pinnatifidis, laciniis oblongis subferratis obtusis, radice squamata, (paleis ferrugineis.) (F.) Zorn plant. offic. ic. 1. t. 46. Polypodium, officin.

Habitat in saxosis circa Petropolim. Floret Maio.
 2 Папоротникъ солодковый. Russ.

678. POLYPODIUM PHEGOPTERIS. Frondibus subbipinnatis, pinnis oppositis: superioribus pinnula trapezoide conjunctis, infimo pari deflexo, pinnulis obtusis, glomerulis capsularum dimidiam marginis partem occupantibus. (G.) Bolton. fil. Brit. 1. t. 20.

Crescit ubique in sylvis humidis umbrosis. Floret Julio, Augusto. 2 Папоротникъ вязовый. Russ. Sob.

679. POLYPODIUM CRISTATUM. Frondibus subbipinnatis, pinnulis oblongis obtusis ferratis: ferraturis ciliatis, glomerulis capsularum duplici serie dispositis. (Sob. R.) Bolton fil. Brid. 1. t. 23.

Habitat in septentrionali regione montis Duderovii, alias nullibi observatum. Floret Augusto.
 2 Папоротникъ гребенчатый. Russ. Sob.

680. POLYPODIUM FILIX MAS. Frondibus bipinnatis, pinnulis obtusis crenulatis, stipite paleaceo, (semicylindrico. Flores reniformes.) (G.) Blackw. herb. t. 323. Filix mas officin.

Ad radices arborum in sylvis umbrosis humidis passim. Floret Junio, Julio. 2 Папоротникъ. Russ. Папоротникъ мужескій. Sob.

681. POLYPODIUM FILIX FOEMINA. Fronde bipinnata: pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. (Flores ovati, subciliati, solitarii.) (G.) Blackw. herb. t. 325.

In umbrosis insulae lapideae et passim. Floret Julio. 2 Папоротникъ женскій. Russ. Sob.

682. POLYPODIUM THELYPTERIS. Fronde bipinnata: pinnis pinnatifidis integerrimis subtus undique glomerulis capsularum tectis. Olim Acrotichum Thelypteris. (G.) Flor. dan. t. 760.

Ad radices arborum frequens est. Floret Iulio.
 2 Папоротникъ мягкокрылый. Russ. Sob.

683. POLYPODIUM REGIUM. Frondibus bipinnatis, pinnis suboppositis; pinnulis alternis laciniatis. (Sob.) Vaillant. flor. paris. t. 9. f. 1.

Habitat in sylvis humidis umbrosis inter Sarscoje felo et urbem Gatzinam. Floret Iulio, Augusto.
 2 Папоротникъ Царскій. Russ. Sobol.

684. POLYPODIUM DRYOPTERIS. Frondibus inpradecompositis: foliolis ternis bipinnatis. (G.) Flor. dan. t. 759.

Crescit ad arborum radices in locis humidis passim. Floret Iunio, Iulio. 2 Папоротникъ дубовый. Russ. Sob.

ISOETES. Flores masculi: Anthera intra basin frondis sessilis. Fructificatio foeminea: Capsula bilocularis intra basin frondis.

685. ISOETES LACUSTRIS. Foliis subulatis semiteretibus recurvis. (Folia cepacea fasciculata radicalia, basi interiori florifera.) (P.) Flor. dan. t. 195.

Habitat circa Petropolim in fundis lacuum. Floret Iulio. 2 Полушилица озерная. Russ. Sobol.

M U S C I.

I.

Frondefi petalo calyptrato ftyligero , bafi dehiscente ; capfula operculata. Hedwigii.

SPHAGNUM. Flos malculus? clavatus: antheris planis, (e ramulis superioribus.) Capfulae in eadem planta; operculatae feffiles fine calyptra integra: ore laevi.

686. **SPHAGNUM PALUSTRE.** Ramis deflexis. (Foliis ovato-carinatis, reticulato punctatis pelucidis. Capfulae diffiliunt cum fono et crepitu.) (G.) Flor. dan. t. 474.

Habitat ubique in paludibus. In diftrictu coporienfi integras paludes tegit. Variet etiam colore rubro. Floret Iunio, Iulio. 24 Мохъ. Russ. Мохъ обыкновенный. Sob.

FONTINALIS. Gemma in eadem planta cum capfula fubfeffili perichaetiis imbricato-obvoluta et calyptra minuta.

687. **FONTINALIS PENNATA.** Foliis bifariis patentibus, antheris (capfulis) lateralibus. Lin. (R.) Dillen. mufc. 250. t. 32. f. 9.

Habitat in fylvis umbrofis humidis ad trrncos arborum circa Petropolim. Floret Aprili. 24 ифто-чница перифшая. Russ. Sob.

BUXBAUMIA. Gemma orbicularis. Capfula pedunculata: periftomate externo fexdecim dentato: interno membranaceo plicato.

688. BUXBAUMIA APHYLLA. Aphylla, pedunculo elongato. (R.)

Habitat in sylvis districtus Careliensis. Floret Iunio. 2 Мохъ безлистный. Russ. Sob.

SPLACHNUM. Gemma orbicularis, terminalis. Capsula in alia planta cylindrica cum calyptra et apophysi maxima: peristomate octodentato.

689. SPLACHNUM AMPULLACEUM. Umbraculo ampullaceo obconico. (G.) Flor. dan. t. 822.

In palustribus circa Kalinkinam et Caterinhofium. Floret Iunio, Iulio. 2 Мохъ пузырьчатый. Russ. Sob.

POLYTRICHUM. Gemma orbicularis, terminalis. Capsula in alia planta calyptra munita, peristomatis externi dentibus triginta duobus.

690. POLYTRICHUM COMMUNE. Surculo simplici prolifero, foliis lineari lanceolatis, ferrulatis, capsulis oblongis tetraëdris, calyptris villosis. (G.) Hedwig. hist. musc. frond. 1. t. 9. f. 62 - 64. et 2. t. 7. f. 37. Adiantum aureum, officin.

In locis humidis circa Murinam, et ad Cimetarium sti. Iohannis integros colliculos vestit. Floret Majo. 2 Кокушкинъ лезъ обыкновенный. Russ. Sob.

691. POLYTRICHUM JUNIPERINUM. Surculo simplici prolifero, foliis lineari-lanceolatis integerrimis mucronatis, capsulis oblongis tetraëdris: calyptris villosis. (Sob.) Flor. dan. t. 195.

Habitat in uliginosis et umbrosis Pargelovii, et Murinae. Floret Majo. 24 Кокушкинъ лѣнь гладколистый. Russ. Sob.

692. POLYTRIBHUM PILIFERUM. Surculo simplici, foliis lanceolatis integerrimis, apice piliferis, capsulis cylindricis: operculi acumine longe producto: calyptris villosis. P. commune γ . Linn. (Sob.) Dillen. musc. t. 54. f. 3.

Habitat in locis turficeis circa Monasterium Alexandronewsky. Floret Aprili, Majo. 24 Кокушкинъ лѣнь волосковатый. Russ. Sob.

693. POLYTRICHUM UNDULATUM. Surculo simplici, foliis lanceolatis ferratis undulatis, capsulis cylindricis: operculi acumine longe producto; calyptris dimidiatis glabris. Bryum undulatum. Linn. (R.) Hedwig. crypt. 2. p. 46. t. 15. /3

Habitat in sylvis humidis. Floret Majo. Кокушкинъ лѣнь волнистый. Russ. Sob.

MNIUM. Gemma orbicularis, rarius capitata. Capsulae, ut plurimum in alia planta, calyptra munitae: peristomatis dentibus sexdecim, rarius quatuor.

I.

Gemmis capsulisque in eadem planta. Peristomate interno ciliis sexdecim membranaceis planis.

Funaria, seu Koelreutera.

Observ. Musci frondosi Hedwigii omnes sunt, ut videt. perennes, florent primo vero et autumnno, in his regionibus, in temperatioribus vero plurimi hyeme.

694. MNIUM HYGROMETRICUM. Surculo sub-
simplici, foliis oblongis acuminatis, capsulis ova-
tis nutantibus: operculis planis. (R.) Flor. dan.
t. 648.

Habitat in sylvis apricis circa Petropolim. Flo-
ret Aprili, Majo. Звѣздочный мохъ водомѣр-
ный. Russ. Sob.

2.

Gemmis capsulisque in diversa planta, illis capi-
tatis harum peristomate simplici; peristomatis
dentibus quatuor. Tetraphis, five Georgia.

695. MNIUM PELLUCIDUM. Surculo simplici,
foliis ovatis, capsulis cylindricis. (R.) Flor. dan.
t. 300.

In uliginosis circa Petropolim. Floret Aprili.
Звѣздочный мохъ прозрачный.

3.

Peristomatis dentibus sexdecim. Dicranum.

696. MNIUM PURPUREUM. Surculo ramofo, fo-
liis oblongis acutis carinatis, capsulis subcylin-
dricis, setis axillaribus. (R.) Dillen. musc. t. 49.
f. 51.

In pratis et pascuis. Floret. Majo. Звѣздочный
мохъ пурпуровый. Russ. Sob.

697. MNIUM SCOPARIUM. Surculo ramofo, fo-
liis lineari-lanceolatis recurvis secundis, capsu-
lis erectis, oblongo-cylindricis-operculis con-
cis acuminatis. Olim Bryum scoparium. Linn.
(G.) Hedwig. fund. hist. musc. frond. 2. t. 8. f.
41. 42.

In fylvis infulae Bafileenfis et paffim. Floret Majo.
Звѣздочный мохъ вѣничный Russ. Sob.

698. MNIUM HETEROMALLUM. Surculo fimplici, foliis fetaceis recurvis, capfulis ovatis: operculis acuminatis recurvis. Bryum heteromallum. Linn. (G.) Hedw. crypt. 3. p. 72. 4. 26.

Ad fossas viarum. Floret Aprili, Majo. Звѣздочный мохъ разносторонный. Russ. Sob.

4.

Peristomate interno e membrana ciliis difformibus.

699. MNIUM FONTANUM. Surculo fubramoso erecto, foliis lanceolatis apice fetaceis incurvis, capfulis subrotundis obliquis: operculo conico umbilicato obtufo. (R.) Flor. dan. t. 299.

Habitat ad fontes et rivulos paludofos. Floret Majo. Звѣздочный мохъ ручейный. Russ. Sob.

700. MNIUM PALUSTRE. Surculo ramofo dichotomo, foliis fubulatis acutis carinatis, capfulis oblongis; operculis conicis. (R.) Dillen. mufc. t. 31. f. 3.

In paludibus frequens est. Floret Aprili, Majo. Звѣздочный мохъ болотный. Russ. Sob.

701. MNIUM CAESPITITIUM. Capfulis pendulis, foliis lanceolatis acuminato-fetaceis, pedunculis longiffimis. (R.) Hedwig. fnd. hift. mufc. frond. 2. 4. 3. f. 12. et. 4. 10. f. 67.

5.

702. MNIUM SERPYLLIFOLIUM. Capfulis cernuis, pedunculis aggregatis, foliis obovatis inte-

gerrimis obtusis punctatis. (G.) Dillen. musc. t. 53. f. 81.

Habitat in monte Duderovo, et in infulis apothecaria lapidea, Bafileenfi que frequens est. Floret Aprili, Majo. Звѣздочный мохъ круглослистый. Russ. Sob.

703. **MNIUM CUSPIDATUM.** Capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis foliis ovatis acutis ferratis. (G.) Vaill. parif. 26. f. 18.

In sylvis humidis passim. Floret Aprili, Majo. Звѣздочный мохъ остролистый. Russ. Sob.

704. **MNIUM PROLIFERUM.** Capsulis nutantibus pedunculis aggregatis, foliis rosaceo - congestis lanceolatis acutis. (G.) Dillen. musc. t. 52. f. 77.

Habitat in sylvis humidis, et hortis. Floret Aprili, Majo. Звѣздочный мохъ плодовишый. Russ. Sob.

705. **MNIUM UNDULATUM.** Capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis ferrulatis. (Sob.) Dillen. musc. t. 52. f. 76.

Habitat in memoribus humidis circa fabricam pyriam Ochensem et passim. Floret Aprili, Majo. Звѣздочный мохъ волнистый. Russ. Sob.

BRYUM. Gemmae saepe axillares, nunc in alia, nunc in eadem planta cum capsulis calyptra munitis, pedunculo terminali ex tuberculo exeunti infidentibus.

1.

Gemmis conspicuis nullis. Webera

706. BRYUM POMIFORME. Surculo ramofo, foliis lineari-lanceolatis feta terminatis imbricatopatulis, capsulis sphaericis: operculo plano. (G.) Dill. musc. t. 44. f. 1.

Habitat circa Murinam in fylvis, et passim. Floret Majo. Узловый мохъ яблочковый. Russ. Sob.

707. BRYUM MNIOIDES. Surculo subfimplici, foliis linearibus, capsulis pyriformibus nutantibus: operculis conicis. Olim Mnium pyriforme. Linn. (G.) Hedwig. Cryptog. 1. t. 3. et fundam. hist. musc. frond. 1. t. 3. f. 12.

Habitat in fylvis ad Saxa. Floret Aprili, Majo. Узловый мохъ грушкоголовый. Russ. Sob.

2.

Peristomate sexdecim-dentato, simplici; gemmis axillaribus. Leerfia.

708. BRYUM PULVINATUM. Surculo ramofo, foliis oblongis piliferis, capsulis, subrotundis nutantibus: calyptris minutis. (R.) Dillen. musc. t. 50. f. 65.

Habitat in tectis et saxis. Floret Aprili, Majo. Узловый мохъ пыльный.

3.

Peristomate praeter dentes ciliis spiraliter convolutis munito: Tortula.

709. BRYUM SUBULATUM. Surculo brevissimo simplici, foliis ovatis obtusiusculis, capsulis cy-

lindricis: operculo conino acuto. (R.) Hedwig.
fund. hist. musc. frond. 2. t. 8. f. 38 - 40.

Habitat in pratis et sylvis humidis circa Petro-
polim. Floret Aprili, Majo. Узловый мохъ ши-
листый. Russ. Sob.

4.

Gemmis in alia, capsulis in alia planta; peristo-
mate nudo : Gymnostomum.

710. BRYM TRUNCATULUM. Foliis explanatis
mucronatis, capsulis truncatis. (R. B.) Hedwig.
crypt. 1. p. 13. t. 5.

Habitat ad agros, fossas, et fepes. Floret Majo.
Узловый мохъ шупоголовый. Russ. Sob.

5.

Peristomate sexdecimdentato, simplici; gemmis
sparsis: Grimmia.

711. BRYUM APOCARPUM. Capsulis sessilibus
terminalibus, calyptra minima. (B. R.) Hedwig.
crypt. 1. 4. p. 104. t. 39.

Habitat ad truncos arborum. Floret Aprili.
Узловый мохъ верхоголовый. Russ. Sobol.

712. BRYUM SETACEUM. Foliis setaceis, capsu-
lis pyriformibus: pedunculis recurvatis. Olim
Mnium setaceum. Linn. (R.) Hedwig. crypt.
4. p. 102. t. 38.

Habitat in aggeribus, sepibus et muris faxisque,
circa Petropolim. Floret Aprili, Majo. Узловый
мохъ щетинистый. Russ. Sob.

6.

Gemmis terminalibus capitatis. Weiffia.

713. BRYUM VIRIDULUM. Capsulis ovatis erectis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato patulis. (Folia viridissima. Capsulae flavescentes, ciliatae.) (G.) Curtis Flor. Londin. 132. a.

Nabitat in agris, et aggeribus. Locis ficcis delectatur et terram tapetis instar tegit. Узловый мохъ зелененькій. Russ. Sobol.

7.

Peristomate interno ciliato, ciliis spiraler con-
volutis. Barbula.

714. BRYUM RURALE. Surculo ramofo, foliis reflexis obovatis obtufis apice piliferis, capsulis cylindricis: operculis conicis acutis. (G.) Dillen. musc. t. 45. f. 12.

Habitat in truncis arborum et tectis rusticorum. Circa montem Duderovum, et passim. Floret Majo. Узловый мохъ деревенскій. Russ. Sob.

8.

Ciliis difformibus e membrana carinata.

715. BRYUM ANDROGYNUM. Surculo ramofo erecto, foliis lanceolatis patulis, capsulis cylindricis: operculis acuminatis, feta terminali. Olim Mnium androgynum. Linn. (G.) Flor. dan. t. 299.

In fylvis humidis frequens. Floret Aprili, Majo. Узловый мохъ мужноженскій. Russ. Sob.

716. BRYUM SQUARROSUM. Capsulis obliquis, foliis quinquefariis imbricatis recurvis, caule ferrugineo tomentoso. (G.) Buxb. cent. 4. t. 65. f. 1.

In pratis humidis circa Caterinhoffium et passim. Floret Majo. Узловый мохъ шелушчатый. Russ. Sob.

HYPNUM. Gemmae in alia ut plurimum planta. Capsulae pedunculo laterali ex perichaetio prodeunti insidentes: peristomate exteriori sexdecim-dentato.

I.

Gemmis capsulis que in eadem planta, peristomate simplici. Fiffidens.

Fronde pinnata.

717. HYPNUM TAXIFOLIUM. Fronde simplici basi fetifera: pinnis oblongis acutis, capsulis oblongis: operculo acuminato. (B. R.) Flor. dan. t. 473. f. 2.

Habitat in sylvis umbrosis circa Petropolim. Floret Majo. Сучковый мохъ пшисолистый. Russ. Sob.

718. HYPNUM BRYOIDEES. Fronde simplici apice fetifera: pinnis oblongis acutis; capsulis oblongis: operculis acutis. (B. R.) Flor. dan. t. 473. f. 1.

In umbrosis passim. Floret Aprili, Majo. Сучковый мохъ узловатый. Russ. Sob.

2.

Gemmis in alia, capsulis in alia planta, peristomatibus interni ciliis apice liberis. Neckera.

719. HYPNUM DENDROIDES. Surculo erecto inferne nude superne fasciculato ramofo folioso, foliis linearilanceolatis imbricatis, capsulis subcylindricis erectis: operculi rostello incurvo. (B. R.) Flor. dan. t. 823. f. 2.

In pratis sylvisque subhumidis passim. Floret Aprili, Majo. Сучковый мохъ древообразный. Russ. Sob.

720. HYPNUM CURTIPENDULUM. Surculis erectis ramosis teretibus foliosis, foliis oblongo-ovatis acutis imbricatis, capsulis nutantibus ovatis: operculis acuminatis. (B. R.) Dillen. musc. t. 43. f. 69.

Habitat ad radices arborum et saxorum. Floret Majo. Сучковый мохъ висячеголовый. Russ. Sobol.

721. HYPNUM SERICEUM. Surculo ramofo repente, foliis oblongis seta terminatis ante imbricatis, capsulis erectis cylindricis: operculis acuminatis recurvis. (G.) Curtis fl. Londin. t. 126.

Habitat in pratis ficcis et ad truncos arborum. Floret Majo. Сучковый мохъ шелковистый. Russ. Sob.

3.

Peristomatibus internis ciliis uniformibus basi membranacea connexis. Leskea.

722. HYPNUM FILIFOLIUM. Surculis ramofo; ramis brevissimis, foliis subulatis acutis, capsulis

oblongis: operculis conicis obtusis. (B. R.) Dillen. musc. t. 42. f. 62.

Habitat ad radices arborum in humidis. Floret Aprili, Majo. Сучковый мохъ нишчапый. Russ. Sob.

723. HYPNUM COMPLANATUM. Frondibus complanatis ramosissimis, foliis distichis imbricatis ovato-obtusis complicatis, capsulis ovatis: operculo conico. (B. R.) Dillen. musc. t. 34. f. 7.

Habitat at truncos arborum passim. Floret Majo. Сучковый мохъ сплюснутый. Russ. Sob.

724. HYPNUM SERPENS. Surculis repentibus filiformibus, foliis fetaceis, capsulis cylindricis inflexis: operculo conico. (B. R.) Dillen. musc. t. 42. f. 65. A.

Habitat ad ligna, saxa, caudices arborum. Floret Majo. Сучковый мохъ ползучий. Russ. Sob.

4.

Surculis vagis.

725. HYPNUM FLUITANS. Surculis ramosis, foliis ovatis acutis patulis. Capsulis oblongis obliquis: operculis conicis. (G.) Willden. prodr. fl. berol. n. 957.

Habitat ad ripas humidas et rivulos. Floret Majo. Сучковой мохъ плывущий. Russ. Sob.

726. HYPNUM TRIQUETRUM. Ramis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis, surculis pinnatis. (B. R.) Dillen. musc. t. 38. f. 28.

Habitat in pratis et fylvis humidis. Floret Aprili et Septembri. Сучковый мохъ проесторонный. Russ. Sob.

5.

Surculis pinnatis.

727. HYPNUM FILICINUM. Surculo simpliciter pinnato, foliis oblongis acuminatis reflexis secundis, capsulis subcylindricis: operculis convexis. (G.) Dillen. musc. t. 36. f. 19.

Passim in fylvis humidis. Floret Majo. Сучковый мохъ папоротный. Russ. Sob.

728. HYPNUM PROLIFERUM. Surculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. (G.) Curtis fl. Londin. t. 9.

Habitat in truncis arborum circa limites districtus coporienfis et Jamburgensis, et passim. Floret Majo. Сучковый мохъ плодовиный. Russ. Sob.

729. HYPNUM PRAELONGUM. Surculis subpinnatis decumbentibus: ramulis remotis, foliis ovatis, capsulis cernuis. (G.) Dillen. musc. t. 35. f. 15.

Habitat in fylvis humidis. Floret Majo. Сучковый мохъ предлинный. Russ. Sob.

730. HYPNUM CRISTA CASTRENSIS. Ramulis approximatis; apicibus recurvis. (B. R.) Dillen. musc. t. 36. f. 20.

Habitat ad radices abietinos. Floret Majo et Septembri. Сучковый мохъ, военное перо. Russ. Sob.

6.

Surculorum foliis reflexis.

731. HYPNUM CUPRESSIFORME. Surculis subpinnatis, foliis fecundis recurvis apice subulatis. (B. R.) Dillen. musc. t. 37. f. 23.

Habitat in sylvis ad arborum truncos, et radices. Floret Aprili, Majo. Сучковый мох кипарисный. Russ. Sob.

732. HYPNUM SQUARROSUM. Surculis ramosis, foliis lanceolatis acutis, capsulis oblongis: operculis acutis. (B. R.) Flor. dan. t. 535. f. 2.

In nemoribus subhumidis. Floret Aprili, Majo. Сучковый мох шелушчатый. Russ. Sob.

7.

Surculis fasciculatis.

733. HYPNUM ALOPECURUM. Surculo erecto-ramis fasciculatis terminalibus subdividis, capsulis subnutantibus. (B. R.) Dillen. musc. t. 41. f. 49.

In sylvis humidiusculis. Floret Aprili et Septembri. Сучковый мох лисехвостый. Russ. Sob.

8.

Surculis teretiusculis.

734. HYPNUM PURUM. Surculis pinnato-sparsis subulatis, foliis ovatis obtusis subulatis. (B. R.) Curtis flor. Londin. t. 207.

Habitat in nemoribus et pratis pascuis. Floret Majo. Сучковый мох чистый. Russ. Sob.

735. HYPNUM RIPARIUM. Surculis teretibus ramosis, foliis acutis patulis distantibus. (B. R.) Flor. dan. t. 649. f. 1.

Habitat ad ripas Nevae fluvii. Floret Aprili, Majo. Сучковый мохъ береговой. Russ. Sob.

736. HYPNUM CUSPIDATUM. Surculis, pinnato-ramosis apice longe cuspidatis, foliis oblongo-acuminatis, capsulis cylindricis: operculis conicis. (B. R.) Dillen. musc. t. 39. f. 34.

Habitat in paludibus passim. Floret Aprili et Septembri. Сучковый мохъ оспроконечный. Russ. Sob.

9.

Surculis confertis.

737. HYPNUM VELUTINUM. Surculo repente: ramis confertis erectis, foliis subulatis, capsulis subnutantibus. (G.) Flor. dan. t. 475.

Habitat in tectis vetustis et muris. (G.) In fylvis umbrosis ad radices arborum, Murine et Pargelovii. (Sob.) Сучковый мохъ бархашный. Russ. Sobol.

II. Musci hepatici, petalo calyptrato styligero, ex apice dehiscente; capsula quadrivalvi. Hedwigii.

JUNGERMANNIA. Scyphuli vesiculiferi squamulae gemmiferae laterales aut capitula pulverulenta. Capsula pedunculata, nuda, quadrivalvis: seminibus subrotundis.

* Caulescentes, frondibus compositis, pinnatis.

738. JUNGERMANNIA BIDENTATA. Surculis procumbentibus ramosis apice pedunculiferis; pinnis ovatis bicuspidatis: stipulis lanceolatis quadridentatis. (R.) Dillen. musc. 15. t. 70. f. 11.

Habitat in umbrosis ericetis circa Petropolim. Floret Majo. Тѣнный мохъ двузубиспый. Russ. Sob.

739. JUNGERMANNIA BICUSPIDATA. Frondibus medio pedunculiferis: pinnis distichis incisobifidis. (R.) Dillen. musc. t. 70. f. 13.

Habitat in umbrosis humidis. Floret Majo. Тѣнный мохъ двустрѣбный. Russ. Sob.

** Frondibus subbipinnatis.

740. JUNGERMANNIA REPTANS. Surculis decompositis medio pedunculiferis, foliis quadratis anterius incis: stipulis quadrifidis (R.) Dillen. musc. t. 71. f. 24.

Habitat in ericetis udis. Floret Aprili, Majo. Тѣнный мохъ ползущій. Russ. Sobol.

*** Frondibus imbricatis.

741. JUNGERMANNIA COMPLANATA. Surculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicatoimbricatis, ramis aequalibus. (R.) Curtis Flor. Londin. t. 271.

Habitat ad truncos et radices arborum. Floret Aprili, Majo. Тѣнный мохъ сплюснутый. Russ. Sob.

742. JUNGERMANNIA DILATATA. Surculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-

imbricatis, ramis apice latioribus. (R.) Dillen. musc. t. 72. f. 27.

Adtruncos arborum in sylvis umbrosis. Floret Majo. Тѣнный мохъ розширенный. Russ. Sob.

743. JUNGERMANNIA TAMARISCIFOLIA. Surculis decompositis apice pedunculiferis, foliis subrotundis subtus auriculatis : stipulis ovatis emarginatis. (Sob. R.) Dillen. musc. t. 72. f. 31.

Habitat ad truncos arborum in monte Duderovo, et Murinae. Floret Aprili, Majo et Septembri. Тѣнный мохъ гребенщиколисный. Russ. Sob.

744. JUNGERMANNIA PLATYPHYLLA. Surculis procumbentibus subtus imbricatis, foliis cordatis acutis. (R.) Dillen. musc. t. 72. f. 32. 33.

Habitat in sylvis circa Petropolim. Floret Aprili, Majo. Тѣнный мохъ широколисный. Russ. Sob.

745. JUNGERMANNIA CILIARIS. Surculis repentibus supra tomentosis, foliis integris tomentosis. (Sob.) Villant. flor. Paris. t. 26. f. 11.

Habitat ad truncos arborum betulae in insula apothecaria, et lapidea, et passim. Floret Aprili, Septembri. Тѣнный мохъ реснистый. Russ. Sob.

746. JUNGERMANNIA PUSILLA. Surculis brevissimis apice floriferis, foliis imbricatis antherius crenatis, cauliculo subtus villoso. (R. Sob.) Dillen. musc. t. 74. f. 46.

Habitat in ericetis humidis circa Murinam. Floret Majo. Тѣнный мохъ мѣлкій. Russ. Sob.

*** Acaules.

747. *JUNGERMANNIA EPIPHYLLA*. Foliolo frondi innato. (R.) Flor. dan. t. 359.

Habitat in ripis umbrosis udis Nevae fluvii Floret Aprili. Тѣнный мохъ верхолистный. Russ. Sob.

748. *JUNGERMANNIA PINGUIS*. Fronde oblonga finuata pingui. (R. Sob.) Dillen. musc. t. 74. f. 42.

Habitat in paludibus et ad rivulos circa fabricas lateriias, et porcellaneam. Floret Aprili, Majo et Septembri. Тѣнный мохъ жирный. Russ. Sob.

MARCHANTIA. Capsula sessilis, campanulata. Gemma peltata pedunculata, inferne feminifera. (Filamentum unum.)

749. *MARCHANTIA POLYMORPHA*. Surculis obtuse lobatis, capsulis stellatim decemfidis. (Ex antheris proliferis exit lana lutea quae sponte movetur in anthera, dum pollen atomi instar exstillat. D. Sahlberg.) (G.) Schmidel ic. plant. et anal. part. t. 9.

Habitat in sylvis umbrosis humidis, et hortis cultis, juxta aquas, in que Scaturiginibus passim. Floret Julio, Augusto. 24 Лепесточница многообразная. Russ. Sob.

Observatio. Omnes Jungermanniae sunt perennes, aut durant per plures annos, et florent primo vere, et profundo autumnos; in regionibus temperatoribus hyeme.

750. MARCHANTIA UMBELLATA. Capsulis multilobis: pedunculo tetraëdro. (Sob.) Dillen. musc. t. 76. f. 6. C. D. et t. 77. f. 7. D.

Habitat in infulae apothecariae rivulo umbroso, paludoso versus infulam lapideam, et in monte Pulcovo circa et intra puteum, alibique frequens. Floret Julio. 2/ Лепесточница шапковидная. Russ. Sob.

751. MARCHANTIA HEMISPHERICA. Surculis crenatis, capsulis hemisphaericis quinquefidis. (Capitulum hemisphaericum subtus globulis quinque diffidentibus pollenque effundentibus.) (Sob.) Flor. dan. t. 762.

Habitat in fossis circa Nosocomia terrestre, et maritimum atque in paludosis passim. Floret Aprili. 2/ Лепесточница полукруглая. Russ. Sob.

A L G A E.

BLASIA. Flos masculus? sessilis, subglobosus, frondi immerfus.

Flos foemineus? Pistillum unum. Capsula ovata, unilocularis, tubo coronata, per quem femina prorumpunt.

752. BLASIA PUSILLA. Bl. fronde lobata, lobis subrotundis, nervis fetiferis. Hall. B. pusilla lichenis pixidati facie. Michel. (R.) Flor. dan. t. 45.

Habitat ad latera fossarum arenosa Caterinhoffii. Floret Julio. an. 2/? Пдлесточница мѣлкая. Russ. Sob.

RICCIA. Capsulae sessiles, globosae, uniloculares, frondi ad apicem innatae, femina viginti ad triginta alba vel fusca hemisphaerica continentis.

753. **RICCIA CRYSTALLINA.** Frondibus superficie papillofis, (margine incrassatis, reticulatis, denticulatis, obtusis, simplicibus et cordatis.) (R. Sob.) Dillen. musc. t. 78. f. 12.

Habitat in insula Beseleensi, et Caterinhoffii locis umbrosis subhumidis. Floret Iulio, Augusto. an. 2? Решетница хрустальная. Russ. Sob.

754. **RICCIA MINIMA.** Frondibus glabris bipartitis acutis. (Nitida, segmentis angustioribus, super terram expansis. Est tantum varietas Ricciae glaucae observante D. Schmidelio.) (R. Sob.) Dillen musc. t. 78. f. 11.

Habitat in ripis Nevae fluvii inundatis. Floret Iunio. an. 2? Решетница малышная. Russ. Sob.

755. **RICCIA FLUITANS.** Frondibus dichotomis lineari-filiformibus, (lineari-ramosis, planis, primordialis obtusis.) (L.) Dillen. musc. t. 74. f. 47.

Habitat in fossis ad ripas supra aquam extensa. Floret Iunio, Iulio. an. 2? Решетница волнистая. Russ. Sob.

ANTHOCEROS. Scyphuli sessiles, cylindrici integras gemmas granulofas exhibentes. Capsula subulata, subbivalvis; feminibus dissepimento adhaerentibus.

756. ANTHOCEROS LAEVIS. Fronde plana crenata. (A. frondibus indivisis sinuatis laevibus. Leers. — Folia in caespites orbiculatos congeruntur, superne concava, ovalia aut subrotunda, margine leviter sinuata, laete viridia, splendentia, glabra. Cornu e perichaetio cavo surgit, erectum, teres, filiforme, glabrum, laeteviride, apice flavicans, maturitate inchoante diffiliens, et filamentum valvas interstinguens.) (R.) Dillenmusc. t. 68. f. 2.

Habitat in nemoribus Caterinhoffii. Floret Majoran. 24? Цвѣторосѣ гладкій. Russ. Sob.

LICHEN. Receptaculum feminum subrotundum, planiusculum, verruciforme, tuberculofum, scutellatum aut peltatum. (saepe marginatum.)

I.

Leprosi tuberculati. Verrucariae.

757. LICHEN SCRIPTUS. Albicans lineolis atris planis divisis simplicibusque. (Sob.) Hofman. lichen. t. 11. f. 2. a. b. c. d. et

β.) Lichen hebraicus. Hoffm. lichen. p. 13. t. 3. f. 2. e.

γ.) Lichen pulicaris. Hoffm. lichen. p. 14. t. 3. f. 2. f.

Observatio. Lichenes videntur esse fere omnes Longaevi sive perennes, et florent primo vere vel autumno, in regionibus vero temperatioribus etiam hyeme, aut potius omni tempore.

Habitat in corticibus arborum, praecipue Alni, Sorbi aucupariae et Populi tremulae, passim. Лишай, five поросль. Russ. Лишай писменный. *β*. Лишай Еврейский. *γ*. Лишай блошный. Sob:

758. LICHEN RUGOSUS. Albicans, lineolis simplicibus punctis que nigris confertis. (R.) Dillen. musc. t. 18. f. 2.

Habitat in fylvis supra arborum truncos. Лишай морщиновашый. Russ. Sob.

759. LICHEN ATROVIRENS. Viridis, margine tuberculis que atris. (Sob.) Wulfen. ap. Iacq. coll. 11. t. 14. f. 2.

Habitat in saxis antiquis circa fabricam pyriam Ochtensem. Лишай чернозеленый. Russ. Sob.

760. LICHEN BYSSOIDES. Farinosus, peltis stipitatis subglobosis. (Sob.) Dillen. musc. t. 14. f. 5.

In Saxis antiquis graniticis et in terra nuda, Pargelovii, et ultra Ochta. Лишай шелковистый. Russ. Sob.

761. LICHEN ERICETORUM. Albidus, tuberculis stipitatis convexis carneis. (Sob.) Hoffm. lich. t. 8. f. 3.

Habitat in ericetis passim. Лишай вересный. Russ. Sob.

762. LICHEN LACTEUS. Albus, tuberculis concoloribus haemisphaericis. (Sob.) Wulffen. ap. Iacq. coll. 3. t. 4. a. b.

Habitat in lapidibus aëri expositis, et rupibus atque in lignis femiputridis. Лишай молочный. Russ. Sob.

763. LICHEN RUPICOLA. Albidus, tuberculis pallidis albo-marginatis. (Sob.) Hoffm. lich. t. 6. f. 3.

Habitat in faxis, ad littora marina. Лишай каменогорный. Russ. Sob.

764. LICHEN PERTUSUS. Verrucis subteffellatis laevigatis pertusis, poro uno alterove cylindrico. (Sob.) Flor. dan. t. 766.

Habitat in corticibus arborum et in lapidibus. Лишай проколошый. Russ. Sob.

765. LICHEN SANGVINARIUS. Cinereo viref-cens, tuberculis atris. (Tubercula majuscula, gibba, atra, at diffracta intus rubra sunt.) Wullffen. ap. Iacq. coll. 3. t. 5. f. 3. b.

Habitat in truncis arborum et faxis circa pagum Rjabova, et Pargelovii. Лишай кровавистый. Russ. Sob.

766. LICHEN FUSCO-ATER. Fuscus tuberculis atris. (Sob.) Wullffen. ap. Iacq. coll. 2. t. 14. f. 3. 4. et 3. t. 6. f. 2. bb.

Habitat ad faxa antiqua Peterhoffii. Лишай темночерный. Russ. Sob.

767. LICHEN CALCAREUS. Candidus, tuberculis atris. (R.) Dillen. musc. t. 18. f. 8.

Habitat in rupibus circa Peterhovum. Лишай известочный. Russ. Sob.

768. LICHEN NIGER. Ater, tuberculis fubrotundis concoloribus. (Sob.) Flor. dan. t. 879. f. 1.

Habitat in faxis circa Strelinam, et Oranienbaumium. Лишай черный. Russ. Sob.

769. LICHEN FAGINEUS. Albus, tuberculis albis farinaceis. (Sob.) Hoffm. lichen. t. 2. f. 4.

Habitat in truncis arborum. Лишай вязовый. Russ. Sob.

2.

Scutellato - tuberculati.

770. LICHEN CANDELARIUS. Cruftaceus luteus; junior pulverulentus scutellatus; aetate subfoliaceus tuberculofus. (Sob.) Hoffm. lichen. 2. t. 9. f. 3.

Habitat in truncis arborum, in parietibus et sepimentis ligneis ac tectis domorum antiquis. Лишай свѣчный. Russ. Sob.

3.

Scutellati. Scutellariae.

771. LICHEN SUBFUSCUS. Cruftaceus albicans, scutellis subfuscis; margine cinereo subcrenato. (R.) Wilden. prodr. flor. berol. n. 1005.

Habitat in truncis arborum et rupibus faxofis. Лишай темноватый. Russ. Sob.

772. LICHEN SALICINUS. Flavus, scutellis convexiusculis aurantiis margine pallidioribus. (Sob.) Schrader.

Habitat in truncis annofis falicum circa viam Sarfcofelienfem. Лишай вербовный. Russ. Sob.

773. LICHEN PALLESCENS. Crustaceus albicans aerrucosus, scutellis pallidis. (Sob.) Wulffsen. vр. Iacq. coll. 3. t. 5.

Habitat in corticibus arborum in Ofinova Roschcza et Pargelovii. Лишай бледнѣющій. Russ. Sob.

774. LICHEN CORALLINUS. Ramosus teres fasciculatus fastigiatus confertissimus albus scutellis terminalibus minutissimis concoloribus. (Sob.) Wulffsen. ap. Iacq. coll. 2. t. 13. f. 2.

Habitat in rupibus ac lapidibus Peterhoffii in monte prope quercum cavernosam antiquissimam, et ad littus marimum prope Oranienbaum. Лишай коральковый.

775. LICHEN VERRUCOSUS. Crustaceus cinereus, scutellis virescentibus. (Sob.) Dillen. musc. t. 18. f. 9.

Habitat in ericetis, terrestris, ad viam Wiburgensem, prope pargelovium, et in multis aliis sylvis ficcis montosis. Лишай бородавчатый. Russ. Sob.

4.

Foliacei. Pulmonariae.

776. LICHEN CENTRIFUGUS. Foliolis obsolete multifidis laevibus albidis centrifugis, scutellis rufo-fuscis. (Sob.) Hoffm. lichen. 2. t. 10. f. 3.

Habitat in faxis, Pargelovii. Лишай средобѣрущій. Russ. Sob.

777. LICHEN STELLARIS. Foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis scutellis pullis. (G.) Hoffm. lichen. 2. t. 13. f. 1. 2.

Habitat in truncis et ramis arborum praesertim abiegnis passim. Лишай звёздочный. Russ. Sob.

778. LICHEN PULLUS. Foliolis lobatis olivaceis scutellis integerrimis. (Sob.) Hoffm. lich. 3. t. 13. f. 4. B.

Habitat in corticibus arborum circa viam Sarcocofeliensem. Лишай темный. Russ. Sob.

779. LICHEN OLIVACEUS. Foliolis lobatis nitidis olivaceis scutellis crenatis. (Sob.) Hoffm. lich. 3. t. 13. f. 5.

In truncis et ramis alneis, falicinis aliisque passim. Лишай оливчатый. Russ. Sob.

780. LICHEN SAXATILIS. Foliolis finuatis scabris lacunosis, scutellis badiis. (Sob.) Hoffm. lichen. 3. t. 15. f. 1.

Habitat passim in faxis circa viam Peterhoffianam ad ripam maritimam cum lichene paschali. Лишай каменистый. Russ. Sob.

781. LICHEN PARIETINUS. Foliolis crispis fulvis, peltis concoloribus. (Sob.) Hoffm. lich. 3. t. 18. f. s.

Habitat in parietibus ligneis, sepibus que suburbiorum, et in lignis corticibus ve arborum, passim. лишай стѣнный. Russ. Sob.

782. LICHEN PHYSODES. Foliolis angustis apice inflatis, scutellis pedicellatis. (G.) Wulf. ap. Jacq. coll. 3. t. 8.

In truncis Belulae vulgarissimus. лишай надушный. Russ. Sob.

783. LICHEN ATRATUS. Scutellis atratis concoloribus. (Sob.) Hedwig. Cryptogam. II. 3. t. 21. f. A.

Habitat in corticibus Alni, Populi et Sorbi aucupariae passim. Лишай черный. Russ. Sob.

5.

Gelatinofi.

784. LICHEN CRISPUS. Foliolis imbricatis lobatis truncatis crenatis atroviridibus, scutellis crenulatis. (Sob.) Wulfen. ap. Jacq. coll. 3. t. 10. f. 1.

Habitat in truncis arborum et lapidibus circa Caterinhoffium et Pargelovii. Лишай кудрявый. Russ. Sob.

785. LICHEN FASCICULARIS. Foliaceus erectus, scutellis terminalibus: junioribus concavis virescentibus; aetate turbinatis rufescentibus. (Sob.) Flor. dan. t. 462. f. 2.

Лишай пучечный. Russ. Sob.

6.

Foliacei laciniosi.

786. LICHEN CILIARIS. Erectiusculus, laciniiis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. (Sob.) Flor. dan. t. 711.

Habitat in truncis arborum Caterinhoffii, et Strelinae. Лишай реснистый. Russ. Sob.

787. LICHEN ISLANDICUS. Adscendes marginibus elevatis ciliatis, peltis terminalibus. (G.) Flor. dan. t. 155. Lichen islandicus, officin.

Habitat in fylvis sterilissimis ficcis montosis Pargelovii, in monte Poclonnaja, Ofinovae Roschczae, ad cimeterium sti Johannis, et in monte Dude-rovo aliis que similibus. Terrestris. Лишай исландский. Russ.

788. *γ* LICHEN TENUISSIMUS. LINN. Coralloides tenuissimum nigricans, mundi muliebris instar textum. (Sob.) Dillen. musc. 113. t. 17. f. 32.

Habitat Pargelovii fatis copiose cum lichene Islandico. Лишай пончайший. Russ. Sob.

789. LICHEN PULMONARIUS. Repens supra reticulato-lacunosus subtus fusco-tomentosus, pel-tis marginalibus. (G.) Hoffm. lichen. fascic. 1. t. 1. f. 2. Pulmonaria arborea, officin.

Habitat in truncis arborum circa Sarfcoje selo et passim. Лишай грудной. Russ. Sob.

790. LICHEN FURFURACEUS. Decumbens, furfuraceus laciniis acutis subtus lacunosus atris. (G.) Hoffm. pl. lichen. fasc. 2. p. 45. t. 9. f. 2.

Habitat circa Narawaldam et in fylvis uliginosis circa Petropolim, et passim in corticibus arborum. Лишай опрубяный. Russ. Sob.

791. LICHEN FARINACEUS. Erectus compressus ramosus, verrucis marginalibus farinosis. (Sob.) Dillen. musc. t. 23. f. 63.

In arboribus betulinis insularum apothecarie et lapideae occurrit, sed parva quantitate. Лишай мучный. Russ. Sob.

792. LICHEN CALYCARIS. Erectus linearis ramosus lacunosus convexus macronatus. (Sob.) Dillen. musc. t. 23. f. 62. A. B. C.

Habitat in arboribus et faxis circa Peterhoffium.
Лишай чашечный. Russ. Sob.

793. LICHEN FRAXINEUS. Erectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunofus glaber, scutellis subpedunculatis. (Sob.) Dillen. musc. t. 22. f. 59.

Habitat in truncis arborum Ofinovae Roschczae et circa Sarsoje Selo. Лишай ясенный. Russ. Sobol.

794. LICHEN PRUNASTRI. Erectiusculus lacunofus subtus tomentosus albus. (G.) Dillen. musc. t. 22. f. 54. 55.

Habitat in arboribus annofis Pargelovii et Muri-nae. Лишай шерновный. Russ. Sob.

795. LICHEN JUNIPERINUS. Crispus fulvus, pel-tis fuscis. (Sob.) Hoffm. lichen. fasc. 2. p. 35. t. 7. f. 2.

Habitat in juniperetis ad truncos arborum circa Strelinam, et Oranienbaumium. Лишай можже-вельный. Russ. Sob.

796. LICHEN CAPERATUS. Pallide viridis ru-gosus margine undulatus. (Sob.) Dillen. musc. 193. t. 25. f. 97.

Habitat ad arborum truncos et in faxis passim.
Лишай сморщенный. Russ. Sob.

797. LICHEN GLAUCUS. Depressus lobatus gla-ber, margine crispo farinaceo. (Subtus nigricans.) (Sob.) Flor. dan. t. 598.

Habitat in truncis et ramis betulinis, insylvis et in sepimentis ligneis hortorum suburbanorum.
Лишай сизый. Russ. Sob.

7.

Coriacei. Peltigerae.

798. LICHEN APHTHOSUS. Repens lobatus obtusus planus, verrucis sparsis, pelta marginali adscendente. (G.) Flor. dan. t. 767. f. 1. Muscus cumatilis, officin.

Habitat in fylva antiqua circa limites districtus Coporienfis et Jamburgensis, et circa Crasnoje selo, terrestris. Лишай прыщеватый. Russ. Sobol.

799. LICHEN CANINUS. Repens lobatus obtusus planus, subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente. (Supra saturate viridis, deficcatione cinereus, subtus niveus, longitudinaliter venosus subvillosusque, peltis ovalibus adscendentibus, normaliter concavo-convexis rubris. (G.) Flor. dan. t. 767. f. 2. Muscus caninus, officin.

Habitat in fylvis humidis et pratis ubique, praesertim ad fabricam pyriam Ochtensem. Лишай собачий. Russ. Sobol.

8.

Umbilicati. Umbilicarie.

800. LICHEN DEUSTUS. Undique laevis, supra cinereus, tuberculis nigris. (Sob.) Wulf. ap. Jacq. coll. 3. t. 15. f. 3.

Habitat in corticibus Populi tremulae et in faxis, in monte duderoovo. Лишай обожженный. Russ. Sobol.

9.

Scyphiferi.

801. LICHEN COCCIFERUS. Simplex intègerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. (G.) Dillen. musc. t. 14. f. 7. Muscus pyxidatus, officin.

Habitat in Pinetis sterilibus ad radices arborum, uti montem Poclonnaja. Лишай червцонесный. Russ. Sob.

802. LICHEN CORNUCOPIOIDES. Simplex folio breviorè; tuberculis coccineis. (R.) Dillen. musc. t. 14. f. 9.

Habitat in pinetis ficcis circa Petropolim terrestris. Лишай ивобилорогий. Russ. Sob.

803. LICHEN PYXIDATUS. Simplex crenulatus, tuberculis fuscis. (G.) Dillen. musc. t. 14. f. 6. B. C. et f. 8. B.

In pinetis ficcis ad radices arborum. Лишай коробчатый. Russ. Sob.

804. LICHEN FIMBRIATUS. Simplex denticulatus, stipite cylindrico. (R.) Dillen. musc. t. 14. f. 8. 9.

Habitat in Pinetis montosis circa Petropolim. Лишай брижеватый. Russ. Sob.

805. LICHEN GRACILIS. Dichotomo ramosus tuberculis fuscis. (Sob.) Dillen. musc. t. 14. f. 13. C.

Habitat in ericetis montosis sylvaticis, ad viam Wiburgensem Pargelovii et Ofinovae Roschczae. Лишай шощий. Russ. Sob.

806. LICHEN DIGITATUS. Ramosissimus: ramis cylindricis, calycibus integris nodosis. (Sob.) Dillen. musc. t. 15. f. 19.

Habitat in pinetis montosis sterilibus ad fabricam ferream Debunicam et in declivibus Pargelovii. Лишай перстоватый. Russ. Sob.

807. LICHEN DEFORMIS. Simpliciusculus subventricosus, calycibus dentatis. (Sob.) Flor. lapp. t. 11. f. 3.

Habitat in ericetis circa pagum Rjabova et Ofinovaе Roschczae atque Pargelovii. Лишай безобразный. Russ. Sob.

808. LICHEN CORNUTUS. Simpliciusculus subventricosus, calycibus integris. (G.) Hoffm. plant. lichen. II. 1. p. 1. t. 25. f. 1.

Habitat in pinetis ad arborum radices. Лишай рогатый. Russ. Sob.

Fruticulosa Coralloidea

809. LICHEN BANGIFERINUS. Perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. (G.) Variet. a) alpestris. (cinereus.) Flor. dan. t. 180. (Sob.) β) Sylvaticus. (Candicans, ramis capitatis, corniculis rufescentibus. (Sob.) Flor. dan. t. 539.

Habitat in sylvis sterilibus montosis passim, praecipue ad pagum Rjabova, et fabricam pyriam Ochtemem. Лишай олений. Russ. Sob.

810. LICHEN UNCIALIS. Perforatus, ramulis brevissimis acutis. (Sob.) Dillen. musc. t. 16. f. 22.

Habitat in ericetis ficcis ultra pagum Ochtem. Лишай дюймовый. Russ. Sob.

811. LICHEN SUBULATUS. Subdichotomus, ramis simplicibus subulatis. (R.) Dillen. musc. t. 16. f. 26.

Habitat in sylvis et ericetis passim. Лишай шиловатый. Russ. Sob.

812. LICHEN PASCHALIS. Solidus tectus foliis crustaceis. (G.) Flor. dan. t. 251.

Habitat ad fluvium Lugam magna copia, et ad ripam maritimam Strelinae, nec non in montosis Pargelovii, ficcis, terrestribus. Лишай воскресный. Russ. Sob.

813. LICHEN FRAGILIS. Solidus, ramulis teretibus obtusis. (Sob.) Dillen. musc. t. 17. f. 34.

Habitat in sylvis montosis ficcis Ofinove Roschczae ad saxa granitica antiquissima. Лишай ломкий. Russ. Sob.

II. Filamentosi. Ufneae.

814. LICHEN FLORIDUS. Ramosus erectus, scutellis radiatis. (Sob.) Hoffm. pl. lichen. II. 1. t. 30. f. 2. Tenax.

Habitat in sylvis antiquis Ofinovae Roschczae ad arborum truncos. Лишай цветущий. Russ. Sob.

815. LICHEN PLICATUS. Pendulus, ramis implexis, scutellis radiatis. (Sob.) Dillen. musc. t. 1. f. 1. Muscus arboreus, quercinus, officin.

Habitat in Ofinova Roschcza et in monte Dude-rovo, ad truncos arborum annosarum, in locis umbrosissimis. Лишай сплешенный. Russ. Sob.

816. LICHEN BARBATUS. Pendulus subarticulatus, ramis patentibus. Longissimus cinereus. (Sob.) Dillen. musc. t. 12. f. 6. Tenax.

Habitat in sylvis umbrosis antiquis Ofinovae Roschczae, et montis Duderovi atque ad Pagum Rjabova, ad truncos et ramos abietinos, aliosque. Лишай бородастый. Russ. Sob.

817. LICHEN JUBATUS. Pendulus, axillis compressis. (Longissimus, Nigricans.) (G.) Dillen. musc. t. 12. f. 7. Fragilis.

Habitat in sylvis antiquis umbrosissimis ad ramos pini abietis, et ad saxa, Ofinovae Roschczae et montis Duderovi, atque in aliis locis similibus passim. Лишай черногривый. Russ. Sob.

818. LICHEN CHALYBEIFORMIS. Ramosus divaricatus decumbens implicato-flexuosus. (Sob.) Flor. dan. t. 262. Fragilis.

Habitat in sylvis umbrosissimis Ofinovae Roschczae et montis Duderovi ad truncos ramosque arborum, inter lichenes, barbatus aliosque, atque ad saxa. Лишай проволочный. Russ. Sob.

819. LICHEN HIRTUS. Ramosissimus, erectus, tuberculis farinaceis sparsis. (G.) Hoffm. pl. lichen. II. 1. p. 17. t. 30. f. 1. Tenax.

Habitat in vetustis arboribus passim. Лишай шершавый. Russ. Sob.

LEPRA. Wiggers prim. p. 95.

Pulvis subtilissimus, per lentem e glebis varie formatis constans. Wildenow.

820. LEPRO ANTIQUITATIS. Pulyis ater. Byffus antiquitatis. Linn. (Sob.) Dillen. musc. t. 1. f. 18.

Habitat in lignis et lapidibus aëri in fylvis expositis, atque in muris antiquis. Проказа древности. Russ. Sob.

821. LEPRO CINEREA. Pulverulenta cinerea rupes operiens. (Sob.) Byffus faxatilis. Lin. Flor. svec. 2. n. 1179.

Habitat in Saxo omni diutius aëri exposito, quod perenni cinereo colore obducit, ipsa vix manifesta; uti Pargelovii, Peterhovii et ad ripam maritimam Strelinae. Проказа сбряя. Russ. Sob.

822. LEPRO JOLITHUS. Pulverulenta fanguinea faxis innascens, violas olens. (Sob.) Byllus Jolithus. Linn. Flor. dan. t. 899. f. 1.

Habitat in fylvis opacis circa Ofinova Roschcza, urbem Gätzinam ac Peterhoffium supra faxa ante unum alterumve annum eversa et supinata. Проказа фиалкокаменная. Russ. Sob.

823. LEPRO FLAVA. Pulverulenta flava lignis adnascens. (Sob.) Byffus candelaris. Linn. Flor. dan. t. 840. f. 2.

Habitat in corticibus arborum, parietibus antiquis, tectis vento humido expositis, et lignis in fylvis dejectis. Проказа желтая. Russ. Sob.

824. LEPRO INCANA. Pulvis albus, globulis rotundatis. (R. Sob.) Byffus incana. Linn. Dillen. musc. 3. t. 1. f. 3.

Habitat ad latera fossarum circa Petropolim et ad vias publicas passim. Проказа сбряя. Russ. Sob.

825. LEPRA BOTRYOIDES. Pulverulenta viridis. (R. Sob.) Byffus botryoides. Linn. Flor. dan. t. 840. f. 3.

Habitat in terra diutius humida, ut ad lacum Pargelovianum, et in ollis hortulanorum. Прокса зеленая. Russ. Sob.

826. LEPRA LACTEA. Pulvis albus. Wildenow. Byffus lactea, pulverulento crustacea albissima. Linn. (Sob.) Flor. dan. t. 740. f. 4.

Habitat frequens in lignis, muscis et arborum corticibus. Прокса млечная. Russ. Sob.

827. LEPRA RUBENS. Pulvis ruber. Wildenow. (Sob.) Hoffm. enumer. n. 5. Tab. 1. f. 5.

Habitat in corticibus arborum Osinovae Roschczae, et saepe occurrit in lignis diutius aëri humido expositis. Прокса краснющая. Russ. Sob.

ULVA. Gemmae vel Gongyli rotundi in membrana diaphana.

828. ULVA INTESTINALIS. Tubulosa simplex aequalis. (Sob.) Dillen. musc. t. 9. f. 7.

Habitat in ripis maritimis versus Peterhoffium et Oranienbaum. Мшечница кишковатая. Russ. Sob.

CONFERVA. Fibrae simplices, aut ramosae, (continuae vel articulatae,) intra quas gemmae globosae.

829. CONFERVA RIVULARIS. Filamentis simplicissimis longissimis. (G.) Flor. dan. t. 881.

In tamis Nevae fluvii lente fluentibus, circa insulam crucis et lapideam. Нишчанка ручейная. Russ. Sob.

830. CONFERVA FONTINALIS. Filamentis simplicissimis digito brevioribus. (Sob.) Flor. dan. t. 651. f. 3.

Habitat in fonte, e regione septentrionali montis Duderovii; e terra prorumpente et in lacum vicinum fluente. Нишчанка родниковая. Russ. Sob.

831. CONFERVA FLUVIATILIS. Filamentis simplicissimis fetiformibus rectis: geniculis crassioribus angulatis. (Sob. R.) Dillen. musc. t. 77 f. 47. 48.

Habitat in fluvio Neva et Tosna. prope Pellam. Нишчанка речная. Russ. Sob.

832. CONFERVA CAPILLARIS. Fills geniculatis simplicibus: articulis alternatim compressis. (Sob. R.) Dillen. musc. t. 5. f. 25.

Habitat in lacubus Obnovae Roschezae, in paludibus, et fossis aquosis passim. Нишчанка володная. Russ. Sob.

833. CONFERVA BULBOSA. Filamentis aequalibus ramosis, bullas aëreas includentibus. (R. Sob) Dillen. musc. t. 3. f. 11.

Habitat in insulae lapideae, et Strefinae aquis stagnantibus et passim. Нишчанка пузырочная. Russ. Sob.

834. CONFERVA CANALICULARIS. Filamentis aequalibus basin versus ramosioribus. (Sob. R.) Dillen. musc. t. 4. f. 15.

Habitat in canalibus molendinariis, et rivulis
Strelinae et Peterhoffii. Нишчанка канальная.
Russ. Sob.

835. CONFERVA RETICULATA. Filamentis re-
ticulato-coadunatis. (Sob. R.) Dillen, musc.
t. 4. f. 14.

Habitat ad littora fluvii Nevae, prope portum
triremium insulae basileensis, et passim. Ниш-
чанка сбывающая. Russ. Sob.

836. CONFERVA DICHOTOMA. Filamentis
aequalibus dichotomis. (Sob. R.) Dillen, musc.
t. 3. f. 9.

Habitat in stagnis et fossis circa Caterinahof-
fium, et passim. Нишчанка развилистая.
Russ. Sob.

837. CONFERVA GELATINOSA. Foliis ramosis
moniformibus: articulis globosis gelatinosis.
(Sob.) Dillen musc. 36. t. 7. f. 42.

Habitat in fontibus ad vicum Hostilitza et in
Sarskoje selo ac Peterhoffii. Нишчанка студе-
нистая. Russ. Sob.

838. CONFERVA GLOMERATA. Filamentis ge-
nigulatis, ramulis brevioribus multifidis. (Sob.)
(Flor.) dan. t. 951. f. 2.

Habitat in rivulis circa pagum Ribaczja, et in
ramis fluvii Nevae. Нишчанка сборная. Russ.
Sob.

BYSSUS. Fibrae simplices uniformes lanuginosae.

839. BYSSUS SEPTICA. Capillacea mollissima
parallela fragilissima pallida. (R. Sob.)

Habitat in domibus sub pavimentis, et in sylvis umbrosissimis ad ligna pútrida; corrodit truncos durissimos. Жилочница гноющая. Russ. Sob.

840. BYSSUS FLOS AQUAE. Filamentis plumosis natantibus. (Farinacea virescens, ramosa.) (R. Sob.) *B* Dillen. musc. t. 1. f. 1.

Habitat in aquis stagnantibus; Prima aestate; nocte descendit parum, die natat fere. Жилочница водоцвѣтная.

841. BYSSUS PHOSPHOREA. Lanuginosa violacea lignis ednaescens. (Sob.) Dillen. musc. t. 1. f. 6.

Habitat in lignis et truncis arborum putrescentibus, in sylvis humidis circa fabricam pyriam Ochtersen, et passim. Мышій огонь. Russ. Жилочница свѣтоносная. Sob.

842. BYSSUS VELUTINA. Capillacea viridis, filamentis ramosis. (Sob.) Dillen. musc. t. 1. f. 14.

Habitat in terra et corticibus Betulae albae antiquis dejectis. Жилочница зеленобархашная. Russ. Sob.

843. BYSSUS FULVA. Filamentis ramosis Fulvis (Sob.) Dillen. musc. t. 1. f. 17.

Habitat in sylvis Osinováe Roschcze et passim, ad ligna putrida. Жилочница свѣшпооранжевая. Russ. Sob.

844. BYSSUS CANDIDA. Filamentis ramosissimis: ramis fastigiatis albidis. (Sob.) Dillen. musc. t. 1. f. 15.

Habitat in sylvis Ofinovae Roschczae inter folia dejecta putrescentia, autumnò: Жилочница бѣлая. Russ. Sob.

AGARICUS. Fungus horizontalis: pileo subtus lamelloso.

I.

Stipitatis. Stipite volva et annulo cincto.

845. **AGARICUS MUSCARIUS.** Pileo fanguineo, verrucis, lamellis stipiteque albis: hoc basi globofo, (G.) Schaeff. fung. t. 28.

Habitat in pratis ficcioribus et sylvis arenosis passim. Julio, Augusto. Грибъ мухоморъ. Russ. Мухоморъ красный. Sob.

846. **AGARICUS MARGARITACEUS.** Pileo pallescente verrucis carnis tuberculisque albidis aspero, lamellis albis. (Sob.) Bulliard. herb. Franc. t. 316.

In pratis sylvosis rarius occurrit. Aestate. Мухоморъ желто-бѣдный. Russ. Sob.

847. **AGARICUS MACULATUS.** Pileo badio lividove: margine verrucis albis inaequali, lamellis albidis brevibus latis, (Sob.) Schaeff. fung. t. 90.

Habitat in sylvis ficcioribus Pargelovii et Ofinovae Roschczae. Aestate. Мухоморъ темносѣрый. Russ. Sob.

848. **AGARICUS MAPPA.** Pileo convexo ex flavescenti cinerascete, lamellis alternatim longioribus stipiteque flavescetibus. (Sob.) Schaeff. fung. t. 20.

Habitat in montanis sylvosis, aestate, et autumnno.
 Мухоморъ сѣрожелтый. Russ. Sob.

849. AGARICUS PRAEALTUS. Pileo hemisphaerico, junioris tomentoso, stipite quadruplo longiore gracili cinereo, lamellis ferreis. (Sob.)
 Michel. nov. pl. gen. p. 189. t. 81. f. 3.

Habitat in sylvis circa Rjabovam. Septembri.
 Лѣснякъ. Russ. Sob.

850. AGARICUS BULBOSUS. Pileo glaberrimo integerrimo carneoniveo, stipite lineari concolore: basi semiovata supra truncata, lamellis pallidissime flaventibus stipiti contiguis. (Sob.)
 Schaeff. fung. t. 241.

Habitat in pratis sylvosis. Autumnno. Поганка лѣсная блѣдная. Russ. Sob.

851. AGARICUS EXCORIATUS. Pileo convexo ex lateritio dilute cinereo: disco tela dilute carnea tecto, lamellis inaequalibus, stipiteque fistuloso basi bulboso albidis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 18.

In simetis hortorum et vaporariis rarius occurrit. autumnno. Поганка навозная рыжая. Russ. Sob.

Stipite annulato: volva nulla.

852. AGARICUS CAMPESTRIS. Pileo convexo canescente; maculis piloso-squamosis, lamellis inaequalibus introrsum (adulti) rufescentibus, stipite albido recto. (G.) Bulliard herb. Franc. t. 134.

Habitat in arvis; et agris atque in hortis oleraceis, frequens. Iulio. Esculentus. Печерица, five Шампиньонъ. Russ. Печерица полевая. Sob.

853. AGARICUS PRATENSIS. Pileo convexo albedo vel ex thalaffino dilute cinereo striato, lamellis fordide carneis, stipite crasso albedo: basi inflexa fuscescente. (Sob.) Schaeff. fung. t. 96.

Habitat in pratis ficcis passim. Iulio, Augusto. Esculentus. Печерица луговая. Russ. Sob.

854. AGARICUS FLOCCOSUS. Pileo convexo piloso-squamoso, lamellis flavicantibus, stipite farcto annuloque squamosis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 91.

Habitat in sylvis gregatim. Iunio, Iulio. Oneнокъ охлопчатый. Russ. Sob.

855. AGARICUS MUTABILIS. Pileo glabro fusco-ochraceo, lamellis dilute fuscis, stipite pallidiori lineari superne squarroso; inferne laevi albo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 9.

Habitat gregatim ad radices arborum, Coryli aliorumque. Esculentus. Подоръшникъ. Russ. Sobol.

3.

Stipite annulo volvaque destituo.

856. AGARICUS VIRGINEUS. Niveus, lamellis arcuatim per stipitem cylindricum farctum decurrentibus. (Sob.) Schaeff. fung. t. 39.

Habitat in sylvis, autumnis, Esculentus. Молочникъ. Russ. Sobol.

857. AGARICUS INTEGR. Solitarius, pileo viscido purpureo, lamellis albis integris aequalibus. (G.) Krapf. Oesterr. Schw. 1. t. 1. f. 1. 7. et t. 2. f. 4. 6. (Variat pileo rubro. et albicante purpureo. Sob.)

Habitat in sylvis et pratis sylvosis. Julio, Augusto et Septembri. Esculentus. Сыро́жка красная. Russ. Vaeriet. В Сыро́жка б́лая. Russ. Sobol.

858. AGARICUS EMETICUS. Acris graveolens solitarius, pileo fanguineo, lamellis aequalibus crassis fragilibus apice bifurcis stipiti-farcto tereti intus albo continuis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 15. 16.

In pratis sylvaticis ficcioribus frequens est. Julio, Augusto et Septembri. Esculentus. Волю́й five волюе́к. Russ.

859. AGARICUS CYANOXANTHUS. Pileo pallido vel subrubello: margine caerulescente, lamellis aequalibus albidis crassis, stipite farcto brevi terete. (Sob.) Krapf. Oesterr. Schw. t. 6. f. 1. 6.

Habitat in sylvis antiquis circa pagum Rjabova, et Osinovae Koschcaezae. Пушникъ васильковый five синякъ. Russ. Sob.

860. AGARICUS VIRESCENS. Pileo vario luridove viscido, lamellis albidis aequalibus, stipite tereti farcto. (Sob.) Krapf. Oesterr. Schw. t. 9. f. 6. 7.

Habitat in declivibus sylvarum graminosarum. Septembri, Octobri. Зеленчакъ. Russ. Sob.

861. AGARICUS GLUTINOSUS. Pileo viscido nitente ochroleuco exsiccatione nigrescente, lamellis concoloribus crassis ramosis aequalibus, stipite tereti farcto incurvo basi incrassato. (Sob.) Krapf. Oesterr. Schw. t. II. f. 1. 7.

Habitat in sylvis humidis circa Ochtram. Septembri. Поганка клейкая. Russ. Sob.

862. AGARICUS VIOLACEUS. Pileo convexo aspero punctato: margine violaceo, lamellis dilute badiis margine purpurascensibus, stipite caerulefcente crasso basi bulbosó. (G.) Kern. Schw. t. I. f. 1.

Habitat ad margines humidos sylvarum. Augusto, Septembri. Esculectus. Голубецъ. Russ. Sob.

863. AGARICUS CROCEUS. Luteus, stipitis parte inferiori pileo que conico villosis, lamellis numerosis densis stipitisque parte superiori albis. (Sob.) Bolton fung. 2. t. 51. f. 2.

Habitat gregatim ad truncos et radices arborum. Septembri, Octobri. Опенка шафранная. Russ. Sobol.

864. AGARICUS GEORGII. Pileo flavo convexo: lamellis albis. (Sob.) Sterb. fung. t. II. f. 3.

Habitat in sylvis ficcioribus elatioribus. Iulio, Augusto. Esculentus. Сыроѣжка желтая. Russ. Sobol.

865. AGARICUS CLYPEATUS. Pileo hemisphaerico acuminato viscido, lamellis stipiteque elongato cylindrico albis. (Sob.)

Habitat gregatim in sylvis umbrosis ad radices arborum. Ольшанка five опенка ольховая. Russ. Sob.

866. AGARICUS FRAGILIS. Pileo convexo viscido pellucido lamellisq̄ luteis. (Sob.) Vaillant. fl. paris. t. 11. f. 16. 18.

Habitat in sylvis et ad vias. Iulio. Опенокъ мелкій, прухлый. Russ. Sob.

867. AGARICUS STRIATUS. Pileo castaneo: margine dilutius striato, stipite tereti crasso brevi farcto albido. (Sob.) Schaeff. fung. t. 38.

Habitat in sylvis gregatim ad truncos arborum putridos. Augusto, Septembri. Опенка спруйчатая. Russ. Sob.

868. AGARICUS ADHAERENS. Pileo atro glutinoso, lamellis fordidis ramosis subdecurrentibus, stipite farcto tereti albido. (Sob.) Schaeff. fung. t. 36.

Habitat in pratis elatioribus sylvosis Osinovae Roschczae, ad radices arborum. Septembri, Octobri. Пушникъ осиновый. Russ. Sob.

869. AGARICUS FASTIGIATUS. Pileo conico umbonato luteo longitudinaliter striato, lamellis fuscescentibus, stipite tereti farcto elongato lineari flavescente. (Sob.) Schaeff. fung. t. 26.

Habitat in sylvis ad radices arborum gregatim, Septembri, Octobri. Опенковой колпачокъ. Russ. Sob.

870. AGARIGUS CINNAMOMEUS. Tenax pileo ficco laevi rufo, lamellis teneris coriaceis dilute cinnamomeis triplici ordine dispositis, stipite luteo inferne angustato compresso fibroso. (Sob.) Schaeff. fung. t. 4.

- Habitat in fylvis humidiufculis inter mufcos.
- Septembri. Опенка коричневая. Russ. Sob.

871. AGARICUS NIVOSUS. Niveus, pileo parvo convexo: margine ftipiteque craffo elongato folido furfuraceo-pruinofis, lamellis anguftis confertis ftipiti continuis: brevioribus intermiftis. (Sob.) Batfch el. fung. cent. 49. f. 64.

Habitat ad radices arborum in fylvis humidis circa Ochtam et Rjabovam et paffim. Septembri. Efculentus. Пабснякб. Russ. Sob.

872. AGARICUS CRASSIPES. Pileo fufco ficco convexo: margine involuto, ftipite concolore fufiformi, lamellis dilute fufcis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 87.

Habitat in fylvis ad truncos arborum putridos gregatim. Octobri. Верешенникб. Russ. Sob.

873. AGARICUS FLAVIDUS. Pileo ochroleuco, lamellis albidis, ftipite tereti flexuofa inferne craffiori fufcefcente, superne flavefcente. (Sob.) Schaeff. fung. t. 35.

Habitat gregatim in fylvis infulae apothecariae et circa Ochtam ad radices arborum. Septembri. Опенковая желпушка. Russ. Sob.

874. AGARICUS FASCICULARIS. Pileo luteo, lamellis cinereis margine flavicantibus, ftipite flavo lineari elongato. (Sob.) Schaeff. fung. t. 49.

Habitat in fylvis umbrofis ad truncos et radices arborum gregatim. Augufto, Septembri. Efculentus. Опенка березовая. Russ. Sob.

875. AGARICUS TESTACEUS. Pileo albido: margine pallidiffime ochraceo, centro lutescente,

lamellis albis, stipite elongato basi adscendente pallide ochraceo. (Sob.) Planer fung. Erf. p. 14. n. 49.

Habitat in pratis sylvosis gregatim. Septembri. Esculentus. Солянка песчрая. Russ. Sob.

4.

Pileo infundibuliformi vel obliquo.

876. AGARICUS INFUNDIBULIFORMIS. Siccus albus senio subinctus, pileo maximo umbonato, lamellis inaequalibus ramosis, stipite laevi. (Sob.) Buxb. cent. 4. t. 1.

Habitat in pratis arenoso-argillofis sylvosis Ofinovae Roschczae et montis Duderovii. Augusto, Septembri. Esculentus. Грибная воронка. Russ. Sobol.

877. AGARICUS DEGENER. Pileo carneo-fulvescente circulis concentricis saturatoribus picto: margine lacero, stipite concolore lineari elongato sursum ampliato, lamellis pallide carneo-ochraceis decurrentibus. (Sob.) Schaeff. fung. t. 243.

Habitat in sylvis Ofinovae Roschczae in cavitatibus et truncis arborum. Septembri, Octobri. Esculentus. Дуплянка рыжая. Russ. Sob.

878. AGARICUS FLABELLATUS. Pileo difformi fusco vel lurido vario. Lamellis subrepandis stipiteque brevi cylindrico fordide albis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 43. 44.

Habitat in sylvis ad truncos arborum putridos. Septembri. Esculentus. Лисочка шемная. Russ. Sobol.

5.

Pileo dimidiato, stipite laterali.

879. AGARICUS AGGREGATUS. Gregarius, pileo fusco: margine lobato crispo, lamellis rufescentibus ramosis subdecurrentibus, stipite crasso curvo farcto fuscescenti-albo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 233.

Habitat in cavitatibus arborum vivarum Ofinovae Roschczae. Septembri, Octobri. Лисочка сборная. Russ. Sob.

880. AGARICUS CONCHATUS. Pallide cinnamomeus, pileo conchiformi, lamellis inaequalibus longioribus decurrentibus, stipite arcuato farcto. (Sob.) Bulliard. herb. Franc. t. 298.

Habitat in truncis vivis et cavitatibus arborum Ofinovae Roschczae. Octobri. Esculentus. Пакушникъ. Russ. Sob.

881. AGARICUS GLAUCUS. Canus, pileo fericeo tenello, lamellis distantibus alterne brevioribus, stipite albidiore brevi pruinato. (Sob.) Batsch. el. fung. cent. vro. f. 123.

Habitat in fylvis umbrosis circa Rjabovam. Septembri. Esculentus. Сизякъ. Russ. Sob.

882. AGARICUS OBESUS. Crassus ochroleucus, pileo pulvinate inaequali, stipite brevi rufescente. (Sob.) Batsch. el. fung. cent. 2. p. 89. t. 39. f. 216.

Habitat in fylvis et hortis ad radices Betulae albae. Septembri, Octobri. Esculentus. Свинушка жоренная. Russ. Sob.

6.

Sauciati fuccum fundentes, lactiflui.

883. AGARICUS DELICIOSUS. Pileo luteo-fufcescente: vertice depresso, ftipite tereti maculato, lamellis luteis fucco luteo refertis inaequalibus: longioribus decurrentibus. (G.) Kern. Schwaemm. t. 6. f. 1.

Habitat in monticulis fylvofis arenofis passim. Augusto, Septembri. Esculentus. Рыжикъ, Russ. Рыжикъ ранній желшый. Sob.

884. AGARICUS TORMINOSUS. Pileo lutefcente: vertice depresso, margine piloso striato, lamellis inaequalibus luteis fucco luteo refertis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 12.

Habitat in pratis et fylvis arenofis. Septembri, Octobri, Esculentus. Волнушка красная позняя. Russ. Sob. (Var. β pileo lamellis que albicantibus.) Волнушка бѣлая ранняя. Russ. Sob.

885. AGARICUS ZONARIUS. Pileo spadiceo concentrice striato: vertice depresso, lamellis albidis, ftipite fufcescenti-albido brevi farcto tereti. (Sob.) Schaeff. fung. t. 235.

Habitat in pratis fylvofis ubique. Augusto, Septembri. Esculentus. Дубянка красная. Russ. Sob.

886. AGARICUS DULCIS. Sordide ruber intus albus, fuccum album dulcem fundens, pileo (adulti) infundibuliformi, lamellis numerosis subdecurrentibus. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 224.

Habitat in fylvis arenofis umbrofis passim. Augusto, Septembri. Бѣлянка, Russ. Sob.

887. **AGARICUS RUFUS.** Pileo aurantio: vertice adulti umbilicato, lamellis tenuibus angustis fragilibus fuscescentibus succum luteum fundentibus: secundi tertiique ordinis inaequalibus, stipite farcto fragili. (Sob.) Bolton fung. 9. t. 9.

Habitat in pascuis sylvis montosis. Augusto, Septembri et Octobri. Esculentus. Рыжикъ красный поздній. Russ. Sob.

888. **AGARICUS SCROBICULATUS.** Succum lacteum demum sulphureum fundens, pileo luteo piloso convexo: vertice depresso, lamellis pallidioribus ramosis, stipite tereti crasso brevi. (Sob.) Schaeff. fung. t. 227.

Habitat in pratis sylvis elatioribus. Augusto, Septembri, et Octobri. Esculentus. Подгруздь. Russ.

889. **AGARICUS ACERRIMUS.** Inodorus aut graevolens acris succum aterrimum fundens, pileo fuscescente firmo, lamellis fragilibus flavicantibus carneisve, stipite farcto tereti spongioso. (Sob.) Krapf. Oesterr. Schw. 2. t. 3. f. 5.

Habitat in sylvis ad radices arborum. Septembri, Octobri. Esculentus. Грибная скрипица. Russ.

890. **AGARICUS CIMICARIUS.** Ferrugineo-fulvus, pileo opaco humescente infundibuliformi, lamellis triplicis longitudinis per regulas saepe connexis, stipite teretiusculo fistuloso. (Sob.) Batsch el. fung. cent. 59. f. 60.

Habitat in sylvis circa fabricam pyriam Ochtensem et passim. Augusto, Septembri. Esculentus. Дуплянка немножешая, Russ. Sob.

891. AGARICUS OPACUS. Succum acrem album fundens, pileo rigido humefcente viscofo, fufcescente-cinereo: vertice excavato obfolete concentrice fasciato, lamellis latis triplicis longitudinis utrinque angustioribus ochaceo-carneis, ftipite albido. (Sob.) Batfch el. fung. cent. 57. f. 68.

Habitat in pratis fylvofis et ad vias paffim. Augusto, Septembri. Esculentus. Свинушка five дуплянка темная. Russ. Sob.

892. AGARICUS PIPERATUS. Albus succum acrem fundens, pileo laevi fragili: vertice (fenefcentis) excavato, margine deflexo, lamellis inaequalibus, irregularibus anguftis, ftipite farcto utrinque anguftato. (G.) Bolton fung. 21. t. Schaeff. fung. t. 83.

Habitat in fylvis pascuis ubique. Augusto. Septembri. Esculentus. Грудь. Russ.

893. AGARICUS AMARUS. Succum acrem fundens, pileo ochroleuco: vertice (adulti) excavato, margine undulato, ftipite concolore craffo tereti farcto, lamellis ramofis flavicantibus. (Sob.) Kern. Schw. t. 9. f. 1.

Habitat in fylvis montofis circa fabricam pyriam Ochtenfem et paffim. Augusto, Septembri. Esculentus. Горькуша. Russ.

7.

Laeves membranacei, vix carnofi. Coriacei, pileo lamellisq. coriaceis.

894. AGARICUS MELLEUS. Pileo convexo pallide sulphureo ferrugineoque: margine pallide

friato, lamellis albidis, stipite elongato tereti sublineari fistuloso cereo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 45.

Habitat in sylvis ad truncos arborum. Septembri. Опенка осиновая. Russ. Sob.

895. AGARICUS CEREOLUS. Pileo campanulato pallide sulphureo: margine ochraceo - ferrugineo, lamellis cinereo - fuscis, stipite elongato niveo farcto. (Sob.) Schaeff. fung. t. 51.

Habitat in sylvis ad radices arborum putridas. Autumno. Опенка мелкая рыжая. Russ. Sob.

896. AGARICUS FUSCESCENS. Pileo convexo fusco, lamellis fusco - fulventibus, stipite lineari subelongato pallido fistuloso. (Sob.) Scheff. fung. t. 60.

Habitat in sylvis humidis. Iulio, Augusto. Опенкашешная. Russ. Sob.

897. AGARICUS JANTHINUS. Violeceo-rubens, pileo subconvexo, lamellis distantibus convexis decurrentibus, stipite elongato lineari. (Sob.) Schaeff. fung. t. 13. f. 2. 4. 5. 8.

Habitat in montosis sylvaticis Pargelovii et passim. Iulio, Augusto. Опенка синевашая. Russ. Sob.

898. AGARICUS MAMMOSUS. Suaveolens dilute fuscus, pileo difformi, lamellis latiusculis divisis a stipite lineari farcto spirali distantibus. (G.) Bulliard herb. Franc. t. 144.

In sylvis arenosis. Augusto, Septembri. Опенка сосновая. Russ. Sob.

899. AGARICUS ALLIATUS. Allium redolens sapiensque canus, pilei margine undulato striato, lamellis divisis stipiti contiguais. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 153.

Habitat in pratis et fylvis ficcis umbrosis arenosis. Iulio, Augusto. et Septembri. Опенокъ чесночный. Russ. Sob.

900. AGARICUS ALLIACEUS. Allium sapiens reddensque, pileo convexo glabro e fusco pallescente, lamellis albidis, stipite atro nitido fistuloso. (Sob.) Jacq. flor. austr. 1. t. 82.

Habitat in pratis ficcioribus et fylvis, in insula apothecaria, lapidea, et passim. Iulio., Augusto, Septembri. Чесночникъ черностебельный. Russ. Sob.

901 AGARICUS ABIETIS. Pileo glaberrimo subviscido depresso - convexo, lamellis albidis, stipite lineari elongato fulvo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 99. f. 1. 3. 4.

Habitat gregatim in fylvis circa montem Poconaja et passim. Опенокъ еловый. Russ. Sob.

902. AGARICUS CLAVUS. Pileo planiusculo umbonato luteo: margine striato plicatove, lamellis sordide albis, stipite lineari tereti farcto, inferne torto. (Sob.) Schaeff. fung. t. 59.

Habitat gregatim in fylvis ad ligna putrida. Iulio, Augusto. Опенокъ желшоголовый. Russ. Sob.

903. AGARICUS FUMUS. Pileo conico subovato acuminato fusco vel flavente; lamellis rubris: stipite lineari elongato pallidiori. (Sob.) Schaeff. fung. t. 63. 70. 229.

Habitat gregatim in pratis et fylvis humidis.
 Augusto. Опенокъ дымчашый. Russ. Sob.

8.

Tenelli, pileo lamellisve et stipite pellucidis,
 ut plurimum concoloribus; illo striato plicato.

904. AGARICUS SULPHURATUS. Pileo lutescente-cano convexo plicis latis inaequali, lamellis albidis duplicis ordinis, stipite lineari elongato fistuloso sulphureo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 31.

Habitat in fylvis ad ligna putrida gregatim. Augusto. Гнилушка желтоногая. Russ. Sob.

905. AGARICUS ADUSTUS. Fuscus, pileo convexo-conico late plicato extrorsum pallide griseo, stipite lineari elongato fistuloso. (Sob.) Schaeff. fung. t. 32.

Habitat in fylvis ad truncos arborum et ligna putrida. Julio, Augusto. Гнилушка полосашая. Russ. Sob.

906. AGARICUS ANDROSACEUS. Pileo conico pellucido striato crenato lamellisque albidis, stipite gracili obscuro. (Sob.) Schaeff. fung. t. 339.

Habitat in fylvis inter folia decidua putrida et furculos. Septembri, Octobri. Гнилушка прозрачная. Russ. Sob.

907. AGARICUS UMBELLIFERUS. Minutus albus pellucidus, pileo hemisphaerico: margine plicato, lamellis distantibus, stipite filiformi. (G.) Bolton. fung. 39. t. 39. f. A.

In sylvis et locis humidis umbrosis foliis aut ramulis dejectis putridis adhaeret. Augusto, Septembri. Гнилушка поненькая. Russ. Sob.

908. AGARICUS CANDIDUS. Minutus albus, pileo hemisphaerico margine involuto, lamellis flexilibus, stipite tereti flexuoso. (Sob.) Bolton. fung. t. 39. f. D.

Habitat ad margines sylvarum et sepes hortorum. gregatim. Iulio, Augusto. Гнилушка крапивная. Russ. Sob.

909. AGARICUS RADIATUS. Pileo cinereo radiato plicato stipiteque filiformi pellucidis. (Sob.) Bolton. fung. 39. t. 39. f. C.

Habitat in sylvis et ad vias gregatim. augusto, Septembri. Гнилушка струйчатая. Russ. Sob.

910. AGARICUS CONICUS. Pileo campanulato acuto nitido livido striato, lamellis albis, stipite fistuloso cinereo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 52. f. 1. 6.

Habitat in sylvis umbrosis ad ligna putrida. Autumno. Гнилушка колокольчатая. Russ. Sob.

9.

Partim in liquorem nigrum diffuentes aut lamellis nigris instructi.

911. AGARICUS FASCICULATUS. Fufcescendo diffluens, pileo convexo laevi luteo, lamellis numerosis angustis olivaceis, stipite flexuoso fistuloso flavo. (Sob.) Bolton. fung. 29.

Crescit in agris stercoretis, gregatim. Iulio, Augusto, et Septembri. Поганка навозная желтая. Russ. Sob.

912. **AGARICUS SORDIDULUS.** Pileo squamoso fordide luteo, lamellis terreis nigro pulverulentis, demum atris, stipite gracili elongato fistuloso fuscescente. (Sob.) Schaeff. fung. t. 210.

Crescit ad margines viarum sylvaticarum et in fimetis hortorum. Iulio, Augusto et Septembri. Поганка рыжая, навозная. Russ. Sob.

10.

Fuliginosi, pileo opaco conico, lamellis fenescendo fuliginosis tandem in saniam nigram disfluentibus, stipite fistuloso.

913. **AGARICUS AQUEUS.** Pileo glabro lacero cano-fuscescente leviter striato plicatoque, lamellis nigro-fuscis, stipite subelongato albo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 17.

Crescit in fimo hortorum diu in aere reposito, et in agris stercoreatis. Iulio, Augusto. Поганка five навозный колпачокъ. Russ. Sob.

914. **AGARICUS CINEREUS.** Pileo canescente umbonato confertissime striato, lamellis connatis, stipite elongato fuscescente albo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 100.

Habitat in fimetis passim. Iunio, Iulio, Augusto. Поганка сѣрая, five Конскій грибъ. Russ. Sob.

915. **AGARICUS OVATUS.** Pileo squamato striato cano, stipite annulato elongato albo terete deorsum crassiori: volva ovata squamosa. (Sob.) Schaeff. fung. t. 7. Поганка, five Навозное яйцо. Russ. Sob.

916. **AGARICUS VAILLANTII.** Gregarius, pileo striato cinereo ovato tandem spadiceo campanulato, lamellis latiusculis ferrulatis, stipite lineari tereti albo. (Sob.) Vaillant. flor. parif. t. 12. f. 10. 11.

Habitat in fimetis circa pagos et in hortis oleraceis. Iunio, Iulio. Поганка спруисшая. Russ. Sob.

917. **AGARICUS PORCELLANEUS.** Pileo aquose albo striis longitudinalibus purpurascens squamisque lutescentibus vario fusiformi demum campanulato, lamellis utrinque acuminatis, stipite flexuoso. (Sob.) Schaeff. fung. t. 47. 48.

Habitat in stercoratis circa pagos et in fimetis hortorum. Iulio, Augusto. Поганка. five Навозный коровяк. Russ. Sob.

918. **AGARICUS STERCORARIUS.** Pileo convexo diaphano cinerascens nigro: margine lacero revoluto, lamellis canis, stipite subobliquo angusto inferne in crassato. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 68.

Habitat in fimetis passim. Iulio, Augusto. Поганка навозная черная. Russ. Sob.

919. **AGARICUS DIGITALIS.** Pileo femiovato crenulato livido-canescens extorsum confertissime striato: vertice glabro ferrugineo, lamellis triplicis longitudinis atris, stipite ascendente elongato palidissimo. (Sob.) Batfch. el. fung. 61. f. 1.

Habitat circa pagos in fimetis passim. Iulio, Augusto. Поганка долгохвостая. Russ. Sob.

II.

Acaules.

920. AGARICUS PERENNIS. Subcaulis suberofocoriaceus, pallide ochraceus, lamellis pallidioribus. (Sob.) Plan. fung. Erf. p. 8. n. 25.

Habitat in fylvis ad truncos arborum putridos, Ofinovae Roschczae et passim. Augusto, Septembri, Octobri. Дереванка гребенчатая. Russ. Sob.

921. AGARICUS CAESPITOSUS. Spatulatus convexus luteus glabriusculus, lamellis terreis. (Sob.) Michel. nov. pl. gen. p. 123. t. 65. f. 5. 6.

Habitat in fylvis ad truncos vivos arborum Alni. Autumno. Наростень пенювый. Russ. Sob.

922. AGARICUS GELATINOSUS. Pileo difformi albido sublanato, lamellis ochroleucis simplicibus inaequalibus. (Sob.) Schaeff. fung. t. 213.

Habitat in fylvis umbrosissimis Ofinovae Roschczae ad stipites arborum recenter ceduis, rarius. Septembri, Octobri. Студенець наростный. Russ. Sob.

MERULIUS. Fungus Subtus venosus.

923. MERULIUS CORNUCOPIOIDES. Stipitatus: fuscus tenax, pileo lobato, venis subquadruplici ordine decurrentibus. (Sob.) Bolton fung. 8. t. 8.

Habitat in pratis montosis sylvaticis circa fabricam pyriam Ochtensem, et Murinam. Esculentus. Сухарь, five Чернушка. Russ. Sob.

924. **MERULIUS CYATHUS.** Stipitatus, coloris lignei, pileo infundibuliformi, venis decurrentibus, stipite tereti fistuloso. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 208.

Habitat in alnetis umbrosis montosis Ofinovae Roschczae. Esculentus. Лисочка сѣрая. Russ. Sobol.

925. **MERULIUS CANTHARELLUS.** Stipitatus: vitellinus suaveolens, pileo (senescentis) excavato: margine undulato lobato, venis subcrispis decurrentibus, stipite tereti farcto sursum dilatato. (Sob.) Agaricus Cantharellus. Linn. (G.) Schaeff. fung. t. 82.

Habitat in pratis elevatis sylvaticis Pargelovii et passim. Esculentus. Лисочка желтая. Russ. Sobol.

926. **MERULIUS ALNEUS.** Acaulis, coriaceus albidus cano tomentosus, semiorbicularis, margine repando, venis ramosis. (Sob.) Agaricus alneus. Linn. (G.) Bulliard herb. Franc. t. 346.

Imbricatim adnascitur Betulis et Populis tremulis. Трушковица. Russ. Трушковица ольховая. Sobol.

927. **MERULIUS RETICULATUS.** Acaulis, verticulis subrotundis membranaceus laevis canus, venis reticulatis cinerascens. (Sob.) Bulliard herb. Franc. 1. p. 289. t. 498. f. 1.

Habitat ad truncos arborum in Ofinova Roschczae. Трушковица сѣпчашая. Russ. Sob.

928. **MERULIUS DIMIDIATUS.** Acaulis, membranaceus horizontalis laevis fuscescens. (Sob.) Bulliard herb. Franc. 290. t. 498. f. 2.

Habitat in truncis arborum, Ofinovae Roschczae et in monte Duderovo. Трушовица половинчатая. Russ. Sob.

929. **MERULIUS BETULINUS.** Acaulis, coriaceus villosus suborbicularis margine obtuso, venis confertis anastomosantibus ochroleucis flavisve. (Sob.) Agaricus betulinus. Linn. Bulliard herb. Franc. t. 290.

Habitat in fylvis ad truncos Betulae albae. Трушовица березовая. Russ. Sob.

930 **MERULIUS QUERCINUS.** Acaulis, suberoso-coriaceus planus villosus semiorbicularis annulis diversi coloris pictus, venis confertis cartilagineis anastomosantibus albidis vel fuscescentibus. (Sob.) Agaricus quercinus. Linn. (G.) Schaeff. fung. t. 57.

Habitat in truncis arborum circa Sarsoje Selo et passim. Трушовица дубовая. Russ. Sob.

BOLETUS. Fungus horizontalis, subtus porosus.

* Stipitati.

931. **BOLETUS PERENNIS.** Perennis, pileo utrinque planiusculo peltato fusco, poris punctiformibus, Ochraceo albis, stipite laevi. (Sob.) Bulliard. herb. Franc. 1. p. 334. t. 28. et t. 449. f. 2.

Habitat in fylvis ficcis arenosis inter Pinos fylvestres et Abietes Pargelovii et passim Autumnno. 2 Грибок сухлянка. Russ. Sob.

932. **BOLETUS NUMMULARIUS.** Perennis, pileo albo: centro concavo papillato, margine de-

flexo, stipite basi nigro. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 124.

Habitat in fylvis montosis Pargelovii et Ofinovae Roschczae, et passim Autumno. 2 Сухлянка бѣлоголовая. Russ. Sob.

933. BOLETUS LEPTOCEPHALUS. Pileo plano tenui supra cervino subtus albo. (Sob.) Iacq. misc. austr. 1. p. 142. t. 12.

Habitat ad radices arborum in fylvis umbrosis montosis Pargelovii et passim Autumno. Esculentus. Полусухлянка тоненькая. Russ. Sob.

934. BOLETUS VISCIDUS. Pileo pulvinateo viscido, poris teretibus convexis immerfis distinctis, stipite lacero. (Sob.) Schaeff. fung. t. 103. 104.

Habitat in pratis fylvosis. Iulio, Augusto. Esculentus. Грибъ березовикъ. Russ. Sob.

935. BOLETUS LUTEUS. Pileo pulvinateo viscido, poris rotundatis convexis flavissimis, stipite annulato. (G.) Schaeff. fung. t. 114. 115.

Habitat in fylvis umbrosis, muscosis. Iulio, Augusto. Esculentus. Масленникъ. Russ. Sob.

936. BOLETUS BOVINUS. Pileo pulvinateo glabro marginato, poris acutis compositis: porulis angulatis brevioribus. (G.) Bulliard herb. Franc. 1 p. 322. t. 60. 494.

Habitat in pratis fylvosis subhumidis inter muscos. Iulio, Augusto et Septembri. Esculentus. Моховикъ. Russ. Sob.

937. BOLETUS MUTABILIS. Pileo pulvinateo fusco, tubis flavescensibus rubifve (Senescentis,

in juvene albidis,) stipite incrassato brevi fuscifcente rubellove. (Stipite albo infra bulboso five tuberoso reticula oblonga rubra striato. farcto solido.) (Sob.) Schaeff. fung. t. 108. 133.

Habitat in Pinetis montosis umbrosis ficcioribus. Augusto, Septembri. Esculentus, optimus. Боровикъ, five бѣлый грибокъ. Russ. Sob.

938. BOLETUS FERRUGINEUS. Pileo pulvinate ochraceo-fusco glabro poris ferrugineo-brunneis, stipite subferrugineo. (Sob.) Bulliard herb. Franc. 1. p. 318. t. 451. f. 2.

Habitat in pratis et sylvis humidis muscosis gregatim. Augusto, Septembri. Esculentus. Козлякъ, five козлякъ. Russ. Sob.

939. BOLETUS TUBEROSUS. Pileo pulvinate stramineo, poris flavis, stipite brevi basi tuberoso. (Pileo, in umbrosis, pallido, in apricis, ochraceo-ruberrimo; stipite albo ferrugineo-squamoso, tuberoso, solido.) (Sob.) Billiard herb. Franc. t. 100.

Habitat in nemoribus passim. Julio, Augusto et Septembri. Esculentus. Подосиновикъ, five красный грибокъ. Russ. Sob.

940. BOLETUS LACTEUS. Pileo convexo peltato orbiculato fusco, stipite lineari valido diffuso porisque linearibus confertissimis catenulatis niveis. (Sob.) Batsch el. fung. p. 103. f. 42.

Habitat in sylvis circa Rjabovam et fabricam pyriam Ochtensem ad radices arborum, gregatim. Septembri. Esculentus. Корнячокъ. Russ. Sobol.

941. **BOLETUS SQUAMOSUS.** Pileo flavescente squamoso, poris difformibus oblonge flexuosis niveis, stipite laterali. (Sob.) Bulliard herb. Franc. 1. p. 344. t. 19. et t. 312.

Habitat in nemoribus gramineis Ofinovae Roschczae, rarius. Septembri, Octobri. Esculentus. Заечникъ. Russ. Sob.

942. **BOLETUS RAMULORUM.** Coriaceus, pileo orbiculari, stipite laterali. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 124.

Habitat in sylvis ad truncos arborum putridos, gregatim. Autumnno. Обабокъ. Russ. Sob.

** Acaules.

943. **BOLETUS SUBEROSUS.** Pulvinatus albus laevis poris acutis difformibus. (G.) β ?) Bulliard herb. Franc. t. 491. f. 1.

Habitat in truncis arborum praecipue betulinis. Губа пробчатая. Russ. Sob.

944. **BOLETUS FOMENTARIUS.** Pulvinatus inaequalis obtusus, poris teretibus aequalibus glaucis. (Sob.)

Crescit in truncis arborum betulinis, in insula apothecaria et passim. Губка огнивая. Russ. Sobol.

945. **BOLETUS IGNIARIUS.** Pulvinatus laevis, poris tenuissimis. (Unguis equini facie.) (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 72. 401. et 454.

Habitat in truncis arborum Belulae albae aliisque, passim. Трунь, five губка. Russ. Губка выскальная. Sob.

946. **BOLETUS MEMBRANACEUS.** Submembranaceus prolifer, gregarius laevis radiatus albus, poris erosis difformibus. (Sob.) Swartz nov. pl. gen. et sp. p. 148.

Habitat in truncis arborum putridis, Ofinovae Roschczae et alibi in sylvis humidis umbrosis. Губа пльвистая. Russ. Sob.

947. **BOLETUS VERSICOLOR.** Fasciis discoloribus, poris albis. (Fasciis, in juvene, caeruleis albifve, in fenescente rubris.) (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 86.

Habitat in sylvis Ofinovae Roschczae et alibi ad truncos arborum antiquos. Губа разноцвѣтная. Russ. Sob.

948. **BOLETUS SUAVEOLENS.** Totus albus superne laevis poris inaequalibus. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 310.

Habitat in sylvis humidis ad truncos Salicinos antiquos. Губа пахучая. Russ. Sob.

949. **BOLETUS GLOBATUS.** Convexus subglobatus rufus laevis, poris teretibus flavis. (Sob.) Wildenow prodr. flor. berol. n. 1133.

Habitat in sylvis umbrosis circa fabricam pyriam Ochtensem humi ad ligna putrida. Горбачокъ. Russ. Sob.

950. **BOLETUS HIRSUTULUS.** Semicircularis plano convexus niveus supra hirsutus: lineis concentricis alternis depresso. (Sob.) Wulff. ap. Jacq. coll. 2. p. 149.

Habitat in sylvis Ofinovae Roschcze ad truncos arborum putridos. Мохнашикъ. Russ. Sob.

951. BOLETUS PAPYRACEUS. Albus fuscus papyraceus, poris inconspicuis. (Sob.) Schranck Flor. bav. 2. p. 618. n. 1739.

Habitat in sylvis umbrosissimis Ofinovae Roschczae ad truncos arborum semiputridos. Бѣлобу-
мажникъ. Russ. Sob.

952. BOLETUS OBLIQUUS. Ligneus poris obli-
quis rostratis inaequalibus. (Sob.) Bolton fung-
2. t. 74.

Habitat in truncis arborum vivarum Ofinovae
Roschczae Pargeloviique. Деревяникъ кри-
вый. Russ. Sob.

HYDNUM. Fungus subtus fibris subulatis echinatus.

953. HYDNUM IMBRICATUM. Stipitatum fus-
cum: pileo subconvexo squamoso: squamis im-
bricatis subrectis. (Sob. R.) Schaeff. fung. t. 140.

Habitat circa Petropolim in sylvis acerofis.
Autumno. Esculentus. Ежовикъ чешуйчатый.
Russ. Sob.

954. HYDNUM TOMENTOSUM. Stipitatum: pi-
leo plano infundibuliformi. (R. Sob.) Flor. dan-
t. 53. f. 3.

Habitat in sylvis acerofis Pargelovii et passim.
Autumno. Ежовикъ мохнатый. Russ. Sob.

955. HYDNUM PARASITICUM. Acaule, arcuato-
rugosum subvillosum. (Sob.) Willden. bot. mag.
4. p. 12. f. 5.

Habitat in truncis arborum circa Oranienbaum.
Autumno. Ежовикъ наростовый. Russ. Sob.

956. **HYDNUM CANDIDUM.** Acaule, album aculeis longis concoloribus. (Sob) Willden. bot. mag. 4. p. 14. f. 7.

Habitat in fylvis ad truncos arborum, in infula opothecaria et ad fabricam pyriam Ochtensem, rarius. Septembri. Esculentus optimus. Пестрець, Russ. five ежевикъ бѣлый. Sob.

THAELAEPHORA. Fungus suberosus subtus papillatus fructificans.

957. **THAELAEPHORA MFSENTERICA.** Horizontalis, acaulis gelatinofo-coriacea imbricata tortuosa, supra villosa fasciata; subtus glabra villosa. (Sob.) Bulliard. herb. Franc. t. 290.

Habitat iu fylvis humidis umbrosis Ofinovae Roschczae ad truncos arborum. Autumno. Пупырчикъ извилистый. Russ. Sob.

958. **THAERAEPHORA SERICEA.** Horizontalis, acaulis imbricata coriacea, supra sericea fasciata pallescens, subtus glabra flavescens. (Sob.) Schrader fung. ined.

Habitat in fylvis humidis Ofinovae Roschczae ad truncos arborum et ligna putrida. Septembri, Octobri. Пупырчикъ желтошелковый. Russ. Sob.

CLAVARIA. Fungus elongatus glaber clavatus aut ramosus (familiaris) subsolidus; in superficie omni fructificans.

959. **CLAVARIA PISTILLARIS.** Acaulis, clavaeformis simplicissima glabra fistulosa solida (Sob. B.) Schaeff. fung. t. 169.

Habitat in fylvis umbrosis Caterinhoffii et raffim. Autumnno. Булаваспикъ кругленькй. Russ. Sob.

960. CLAVARIA OPHIOGLOSSOIDES. Acaulis, clavata integerrima compressa obtusa. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 372.

Habitat in fylvis umbrosis humidis infulae apothecariae et circa Strelinam. Iulio, Augusto, et Septembri. Булаваспикъ сплюснутый. Russ. Sob.

961. CLAVARIA CORALLOIDES. Ramosa, ramis confertis ramosissimis inaequalibus. (Sob. B.) Schaeff. fung. t. 175. 177.

Habitat in fylvis umbrosis infulae apothecariae in parte occidentali, et circa viam Sarfcoselienfem. Iulio, Augusto et Septembri. Булаваспикъ сучковатый. Russ. Sob.

962. CLAVARIA MUSCOIDES. Ramosa, ramis ramosis acuminatis inaequalibus luteis. (B. Sob.) Flor. dan. t. 775.

Habitat in fylvis umbrosis Strelinae inter muscos. Iunio, Iulio et Augusto. Булаваспикъ мшистый. Russ. Sob.

TREMELLA. Fungus gelatinosus, uniformis diaphanus feminibus latitantibus.

963. TREMELLA GRANULATA. Sphaerica aggregata viridis. (Sob.) Ulva granulata. Linn. Flor. dan. t. 705.

Habitat ad ripas Nevae fluvii circa Caterinhoffium, et raffim. Iulio, Augusto. Дрожалка зернистая. Russ. Sob.

964. TREMELLA PRUNIFORMIS. Subglobosa folitaria intus succulenta. (Sob.) Ulya pruniformis. Linn. Weig. obs. bot. t. 2. f. 4.

Habitat in lacu ad radicem montis Duderovii. Julio, Augusto. Дрожалка грушководная. Russ. Sob.

965. TREMELLA HEMISPHERICA. Hemisphaerica sparsa. (Sob.) Weig. obs. bot. t. 2. f. 3.

Habitat in ripis maritimis circa Peterhoffium et Oranienbaum. Дрожалка полушаристая. Russ. Sob.

966. TREMELLA ARBOREA. Subrotunda sessilis undulata nigrescens. (Sob.) Hoffm. veg. crypt. 1. p. 37. t. 8. f. 1.

Habitat in sylvis Oginovae Roschcaez et passim in ligno putrido et ramulis moribundis. Augusto. Septembri et Octobri. Дрожалка древесная. Russ. Sob.

967. TREMELLA MESENERICA. Subrotunda sessilis plicato-undulata aurea. (R. Sob.) Jacq. misc. austr. 1. t. 13.

Habitat in sylvis humidis ad fabricam pyriam Ochtersen et passim ad arborum deciduarum ramos emortuos. Autumnno. Дрожалка извилистая. Russ. Sob.

968. TREMELLA NOSTOC. Plicata undulata. (Sinuosa pinguis et fugax undulata fordide rufescens.) (Sob.) Flor. dan. t. 885. f. 1.

Habitat in pratis ficcis sylvosis post pluvias aestivas. Возгрица, five хмара. Russ. Дрожалка возгрявая. Sob.

969. TREMELLA CINNABARINA. Plicata mollis crassa ramosa rubra. (Sob.) Bulliard. herb. Frac. t. 306.

Habitat in fylvis insulae apothecariae et Ofinovae Roschczae Septembri, Octobri. Дрожалка кинварная.

970. TEMELLA VERRUCOSA. Sessilis tuberculosa solida. (Sob.) Hoffm. veg. crypt. 1. p. 39. t. 8. f. 2.

Habitat in fluvio Nevae ad ripam insulae apothecariae supra lapillos et ligna putrida demersa, copiosissime. Iulio, Augusto. Дрожалка бородавчатая. Russ. Sob.

PHALLUS. Fungus subtus laevis, supra cellulis reticulatus.

971. PHALLUS ESCULENTUS. Pileo ovato margine adnato, rugis undulatis undique anastomofantibus, stipite tenuiori. (G.) Schaeff. fung. t. 298 - 300.

Habitat in fylvis passim. Primo vere. Esculentus. Сморокк. Russ. Сморокк кухонный. Sob.

HELVELLA. Fungus pileo inflato difformi concavoque laevi femina superne elastice protrudente.

972. HELVELLA MITRA. Stipitata, stipite fistuloso fulcis lacunisque inaequali pileo deflexo multilobato adnato. (Sob.) Schaeff. fung. t. 154. 162.

Habitat in fylvis ad truncos arborum putridos. Iunio, Iulio. Esculentus. Строчокк. Russ. Строчокк кухонный. Sob.

973. *HELVELLA CERASINA*. Stipitata, subfessilis gregaria pyriformi - campanulata rubra: margine dentato. (Sob.) Wulfen. ap. Iacq. collect. I. p. 347.

Habitat in fylvis umbrosis humidis Ofinovae Rofchczae supra ramulos arborum dejectos. Septembri, Octobri. Строчокъ вишневый. Russ. Sob.

974. *HELVELLA COCCINEA*. Acaulis subglobofo-campanulata intus coccinea margine integro. (Sob. R.) Schaeff. fung. t. 148. Olim, Tremella coccinea.

Habitat in nemoribus infulae lapideae et ad Goreloy cabac, ad radices et truncos arborum. Augusto, Septembri. Строчокъ алый. Russ. Sob.

PEZIZA. Fungus saepe concavus, sine capsulis aut feminibus nudo oculo conspicuis.

975. *PEZIZA PURPUREA*. Stipitata, purpurea stipite coriaceo, in cyathum exterius exalbidum terminato. (Sob.) Hedwig. crypt. II. 3. p. 77. t. 22. f. A. Tremella purpurea. Linn.

Habitat in fylvis circa fabricam pyriam Ochtensem in ramis Belulae deciduis. Autumno. Чашница красносиняя. Russ. Sob.

976. *PEZIZA MINUTISSIMA*. Stipitata, alba minutissima convexo - depresso patens, stipite brevi distincto. (Sob.) Batfch el. fung. cent. I. p. 206. f. 143.

Habitat in umbrosis supra furculos arborum putrescentes, in infula apothecaria et passim. Autumno. Чашница малѣйшая. Russ. Sob.

977. PEZIZA HIRTA. Sessilis hemisphaerica extrinsecus pilosa spadicea, intus coccinea glabra. (Sob.) Hedwig. crypt. II. 1. p. 15. t. 3. f. B. 1 - 6.

Habitat in nemoribus umbrosis ficcioribus elatioribus et ericetis Pargelovii alibique, nec non in infulae apothecariae locis ficcioribus post pluvias Augusto et Septembri. Чашница космашая. Russ. Sob.

978. PEZIZA ACETABULUM. Gelatinosa, cyathiformis sessilis exterius angulata: venis ramosis. (G.) Schaeff. fung. t. 150. 155. 156.

Habitat in fylvis gramineis post pluvias. Autumno. Чашница жилистая. Russ. Sob.

CYATHUS. Fungus campanulatus cylindricusve capsulas lentiformes intus gerens.

979. CYATHUS LAEVIS. Campanulatus exterius villosus intus laevis. (Sob.) Peziza lentifera. Lin. (G.) Flor. dan. t. 105.

Habitat in agris, lignis putridis, sepimentis et areis hortorum. Aestate et autumnno. Спаканничокъ гладкій. Russ. Sob.

980. CYATHUS STRIATUS. Campanulatus exterius hirsutus intus striatus. (Sob.) Flor. dan. t. 469. f. 1.

Habitat in lignis putridis et agris, aestate et autumnno. Спаканничокъ спруйчатый. Russ. Sob.

981. CYATHUS CRUCIBULIFORMIS. Ventricosus glaber aurens. (Sob.) Schaeff. fung. t. 179, 181.

Habitat in fylvis et hortis, ad ligna putrida. Aestate et autumnno. Спаканничокъ кушинистый. Russ. Sob.

982. CYATHUS CORONARIUS. Cyathiformis utrinque glaber: limbo laciniato erecto. (Sob.) Jacq. musc. austr. 1. p. 140. t. 10.

Habitat in fylvis montosis arenosis Osinovae Koschcaez, Pargelovii et passim, post pluvias aestate et autumnno. Спаканничокъ корончатый. Russ. Sob.

LYCOPERDON. Fungus: Fila feminifera cum thecae parietibus internis connexa.

983. LYCOPERDON PROTEUS. Pulverulentum, subrotundum substipitatum lacero-dehiscens, carne alba feminibus atris. (Sob.) Bulliard herb. Franc. 1. p. 148. u) L. serapeforme. t. 435. f. 2.

Habitat in pratis montosis circa Krasnoselium et passim. Augusto. Дожжевикъ многообразный. Russ. Sob.

984. LYCOPERDON CIRCUMSCISSUM. Pulverulentum subseffile subrotundum exasperatum: parte inferiore persistente circumscisso-lacera, polline brunneo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 186. 189. - 191.

Habitat in pratis montosis apricis arenosis Pargelovii et circa Caterinhoffium et passim. Augusto. Дожжевикъ обрѣзный. Russ. Sob.

985. LYCOPERDON CAPITATUM. Pulverulentum, subgobosum glabrum stipite valido incrassato, radicibus fusiformibus flexuosis. (Sob.) Michel. nov. pl. gen. t. 98. f. 1.

Habitat in montosis Duderovii, et Gatzcinae. Augusto. Дожжевикъ головастый. Russ. Sob.

986. LYCOPERDON BOVISTA. Globosum lacero-dehiscens stipite validissimo clavato ventricoso, carne alba, feminibus atris. (G.) Schaeff. fung. t. 292. 295. Bovista five crepitus lupi, officin.

Habitat in campis, collibus et pratis pascuis passim. Augusto, Septembri et Octobri. Дожжевикъ бычачий. Russ. Sob.

987. LYCOPERDON GIGANTEUM. Ochraceo-album glabrum sessile deforme globosum, filamentis teneris densis flavo-virentibus. (Sob.) Batfch el. fung. cent. 1. p. 237. f. 165.

Habitat in pratis montosis Osinovae Roschcaez. Augusto, Septembri. Дожжевикъ великанский. Russ. Sob.

988. LYCOPERDON MURICATUM. Sessile pyriforme extrinsecus muricatum, ore subrotundo. (Sob.) Michel. nov. pl. gen. t. 97. f. 5.

Habitat in pratis montosis ficioribus circa Krasnoselium. Augusto. Дожжевикъ шероховатый. Russ. Sob.

989 LYCOPERDON STELLATUM. Volva multifida, capitulo subrotundo sessili; ore integro. (Sob.) Flor. dan. t. 360.

Habitat in pratis montosis et nemoribus circa pagum Kuzmino et Sarscoselium, rarius. Julio, Augusto. Дожжевикъ звёздочный. Russ. Sob.

990. LYCOPERDON EPIDENDRUM. Parasiticum, cortice farinaque purpurea. (G.) Flor. dan. t. 720.

Habitat in lignis putridis passim. Augusto, Septembri. Дожжевикъ древесный. Russ. Sob.

991. LYCOPERDON NITIDULUM. Parasiticum, luteum fragile nitens, pulvere atro arenaceo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 192.

Habitat in fylvis montosis Pargelovii et alibi ad ramos arborum deciduos putrescentes. Augusto, Septembri et Octobri. Дожжевикъ свѣшленькій. Russ. Sob.

992. LYCOPERDON GREGARIUM. Parasiticum, congestum sphaericum, cortice fusco nitente, pulvere aureo. (Sob.) Retz obs. bot. 1. p. 33.

Habitat in pratis elevatis et silvis apricis prope pagum Dranitzi et in Ofinova Roschca ad furculos Arborum putrescentes. Дожжевикъ спадовый. Russ. Sob.

FULIGO. Fungus cortice celluloso - fibroso: fibris per massam feminalem reticulatim penetrantibus.

993. **FULIGO SEPTICA.** Flava laciniata. (Sob.) Mucor septicus. Linn. Flor. dan. t. 778.

Habitat in fylvis inter folia putrida et in vaporariis deservescens, visibili incremento; matura feminam explosens. minimo attactu collabitur in pulvem. Маралка гноющая. Russ. Sob.

994. **FULIGO PANICEA.** Minima alba sessilis, panici granum referens. (Sob.) Gled. meth. fung. p. 158. n. 11. var. b.

Habitat in fylvis humidis insulae apothecariae et lapideae atque in aliis locis similibus inter

folia dejecta, et in furculis putridis. Augusto, Septembri. Марапка просовидная. Russ. Sob.

STEMONITIS. Fungus: cortice (fugaci membranaeove) thecae rupto fila. feminifera reticulato-compacta elastice sese expandentia.

995. **STEMONITIS TYPHINA.** Capitulo elongato, fusco rubens stipite tereti aequali. (Sob.) Bulliard herb. franc.. p. 119. t. 477. f. 1.

Habitat in pratis et sylvis humidis ad ligna putrida. Autumno. Гвоздочникъ темнокрасный. Russ. Sob.

996. **STEMONITIS EMBOLUS.** Stipite nigro albo-villoso, capitulo elongato fusco. (Sob.) Mucor Embolus Linn. (G.) Hall. enumer. stirp. Helv. t. 1. f. 1.

Habitat in lignis putridis aëri expositis. Гвоздочникъ темноголовый. Russ. Sob.

997. **STEMONITIS SPHAEROCERHALA.** Stipite filiformi nigro, capitulo globofo cinereo. (Sob.) Hoffm. Crypt. veget. 2. t. 4. f. 2.

Habitat in lignis putridis, parietibus et lapidibus. Aestate. Гвоздочникъ круглоголовый. Russ. Sob.

998. **STEMONITIS LICHENOIDEIS.** Stipite bulbato nigro, capitulo lentiformi cinereo. (Sob.) Hoffm. Crypt. veget. 4. t. 4. f. 13.

Habitat in corticibus Pini, Osinovae Roschczae. Augusto. Гвоздочникъ лишайчатый. Russ. Sob.

999. **STEMONITIS FULVA.** Capitulo globofo coccineo: filis feminiferis fuscis. (Sob.) Bolton fung. t. 93. f. 3.

Habitat in fylvis humidis Ofinovae Rosiczae ad truncos arborum putridos. Гвоздочникъ желтый. Russ. Sob.

1000. **STEMOMITIS VESICULOSA.** Acaulis, globulosa, feminibus ferrugineo-ochraceis. (Sob.) Batsch. el. fung. cent. 1. f. 171.

Habitat in fylvis humidis ad ligna putrida et furculos deciduos. Гвоздочникъ пузыристый. Russ. Sob.

1001. **STEMONITIS VITELLINA.** Acaulis, subrotunda glabra lutea: ore fusco. (Sob.) Jacq. musc. austr. 1. p. 138. t. 5.

Habitat in truncis arborum et furculis putrescentibus. Гвоздочникъ темноустый. Russ. Sob.

RETICULARIA. Fungus subrotundus: theca rigida feminibus inter fila reticulata dispersis repleta.

1002. **RETICULARIA, USTILAGO.** Acaulis fusco-nigricans. (Sob.) Bulliard herb. Franc. 1. p. 90. t. 472. f. 2.

Habitat in destructis granis Hordei, Tritici, graminumque aliorum, inque flosculis Tragopogonis, Scorzenerae, forma pulveris nigri. Сточница горблая. Russ. Sob.

AECIDIUM. Fungus: Theca (membranacea) utrinque glabra feminibus nudis non cohaerentibus plena.

1003. AECIDIUM TUSSILAGINIS. Caespitosum, thecis subprominentibus flavis, feminibus aurantiis. (Sob.) Olim lycoperdon epiphyllum. Linn.

Habitat in dorso foliorum tussilaginis aliorumque vegetabilium. Бородавочникъ листовой. Russ. Sob.

SPHAERIA. Fungus: Thecae subrotundis feminibus nudis, gelatinosis repletae.

1004. SPHAERIA MILITARIS. Mollis pileo clavato elongato rubro, stipite laeviusculo. (Sob.) Clavaria militaris. Linn. Flor. dan. t. 637.

Habitat in truncis arborum et lignis putrescentibus Ofinovae Roschzae. Шаровница красно-головая. Russ. Sob.

1005. SPHAERIA HYPOXYLON. Suberosa, pileo ramofo compresso. (Sob.) Clavaria hypoxylon. Linn. (G.) Bulliard. herb. Franc. t. 180.

Habitat in cellis, navibus et in scrobibus obscuris nunquam sole illustratis ad ligna putrida. Шаровница древесная. Russ. Sob.

TUBER. Fungus subglobosus carnosus: carne intus venis distincta.

1006. TUBER GULOSORUM. Globosum solidum muricatum radice destitutum. (F.) Lycoperdon tuber. Linn. Michel. nov. nov. pl. gen. t. 102.

Habitat circa Sarsoje felo, et Cojrova, in districtu Oranienbaumii, sub terra, rarius. Autumnno. Esculentus: Труфель обжорный. Russ. Sob.

MUCOR. Fungus fugax: Capitula rorida primo diaphana demum opaca; stipitibus simplicibus ramosisve affixa.

1007. **MUCOR ALBUS.** Albus capitulo globofo. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 407. f. 3.

Habitat in corticibus arborum et lignis putridis. Aestate et autumnno. Пльсня бѣлая. Russ. Sob.

1008. **MUCOR FLAVUS.** Luteus capitulo globofo. (Sob.) Hall. hist. stirp. Helv. n. 2151.

Habitat in sylvis humidis ad truncos arborum putridos et in pane putrescente. Пльсня желтая. Russ. Sob.

1009. **MUCOR ARANEOSUS.** Canus telam aranearum referens. (Sob.) Schranck. fl. bav. 2. p. 638. n. 1796.

Habitat in lignis putridis. Пльсня паушинная. Russ. Sob.

1010. **MUCOR MUCEDO.** Stipitatus capsula globofa. (G.) Michel. nov. pl. gen. t. 95. f. 2. 4.

Habitat in variis putridis, pane plantis etc. Пльсня слизкая Russ. Sob.

1011. **MUCOR ERYSHIPHE,** Albus, capitulis fuscis sessilibus. (G.)

Habitat in foliis plantarum crescentium Humuli, Aceris, Lamii, Galeopsidis, Lithospermi arvensis. Пльсня шемноголовая. Russ. Sob.

1012. **MUCOR VIRENS.** Thalaffinus, capitulo globofo. (R. Sob.) Batfch. el. fung. p. 157. n. 2.

Habitat in humidis umbrosis ad ligna putrida. Autumnno. Пльсня зеленая.

♦ **MONILIA.** Fila moniliformia in capitulum congregata.

1013. **MONILIA CRUSTACEA.** Stipitata, spicis digitatis. (Sob.) Mucor crustaceus. Linn. (G.) Flor. dan. t. 897. f. 1.

Habitat in cibis corruptis et fructibus. Манисто, five ожерелье корочное. Russ. Sob.

1014. **MONILIA CESPITOSA.** Stipite ramofo, spicis ternatis. (Sob.) Michel. nov. pl. gen. t. 91. f. 3.

Habitat in lignis, foliis, et variis putridis. Манисто дернистое. Russ. Sob.

1015. **MONILIA GLAUCA.** Cana villosa, stipite fetaceo brevi, capitulo globofo. (Sob.) Mucor glaucus. Linn. (G.) Bulliard herb. Franc. t. 504. f. 10.

Habitat in lignis putridis, in Melonibus, citris, Pomis aliisque corruptis. Манисто сизое. Russ. Sob.

1016. **MONILIA LEPROSA.** Setacea capitalis radicalibus. (Sob.)

Habitat in cavitatibus arborum, cavernulis, et in locis obscuris, humidis. Манисто ббложел-
шое. Russ. Sob.

A D D E N D A.

Postquam jam textus Florae hujus impressus fuerit, inveni mense Majo et Junio, hujus anni 1799, nonnullas plantulas cryptogamas, uti merulios, a nemine adhuc descriptos atque Agaricos, etc: quos prae festinatione in posterum relinquo; at eas quas desinivi hic sisto breviter.

1017. PEZIZA CYATHOIDES.

Habitat ad ligna putrida in locis umbrosis, humidis. Чашница спаканисная. Russ. Sob.

1018. PEZIZA CILIATA.

Habitat in locis umbrosissimis humidis inter Urticam dioicam, ad terram et ad frustula ligni putridi. Чашница реснистая. Russ. Sob.

1019. ASCOPHORA FRAGILIS.

Habitat in ligno putrido et in fimeto vetusto. Кожанка ломкая. Russ. Sob.

I N D E X

Plantarum, in Elora Petropolitana enumeratarum, genericus et specificus.

	pag.		pag.
Acer.	238	Agaricus.	
platanoides.	—	aqueus.	302
tataricum.	—	bulbosus.	287
Achillea.	202	campestris.	—
millefolium.	—	candidus.	301
ptarmica.	—	cereolus.	298
Aconitum.	125	cespitosus.	304
lycoctonum.	126	cimicarius.	296
Actaea.	122	cinereus.	302
spicata.	—	cinnamomeus.	291
Adoxa.	93	clavus.	299
moschatellina.	—	clypeatus.	290
Aecidium.	322	conchatus.	294
tuffilaginis.	323	conicus.	301
Aegopodium.	74	crassipes.	292
podagraria.	75	croceus.	290
Aethusa.	71	cyanoxanthus.	289
cynapium.	—	degener.	293
Agaricus.	286	deliciosus.	295
abietis.	299	digitalis.	303
acerrimus.	296	dulcis.	295
adhaerens.	291	emeticus.	289
adultus.	300	excoriatus.	287
aggregatus.	294	fascicularis.	292
alliaceus.	299	fasciculatus.	301
alliatus.	—	fastigiatus.	291
amarus.	297	flabellatus.	293
androsaceus.	300	flavidus.	292

	pag.		pag.
Agaricus.		Agaricus.	
floccofus,	288	testaceus.	292
fragilis.	291	torminosus.	295
fumus.	299	umbelliferus.	300
fuscescens.	298	vaillantii.	303
gelatinofus.	304	violaceus.	290
Georgii.	290	virescens.	289
glaucus.	294	virgineus.	288
glutinofus.	290	zonarius.	295
jaanthinus.	298	Agrimonia.	111
infundibuliformis.	293	eupatoria.	—
integer.	289	Agrostemma.	106
maculatus.	286	githago.	107
mammosus.	298	Agroffis.	16
mappa.	286	alba.	19
margaritaceus.	—	arundinacea.	17
melleus.	297	calamagrostis.	—
muscarius.	286	canina.	18
mutabilis.	288	capillaris.	—
nivofus.	292	miliacea.	17
obefus.	294	rubra.	18
opacus.	297	spica venti.	16
ovatus.	302	stolonifera.	18
perennis.	304	Aira.	19
piperatus.	297	alpina.	20
porcellaneus.	303	aquatica.	19
praealtus.	287	canescens.	20
pratensis.	288	cephitofa.	—
radiatus.	301	flexuofa.	—
rufus.	296	subspicata.	19
scrobiculatus.	—	Ajuga.	134
fordidulus.	302	pyramidalis.	135
stercorarius.	303	Alchemilla.	40
striatus.	291	vulgaris.	—
fulphuratus.	300	Alisma.	85

INDEX.		329
	pag.	pag.
Alismaplantago.	86	Anthemis cotula. 201
Allium.	78	pyrethrum. —
oleraceum.	—	tinctoria. 202
schoenoprasum.	—	Anthoceros. 266
Alopecurus.	15	laevis. 267
aequalis.	16	Anthoxanthum. 8
geniculatus.	—	odoratum. —
pratensis.	15	Anthyllis. 167
Alfene.	75	Vulneraria. —
media.	—	Antirrhinum. 148
Alyssum.	154	cymbalaria. 149
incanum.	—	linaria. —
Amaranthus.	224	minus. —
blitum.	—	Aquilegia. 126
Anchusa.	46	vulgaris. —
angustifolia.	—	Arabis. 158
officinalis.	—	thaliana. —
tinctoria.	—	Arbutus. 97
Andromeda.	96	uva ursi. —
calyculata.	—	Arctium. 187
polifolia.	—	lappa. —
Androface.	49	Arenaria. 104
maxima.	—	peploides. —
septentrionalis.	—	rubra. 105
Anemone.	127	serpyllifolia. —
hepatica.	—	trinervia. —
nemorosa.	128	Artemisia. 192
pulsatilla.	—	absinthium. 193
ranunculoides.	—	campestris. 192
vernalis.	127	vulgaris. 193
Angelica.	69	Arundo. 29
Archangelica.	70	arenaria. 30
sylvestris.	—	calamagrostis. —
Anthemis.	201	epigejos. —
arvensis.	—	phragmites. —

	pag.		pag.
Afarum.	110	Boletus.	
europaeum.	—	globatus.	310
Asperula.	34	hirsutulus.	—
laevigata.	—	igniarius.	309
Asplenium.	244	lacteus.	308
trichomanoides.	—	leptocephalus.	307
Athamanta.	67	luteus.	—
cervaria.	—	membranaceus.	310
libanotis.	—	mutabilis.	307
Atriplex.	237	nummularius.	306
patula.	—	obliquus.	311
Avena.	28	papyraceus.	—
elatior.	—	perennis.	306
fatua.	29	ramulorum.	309
pratensis.	—	squamosus.	—
pubescens.	—	suaveolens.	310
		suberosus.	309
Betonica.	139	tuberosus.	308
officinalis.	—	versicolor.	310
Betula.	221	viscidus.	307
alba.	222	Brassica.	159
alnus.	—	campestris.	—
fruticosa.	223	Napus.	—
nana.	222	Briza.	24
pendula.	—	media.	—
Bidens.	190	Bromus.	27
cernua.	191	arvensis.	28
minima.	190	giganteus.	—
tripartita.	—	mollis.	27
Blasia.	265	secalinus.	—
pusilla.	—	squarrosus.	—
Boletus.	306	tectorum.	28
bovinus.	307	Bryum.	252
ferrugineus.	308	androgynum.	255
fomentarius.	309	apocarpum.	254

INDEX.		331	
	pag.	pag.	
Bryum.		Campanula.	
mnioides.	253	rapunculoides.	55
pomiforme.	—	rhomboidea.	54
pulvinatum.	—	rotundifolia.	53
rurale.	255	Trachelium.	55
setaceum.	254	uniflora.	53
squamrosum.	256	Cardamine.	155
subulatum.	253	amara.	—
trunculatum.	254	pratensis.	—
viridulum.	255	Carduus.	188
Butomus.	94	crispus.	—
umbellatus.	—	heterophyllus.	189
Buxbaumia.	247	lanceolatus.	188
aphylla.	248	palustris.	—
Byffus.	284	tataricus.	189
candida.	285	Carex.	217
flos aquae.	—	acuta.	221
fulva.	—	arenaria.	218
phosphorea.	—	caespitosa.	220
septica.	284	dioica.	217
velutina.	285	elongata.	219
		flava.	—
Calla.	213	globularis.	220
palustris.	214	hirta.	221
Callitriche.	1	leporina.	218
autumnalis.	2	limosa.	220
verna.	—	muricata.	219
Caltha.	134	panicea.	220
palustris.	—	pulicaris.	217
Campanula.	58	uliginosa.	218
cervicaria.	56	vesicaria.	221
glomerata.	55	vulpina.	218
latifolia.	—	Carlina.	190
patula.	53	vulgaris.	—
perficifolia.	54	Carum.	74

	pag.		pag.
Carum carvi.	74	Cichorium.	186
Cantaurea.	203	Intybus.	—
Cyanus.	204	Cicuta.	71
jacea.	—	virosa.	—
phrygia.	203	Cineraria.	198
Scabiosa.	204	glauca.	—
Centunculus.	39	fibrica.	—
minimus.	40	Circaea.	2
Cerastium.	108	alpina.	—
aquaticum.	109	lutetiana.	—
semidecandrum.	108	Cistus.	124
viscosum.	—	Helianthemum.	125
vulgatum.	—	Clavaria.	312
Chaerophyllum.	72	coralloides.	313
aromaticum.	—	muscoides.	—
fylvestre.	—	ophioglossoides.	—
Chara.	214	pistillaris.	312
vulgaris.	—	Clinopodium.	142
Chelidonium.	122	vulgare.	—
majus.	123	Cnicus.	189
Chenopodium.	61	oleraceus.	—
album.	62	Comarum.	121
glaucum.	63	palustre.	122
hybridum.	62	Conferva.	282
maritimum.	63	bulbosa.	283
polypermum.	—	canicularis.	—
rubrum.	61	capillaris.	—
urbicum.	—	dichotoma.	284
viride.	62	fluviatilis.	283
Chysanthemum.	199	fontinalis.	—
inodorum.	—	gelatinosa.	284
Leucanthemum.	—	glomerata.	—
segetum.	200	reticulata.	—
Chrysofenium.	98	rivularis.	282
alternifolium.	99	Conium.	65

INDEX.

333

	pag.		pag.
Conium.		Cynofurus.	25
<i>maculatum.</i>	66.	<i>caeruleus.</i>	—
Convallaria.	79	Cypripedium.	213
<i>bifolia.</i>	80	<i>calceolus.</i>	—
<i>majalis.</i>	79	Dactylis.	25
<i>multiflora.</i>	80	<i>glomerata.</i>	—
<i>Polygonatum.</i>	—	Daphne.	90
Convolvulus.	52	<i>mezereum.</i>	—
<i>sepium.</i>	—	Daucus.	65
Conyza.	194	<i>carota.</i>	—
<i>squarrosa.</i>	195	Delphinium.	125
Coreopsis.	203	<i>consolida.</i>	—
<i>bidens.</i>	—	Dianthus.	100
Cornus.	40	<i>deltoides.</i>	101
<i>suecica.</i>	—	<i>plumarius.</i>	—
Corylus.	226	Draba.	153
<i>avellana.</i>	—	<i>verna.</i>	—
Crataegus.	114	Drosera.	77
<i>oxyacantha.</i>	—	<i>longifolia.</i>	—
Crepis.	184	<i>rotundifolia.</i>	—
<i>biennis.</i>	185	Echium.	48
<i>tectorum.</i>	184	<i>vulgare.</i>	—
Cucubalus.	101	Elatine.	94
<i>bacciferus.</i>	—	<i>hydropiper.</i>	—
<i>behen.</i>	102	Elymus.	31
<i>tataricus.</i>	—	<i>arenarius.</i>	—
Cuscuta.	41	<i>caninus.</i>	32
<i>europaea.</i>	—	<i>fibricus.</i>	31
Cyathus.	317	Empetrum.	232
<i>coronarius.</i>	318	<i>nigrum.</i>	—
<i>crucibuliformis.</i>	317	Epilobium.	87
<i>laevis.</i>	—	<i>angustifolium.</i>	—
<i>striatus.</i>	—	<i>hirsutum.</i>	—
Cynoglossum.	47		
<i>officinale.</i>	—		

	pag.		pag.
Epilobium.		Euphrasia.	
montanum.	88	odontites.	145
palustre.	—	officinalis.	—
parviflorum.	—		
Equisetum.	239	Festuca.	26
arvense.	240	elatior.	—
fluviale.	—	fluitans.	—
hyemale.	241	ovina.	—
limosum.	240	Filago.	204
palustre.	—	arvensis.	205
sylvaticum.	239	montana.	—
Erica.	90	Fontinalis.	247
vulgaris.	—	pennata.	—
Erigeron.	195	Fragaria.	119
acre.	—	vesca.	—
canadense.	—	Fraxinus.	238
Eriophorum.	12	excelsior.	239
polystachion.	14	Fuligo.	320
vaginatum.	12	panicea.	—
Eryum.	171	septica.	—
hirsutum.	172	Fumaria.	165
tetraspermum.	171	bulbosa.	—
Erysimum.	157	officinalis.	—
barbarea.	—		
cheiranthoides.	—	Galeopsis.	138
officinale.	—	galeobdolon.	139
Evonymus.	60	ladanum.	138
europaeus.	—	tetrahit.	—
Eupatorium.	191	Galium.	35
cannabinum.	—	aparine.	38
Euphorbia.	112	boreale.	37
helioscopia.	—	glaucum.	—
palustris.	—	mollugo.	—
peplus.	—	palustre.	35
Euphrasia.	145	spurium.	36

INDEX.

	pag.		335
Galium.		Helvella.	315
trifidum.	35	cerasina.	316
uliginosum.	36	coccinea.	—
verum.	—	mitra.	315
Gentiana.	64	Heracleum.	69
campestris.	—	angustifolium.	—
centaurium.	—	sphondylium.	—
cruciata.	65	Hieracium.	181
pneumonanthe.	64	aurantiacum.	183
Geranium.	161	auricula.	182
cicutarium.	—	cymosum.	—
columbinum.	163	dubium.	—
lucidum.	—	murorum.	183
palustre.	162	paludosum.	—
pratense.	—	pilosella.	182
robortianum.	—	praemosum.	183
rotundifolium.	163	fabaudum.	184
sylvaticum.	161	umbellatum.	—
Geum.	121	Hippuris.	1
rivale.	—	vulgaris.	—
urbanum.	—	Holcus.	236
Glecoma.	136	lanatus.	—
hederacea.	—	odoratus.	—
Globularia.	33	Hottonia.	50
vulgaris.	—	palustris.	—
Gnaphalium.	193	Humulus.	233
alpinum.	194	lupulus.	—
dioicum.	193	Hydnum.	311
sylvaticum.	194	candidum.	312
uliginosum.	—	imbricatum.	311
Gratiola.	7	parasiticum.	—
officinalis.	—	tomentosum.	—
Gypsophila.	100	Hydrocharis.	234
muralis.	—	mosus ranae.	235
		Hyoscyamus.	58

	pag.		pag.
Hyoscyamus.		Inula.	198
niger.	58	dysenterica.	—
Hypericum.	177	helenium.	—
hirsutum.	178	falicina.	199
perforatum.	177	Iris.	10
quadrangulum.	—	Pseudacorus.	—
Hypnum.	256	fibirica.	—
alopecurum.	260	Isoëtes.	246
bryoides.	256	lacustris.	—
complanatum.	258	Juncus.	80
crista castrensis.	259	articulatus.	82
cupressiforme.	260	bufonius.	—
curtipendulum.	257	bulbosus.	—
cuspidatum.	261	campestris.	—
dendroides.	257	conglomeratus.	80
filicinum.	259	effusus.	81
filifolium.	256	filiformis.	—
fluitans.	258	pilosus.	82
praelongum.	259	squamulosus.	81
proliferum.	—	Jungermannia.	261
purum.	260	bicuspidata.	262
riparium.	261	bidentata.	—
sericeum.	257	ciliaris.	263
serpens.	258	complanata.	262
squamulosum.	260	dilatata.	—
taxifolium.	256	epiphylla.	264
triquetrum.	258	pinguis.	—
velutinum.	261	platyphylla.	263
Hypochoeris.	185	pusilla.	—
maculata.	—	reptans.	262
radicata.	186	tamariscifolia.	263
		Juniperus.	235
		communis.	—
Impatiens.	207		
noli tangere.	208		

INDEX.

	pag.		pag.
Lamium.	137	Lepra.	337
album.	—	lactea.	282
amplexicaule.	—	rubens.	—
purpureum.	—	Lichen.	267
Lapfana.	186	aphthofus.	276
communis.	—	atratus.	273
Lathraea.	147	atrovirens.	268
squamaria.	—	barbatus.	289
Lathyrus.	168	byffoides.	268
heterophyllus.	169	calcareus.	269
latifolius.	—	calycaris.	274
palustris.	—	candelarius.	270
pratensis.	168	caninus.	276
fylvestris.	—	caperatus.	275
Ledum.	95	centrifugus.	271
palustre.	96	chalybeiformis.	280
Lemna.	215	ciliaris.	273
minor.	—	cocciferus.	277
polyrrhiza.	—	corallinus.	271
trifulca.	—	cornucopioides.	277
Leontodon.	180	cornutus.	278
autumnale.	181	crispus.	273
hispidum.	—	deformis.	278
taraxacum.	—	deustus.	276
Leonurus.	141	digitatus.	278
cardiaca.	—	ericetorum.	268
Lepidium.	153	fagineus.	270
raderale.	—	farinaceus.	274
Lepra.	280	fascicularis.	273
antiquitatis.	281	fimbriatus.	277
botryoides.	282	floridus.	279
cinerea.	281	fragilis.	—
flava.	—	fraxineus.	275
incana.	—	furfuraceus.	274
jolitus.	—	fusco-ater.	269

	pag.		pag.
Lichen.		Linnaea.	150
<i>glaucus.</i>	275.	<i>borealis.</i>	—
<i>gracilis.</i>	277.	Linum.	76
<i>hirtus.</i>	280.	<i>catharticum.</i>	—
<i>islandicus.</i>	273	Lithospermum.	45
<i>jubatus.</i>	280	<i>arvense.</i>	—
<i>juniperinus.</i>	275	<i>officinale.</i>	—
<i>lacteus.</i>	268	Lobelia.	205
<i>niger.</i>	270	<i>dortmanna.</i>	—
<i>olivaceus.</i>	272	Lolium.	30
<i>pallefcens.</i>	271	<i>perenne.</i>	—
<i>parietinus.</i>	272	<i>temulentum.</i>	31
<i>paschalis.</i>	279	Lonicera.	56
<i>pertufus.</i>	269	<i>caerulea.</i>	—
<i>phyfodes.</i>	272	<i>xylofteum.</i>	—
<i>plicatus.</i>	279	Lotus.	176
<i>prunaftri.</i>	275	<i>corniculatus.</i>	—
<i>pullus.</i>	272	Lunaria.	155
<i>pulmonarius.</i>	274	<i>rediviva.</i>	—
<i>pyxidatus.</i>	277	Lychnis.	107
<i>rangiferinus.</i>	278	<i>dioica.</i>	108
<i>rugofus.</i>	268	<i>fios cuculi.</i>	107
<i>rupicola.</i>	269	<i>viscaria.</i>	—
<i>falicinus.</i>	270	Lycoperdon.	318
<i>fanguinarius.</i>	269	<i>Bovifta.</i>	319
<i>faxatilis.</i>	272	<i>capitatum.</i>	318
<i>fcriptus.</i>	267	<i>circumfciffum.</i>	—
<i>ftellaris.</i>	271	<i>epidendrum.</i>	319
<i>subfufcus.</i>	270	<i>giganteum.</i>	—
<i>subalatus.</i>	271	<i>gregarium.</i>	320
<i>tenuiffimus.</i>	274	<i>muricatum.</i>	319
<i>uncialis.</i>	278	<i>nitidulum.</i>	320
<i>verrucofus.</i>	271	Proteus.	318
Limofella.	151	<i>ftellatum.</i>	319
<i>aquatica.</i>	—		

INDEX.

	pag.		339 pag.
Lycopodium.	241	Mentha.	135
annotinum.	—	aquatica.	—
clavatum.	—	arvensis.	136
complanatum.	242	gentilis.	—
selago.	241	fylvestris.	135
Lycopsis.	48	Menyanthes.	50
arvensis.	—	trifoliata.	—
Lycopus.	8	Mercurialis.	234
europaeus.	—	perennis.	—
Lyfimachia.	50	Merulius.	304
numularia.	51	alneus.	305
thyrsiflora.	—	betulinus.	306
vulgaris.	—	cantharellus.	305
Lythrum.	111	cornucopioides.	304
falicaria.	—	cyathus.	305
		dimidiatus.	—
Malva.	168	quercinus.	306
crispa.	164	reticulatus.	305
rotundifolia.	—	Milium.	16
verticillata.	—	effusum.	—
Marchantia.	264	Mnium.	249
hemisphaerica.	265	caespitosum.	251
polymorpha.	264	cuspidatum.	252
umbellata.	265	fontanum.	251
Matricaria.	200	heteromallum.	—
chamomilla.	—	hygrometricum.	250
parthenium.	—	palustre.	251
Melampyrum.	146	pellucidum.	250
nemorosum.	—	proliferum.	252
pratense.	—	purpureum.	250
sylvaticum.	147	scoparium.	—
Melica.	21	ferpyllifolium.	251
altissima.	—	undulatum.	252
caerulea.	—	Monilia.	325
nutans.	—	caespitosa.	—

	pag.		pag.
Monilia.		Ophioglossum.	242
crustacea.	—	vulgatum.	—
glauca.	—	Ophrys.	210
leprosa.	—	cordata.	211
Monotropa.	95	lilifolia.	—
hypopithys.	—	monorchis.	212
Montia.	32	Nidus avis.	210
fontana.	—	ovata.	211
Mucor.	324	paludosa.	212
albus.	—	Orchis.	208
araneofus.	—	bifolia.	—
erysiphe.	—	conopsea.	210
flavus.	—	latifolia.	209
mucedo.	—	maculata.	—
virens.	—	odoratissima.	210
Myagrum.	152	Origanum.	142
paniculatum.	—	vulgare.	—
fativum.	—	Ornithogalum.	79
Myofotis.	44	luteum.	—
arvensis.	—	minimum.	—
lappula.	45	Orobanche.	151
palustris.	44	major.	—
Myosorus.	77	Orobis.	167
minimum.	—	vernus.	168
Myrica.	232	Osmunda.	242
gabe.	233	lunaria.	243
Myriophyllum.	224	ramosa.	—
spicatum.	—	regalis.	—
verticillatum.	—	Struthiopteris.	—
		Oxalis.	106
Nardus.	13	acetosella.	—
stricta.	—		
Nymphaea.	123	Panicum.	14
alba.	124	verticillatum.	—
lutea.	—	Papaver.	123

INDEX.

	pag.		pag.
Papaver.		Picris.	341
<i>Somniferum.</i>	—	<i>hieracioides.</i>	—
Parietaria.	237	Pimpinella.	74
<i>officinalis.</i>	—	<i>saxifraga.</i>	—
Paris.	93	Pinus.	227
<i>quadrifolia.</i>	—	<i>Abies.</i>	—
Parnassia.	76	<i>fylvestris.</i>	—
<i>palustris.</i>	—	Plantago.	38
Pastinaca.	73	<i>lanceolata.</i>	39
<i>fativa.</i>	—	<i>major.</i>	38
Pedicularis.	147	<i>maritima.</i>	39
<i>palustris.</i>	148	<i>media.</i>	—
<i>Sceptrum carolinum.</i>	—	Poa.	22
Peplis.	83	<i>angustifolia.</i>	—
<i>Portula.</i>	—	<i>annua.</i>	23
Peucedanum.	68	<i>aquatica.</i>	22
<i>officinale.</i>	—	<i>bulbosa.</i>	24
<i>Silaus.</i>	—	<i>compressa.</i>	—
Peziza.	316	<i>nemoralis.</i>	—
<i>Acetabulum.</i>	317	<i>palustris.</i>	23
<i>hirta.</i>	—	<i>pratensis.</i>	—
<i>minutissima.</i>	316	<i>trivialis.</i>	22
<i>purpurea.</i>	—	Polemonium.	52
Phalaris.	13	<i>caeruleum.</i>	—
<i>arundinacea.</i>	14	Polygala.	166
Phallus.	315	<i>amara.</i>	—
<i>esculentus.</i>	—	<i>vulgaris.</i>	—
Phellandrium.	71	Polygonum.	91
<i>aquaticum.</i>	—	<i>amphibium.</i>	92
Phleum.	14	<i>aviculare.</i>	—
<i>aranarium.</i>	15	<i>Bistorta.</i>	91
<i>nodosum.</i>	—	<i>Convolvulus.</i>	93
<i>pratense.</i>	14	Hydropiper.	92
Phlomis.	141	<i>Perficaria.</i>	—
<i>tuberosa.</i>	—	<i>viviparum.</i>	91

	pag.		pag.
Polypodium.	214	Pulmonaria.	47
cristatum.	245	officinalis.	—
Dryopteris.	246	Pyrola.	97
Filix foemina.	245	minor.	—
Filix mas.	—	rotundifolia.	—
Phegopteris.	—	secunda.	98
regium.	246	umbellata.	—
Thelypteris.	—	uniflora.	—
vulgare.	244	Pyrus.	115
Polytrichum.	248	Malus.	—
commune.	—		
juniperinum.	—	Quercus.	225
piliferum.	249	robur	226
undulatum.	—	Ranunculus.	130
Populus.	233	acris.	132
tremula.	234	aquatilis.	133
Potamogeton.	41	arvensis.	—
crispum.	42	auricomus.	131
gramineum.	—	bulbosus.	132
lebens.	—	cassubicus.	131
natans.	41	Ficaria.	130
perfoliatum.	42	Flammula.	—
puffillum.	43	Lingua.	—
Potentilla.	119	polyanthemos.	132
Anserina.	—	repens.	—
argentea.	—	reptans.	130
norvegica.	120	sceleratus.	131
reptans.	—	Raphanus.	160
Primula.	49	Raphanistrum.	—
officinalis.	—	Reticularia.	322
Prunella.	144	Ustilago.	—
vulgaris.	—	Rhamnus.	59
Prunus.	114	catharticus.	—
Padus.	—	Frangula.	—
Pteris.	244	Rhinanthus.	144
aquilina.	—	Crista galli.	145

INDEX.

343

pag.

pag.

Ribes.	60	Salix.	
alpinum.	—	fragilis.	229
nigrum.	61	fusca.	230
rubrum.	60	hermaphroditica.	228
Riccia.	266	incubacea.	230
crystallina.	—	lanata.	—
fluitans.	—	myrtilloides.	229
minima.	—	pentandra.	—
Rosa.	116	purpurea.	—
canina.	117	rosmarinifolia.	230
spinosissima.	—	triandra.	228
Rubus.	117	viminalis.	231
articus.	118	Saxifraga.	99
Chamaemorus.	—	hirculus.	—
fruticosus.	—	Scabiosa.	33
idaeus.	117	arvensis.	34
saxatilis.	118	Succisa.	33
Rumex.	83	sylvatica.	34
Acetosa.	84	Scheuchzeria.	85
Acetosella.	85	palustris.	—
acutus.	83	Schoenus.	11
aquaticus.	84	nigricans.	—
crispus.	83	Scirpus.	11
obtusifolius.	84	acicularis.	12
Sagina.	43	caespitosus.	11
erecta.	—	lacustris.	12
procumbens.	—	palustris.	11
Sagittaria.	225	sylvaticus.	12
sagittifolia.	—	Scleranthus.	99
Salix.	228	annuus.	100
alba.	232	perennis.	—
arenaria.	230	Scorronera.	178
aurita.	229	humilis.	—
caprea.	231	Scrophularia.	150
cinerea.	—	nodosa.	—

	pag.		pag.
Scutellaria.	144	Solanum.	
galericulata.	—	dulcamara.	—
Sedum.	105	nigrum.	59
acre.	106	Solidago.	197
Telephium.	105	Virgaurea.	—
Selinum.	66	Sonchus.	179
palustre.	67	arvensis.	180
fylvestre.	66	oleraceus.	—
Sempervivum.	113	palustris.	179
tectorum.	—	fibiricus.	180
Senecio.	196	Sorbus.	115
Iacobaea.	—	aucuparia.	—
paludofus.	197	Sparganium.	216
farracenicus.	—	erectum.	217
vulgaris.	196	Spergula.	109
Serapias.	212	arvensis.	—
latifolia.	—	laricina.	110
rubra.	213	nodosa.	109
Serratula.	187	Sphaeria.	323
arvensis.	—	Hypoxylon.	—
tinctoria.	—	militaris.	—
Seseli.	73	Sphagnum.	247
annuum.	—	palustre.	—
Silene.	102	Spiraea.	116
acaulis.	103	Filipendula.	—
noctiflora.	102	Ulmaria.	—
Sinapis.	159	Splachnum.	248
arvensis.	160	ampullaceum.	—
Sifon.	70	Stachys.	139
inundatum.	—	annua.	140
Sifymbrium.	156	arvensis.	—
amphibium.	—	palustris.	—
nasturtium.	—	fylvatica.	—
Sophia.	157	Stellaria.	103
fylvestre.	156	crassifolia.	104
Solanum.	58	Dilleniana.	—

INDEX.

	pag.		pag.
graminea.	—	Tormentilla.	345
holosteae.	103	— erecta.	—
nemorum.	—	Tremella.	313
Stemonitis.	321	— arborea.	314
Embolus.	—	— cinnabarina.	315
fulva.	322	— granulata.	313
lichenoides.	321	— hemisphaerica.	314
sphaerocephala.	—	— mesenterica.	—
typhina.	—	Noctoc.	—
vesiculosa.	322	— pruniformis.	—
vitellina.	—	— verrucosa.	315
Stratiotes.	126	Trientalis.	86
— aloides.	127	— europaea.	—
Subularia.	152	Trifolium.	172
— aquatica.	153	— agrarium.	175
Symphytum.	47	— arvense.	174
— officinale.	48	— flexuosum.	176
		— fragiferum.	175
Tanacetum.	191	— hybridum.	173
— vulgare.	192	Melilotus officin.	172
Thaëlaephora.	312	— montanum.	174
— mesenterica.	—	— pratense.	173
— fericea.	—	— repens.	—
Thalictrum.	128	— rubens.	—
— angustifolium.	129	— spadiceum.	175
— aquilegifolium.	—	Triglochin.	85
— flavum.	—	— palustre.	—
Thlaspi.	154	Triticum.	32
— arvense.	—	— repens.	—
— Bursa pastoris.	—	Trollius.	133
Thymus.	143	— europaeus.	134
— Acinos.	—	Tuber.	323
— Serpyllum.	—	— guloforum.	—
Tilia.	124	Turritis.	158
— europaea.	—	— glabra.	—
		— hirsuta.	159

	pag.		pag.
Tuffilago.	195	Veronica.	
Farfara.	—	longifolia.	3
Petafites.	196	maritima.	—
Typha.	216	officinalis.	4
angustifolia.	—	scutellata.	5
latifolia.	—	serpyllifolia.	4
		spicata.	—
Ulmus.	63	spuria.	3
campestris.	—	triphyllus.	6
Ulva.	282.	verna.	7
intestinalis.	—	Viburnum.	75
Urtica.	223	Opulus.	—
dioica.	—	Vicia.	170
urens.	—	Cracca.	—
Utricularia.	8	monantha.	171
vulgaris.	—	fativa.	170
		sepium.	171
Vaccinium.	88	sylvatica.	170
Myrtillus.	89	Viola.	205
Oxycoccus.	—	arvensis.	207
uliginosum.	—	canina.	206
Vitis idaea.		hirta.	—
Valeriana.	9	mirabilis.	207
officinalis.		odorata.	206
Verbascum.	57	palustris.	—
nigrum.		tricolor.	207
Thaphus.			
Veronica.	3	A d d e n d a.	
acinifolia.	7	Ascophora.	326
agrestis.	6	fragilis.	—
Anagallis.	5	Peziza.	326
arvensis.	6	ciliata.	—
Beccabunga.	5	cyathoides.	—
Chamaedris.	—		
hederaefolia.	6		

РОСПИСЬ.

Россійскимъ наименованіямъ растѣній во
Флорѣ Санктпетербургской описанныхъ.

	No.		No.
Авранъ.	22	Бѣлобумажникъ.	951
Алабасшренникъ.	284	Бѣлокопышникъ.	538
Амараншъ.	622	Бѣлоусъ.	37
Арженецъ.	40 — 42	Бѣлый грибъ.	937
		Бѣлянка.	886
		Бѣшеница.	204
Багонъ.	271	Василекъ.	563
Балдырянъ.	153	Варварка.	433
Бальсамина.	567	Вахта.	147 625
Баранецъ.	667	Белвошъ.	268
Башенница.	438 439	Вербъ.	630 — 645
Бедринецъ.	211	Вербейникъ.	149 — 151
Безплодница.	272 273	Вербовникъ.	316
Белена.	168	Вербочникъ.	30
Береза.	615 — 617 619	Верескъ.	257
Березовикъ.	934	Вересъ.	257
Бересклетъ.	173	Верешенникъ.	872
Благодашъ.	22	Вероника.	6 — 21
Благородникъ.	526	Веселые глазки.	576
Блекоша.	168	Вешла.	631 632 636 637
Блеснедъ.	38	Виолетка.	569 — 575
Блошница.	536 537	Водопріятность.	651
Богашница.	535	Водопѣрица.	623 624
Богородицына ручка.	671	Водосборъ.	353
Богородская справа.	399	Водяная звѣздочка.	2 3
Болиголовъ.	236	Водяная сосонка.	1
Боровикъ.	937	Возгрица.	968
Боровникъ.	39	Волкобой.	352
Бородавочная справа.	511	Волконожѣ.	666 — 669
Бородавочникъ.	1003	Волнушка.	884
Бородавчица.	511	Воловикъ.	136 — 138
Борщъ.	198 199	Воловый языкъ.	136
Боръ.	39	Волоснедъ.	96 98
Боярешникъ.	323	Волуекъ.	858
Бранъ.	153	Волуй.	858
Брусника.	255	Волчьи бобки.	598
Будра.	350 283	Волчій корень.	352
Буквица.	146 390	Волчій перецъ.	258
Булавасшикъ.	959 — 962	Волчья нога.	24
Будырякъ.	26	Волычатка.	23
Быльнякъ.	422		

	No.			No.	
Воробейникъ.	134	135	Дикій крестъ,		423
Воронецъ.		344	Дождевикъ.	983	— 992
Вороній глазъ.		266	Донникъ.		473
Воронка.		876	Дрема.	305	— 307
Вшивая права.		410	Дрожалка.	963	— 970
Вшивица.		410	Дубъ.		626
Вѣшреница.	355	— 359	Дубровка.		378
Гвоздичка.	285	286	Дублянка.		885
Гвоздичникъ.		341	Дуплянка.	877	890 891
Гвоздочникъ.	995	— 1001	Душица.		398
Гирча.	192	193	Дымница.	455	456
Глазница.	404	405	Дѣпская права.	577	582
Глишникъ.		529	Дягиль.	200	201
Гнилушка.	904	— 910	Дягильникъ.		200
Гонобель.		254	Дяглица.		212
Голубецъ.		862	Дяшлина.		477
Голубика.		254	Едкомлечникъ.	318	— 320
Голубки.		353	Ежа.		75
Горбачокъ.		949	Ежевика.		331
Горецъ.	259	— 265	Ежова голова.		598
Горичникъ.	196	197	Ежоголовка.		598
Горькуша.		893	Ежовикъ.	953	— 956
Горлянка.	566	567	Ель.		629
Горногорошникъ.		460	Ерникъ.		646
Гороховникъ.	461	— 465	Жабная права.		566
Горчавка.	186	489	Жабникъ.	263	— 373
Горчица.	434	437 442	Жабрей.		412
Гопшонка.		148	Жалга.	123	— 123
Гравилашъ.	341	342	Желтоголовъ.		376
Гребенникъ.	76	341 342	Желтушка.		873
Грибъ.	845	1016	Живучка.		321
Груздь.		892	Жигалокъ.		173
Грушовка.	275	— 279	Жилочница.	839	— 844
Грязница.		417	Жимолосць.	164	165
Губа.	943	947 948	Жируха.	129	130
Губка.	944	— 946	Журавлина.		256
Гулявица.		560	Журавлинникъ.	444	— 451
Гулявникъ.	431	— 433	Завязникъ.		340
Гусиная нога.	177	— 549	Завязный корень.		340
Гусиная права.		334	Занозка.	77	— 79
Двузубецъ.	523	— 625	Запя права.		396
Девясиль.	547	— 546	Заразиха.		418
День и ночь.		655	Заспаса.		362
Дерев'й.		560	Заячая капуста.		301
Деревянка.		920	Заячьи лапы.		473
Деревянникъ.		952	Зячникъ.		941
Деренъ.		120	Зябдошница.	292	— 296
Дивала.	280	283			

	No.		No.
Звѣздочный мохъ.	694 — 705	Комышъ.	30 — 34
Звѣробой.	485 — 487	Конопельникъ.	526
Зеленчакъ.	860	Копышень.	315
Земляника.	335	Копѣчникъ.	403
Змѣвикъ.	531 — 534	Корнячокъ.	940
Змѣйна права.	391	Косатикъ.	27 — 28
Змѣбный языкъ.	670	Костеръ.	80 — 85
Золотникова права.	215	Костяница.	332
Золошничка.	215	Кошечья лапа.	531
Золошолосникъ.	280	Кошка.	317
Золошотысячникъ.	187	Крапива. 384 385 620	621
Золошуха.	360 — 363	Крапивная малина.	122
Ива. 630 632 633 643		Красный грибъ.	939
Иванъ да марья.	406	Крестъ. 423 428 —	430
Ивановъ цвѣтъ.	550 — 552	Кривошейка.	142
Икошка	426	Крепива.	620
Икошная права.	426	Крушина.	178
Илемъ.	185	Куколь.	304
Исподъ.	457 458	Купальница.	363
Кавалерскіе шпоры.	351	Курслѣвъ.	377
Калачики.	452	Курятникъ.	387 — 389
Калина.	213	Курлячь слѣпоша.	385
Каменика.	332	Кушинчикъ.	347 348
Каменное семя.	134	Ландышъ.	224 — 227
Каменосѣкъ.	281	Львиная лапа.	121
Канарейникъ.	38	Львиноусть.	412 — 414
Капустя.	440	Львинохвостъ.	395
Кашка.	477	Львиный хвостъ.	418
Кервель.	206 207	Лебеда.	179 656
Кипрей.	248 — 252	Леденецъ.	484
Кислица.	303	Ленъ.	416
Кленъ.	657 658	Ленепочница.	749 — 751
Клоповница.	561	Лизимахія.	149 — 152
Клубочникъ.	101	Линяя.	416
Клюква.	256	Липа.	349
Княжница.	333	Лисье ядро.	588 589
Козелецъ.	488	Лисій хвостъ.	43 — 45
Козлякъ.	938	Лисояка. 878 879 924	925
Козьякъ.	938	Лихорадочная права.	2
Кокушкинъ ленъ.	690 — 693	Лишай.	757 819
Кокушкины сапожки.	590	Лобелія.	568
Кокушкины слезы.	577 579	Лопушникъ.	513
Кокушница.	577 — 581	Лоскутница.	562 — 563
Колдуница.	4 5	Лоскушный цвѣтъ.	562
Колокольчикъ.	154 — 163	Лошаково ухо.	141
Колосница.	391 — 394	Лувня права.	427
Колосокъ пахучій.	25	Лучокъ.	321
Колычка.	516 — 520	Лѣснякъ.	849

	No.		No.
Лѣщина.	927	Обвивальница.	152
Лягушникъ.	651	Овесь.	86 — 89
Макъ.	346	Овсецъ.	80 — 85
Малина.	330	Огнецвѣтникъ.	406 — 408
Мансто.	1013 1016	Одуванчикъ.	494 — 496
Манная шрава.	79	Ожерелье.	1013
Маралка.	993 994	Ольха.	613
Маринъ бапшачокъ.	590	Ольшанка.	865
Масленникъ.	936	Омегъ.	191
Мать да мачиха.	538	Опенка.	863 867 870
Машеринка.	398	874 894 898	
Машочная шрава.	533	Опенковъ колшачокъ.	869
Машочница.	533	Опенокъ.	854 866 899
Маунъ.	29	901 — 903	
Медвежьи ягоды.	274	Орлиное крыло.	675
Медуница.	140	Орлякъ.	675
Мешелка.	65 — 73	Орѣшникъ.	627
Младенчица.	582 — 587	Осешъ.	521
Млекоссѣдъ.	110	Осына.	649
Могущикъ.	336 — 339	Осока.	599 — 514
Можжевелникъ.	652	Осопъ.	521
Можуха.	652	Опдышная шрава.	102 — 104
Мокрица.	214	Очная помощь.	404
Мокричникъ.	100	Павлинные очки.	353
Молодило.	302	Папоротникъ.	675 677 — 674
Молошочникъ.	56 — 61	Пасленъ.	179 170
Молочай.	490 — 493	Паспернакъ.	209
Молочникъ.	856	Пастушьа сумка.	425
Морковь.	190	Пахучка.	647
Морошка.	334	Пепельникъ.	545 546
Мохъ.	586 688 689	Первоцвѣштъ.	146
Мохнашикъ.	936	Перловникъ.	62 — 64
Мудрость лѣкарская.	433	Песшикъ.	259
Мускашница.	267	Пестрецъ.	956
Мухоморъ.	845 — 848	Петровъ крестъ.	409
Мышачій огонь.	841	Петрушечникъ.	202
Мышье ушко.	131 — 133 497	Печерица.	852 853
Мышій горохъ.	466 — 470	Пижма.	527
Мышій хвощъ.	219	Плакунъ.	316
Мѣсячникъ.	427	Плаунъ.	666
Мѣшечница.	828	Плевель.	94 95
Мяша.	379 — 382	Плѣсня.	1007 — 1012
Мяшлика.	65 — 73	Плѣснякъ.	871
Наросшень.	921	Повилца.	122 153
Нипчанка.	829 — 838	Повилчичные колокольчики.	152
Норычникъ.	415	850 851 861	
Обабокъ.	942	911 — 919	
		Подбѣлъ.	539

	No.		351 No.
Подгруздь.	888	Репейникъ.	513
Подлепесточница.	752	Репешникъ.	317
Подлѣсникъ.	316	Репникъ.	317
Подмаренникъ.	106 114	Решетница.	753 — 755
Подорожникъ.	115 — 118	Роговикъ.	308 — 311
Подорѣшникъ.	855	Рогоза.	596 597
Подосиновикъ.	939	Ромашка.	554 556
Полевица.	47 — 55	Роса каменная.	676
Полусухлянка.	933	Росникъ.	121
Полушляница.	685	Рукосвѣчникъ.	592
Полынь.	529	Румянка.	143
Полѣска.	650	Рыжикъ.	883 887
Полово гумендо.	494	Рѣзь.	419
Попутникъ.	115 — 118 246	Рѣзуха.	419 420
Поростъ.	757	Рѣпа.	441
Порѣзь.	194 195	Рябина.	324
Порѣзная справа.	194	Рябинка.	527
Посошокъ.	396	Ряска.	593 — 595
Постельница.	397		
Почечуйникъ.	263	Сабельникъ.	27 28 343
Придорожная иглока.	171	Сальный корень.	141
Проказа.	820 — 827	Сальница.	141
Просвирки.	452	Соломонова печашь.	225
Просвирничка.	452 — 454	Свербѣжница.	102 — 104
Просо.	39 46	Свинушка.	882 891
Прострѣлъ.	357	Свирѣпка.	434 — 436
Просяникъ.	653 654	Сердечная трава.	395
Пшичье гнѣздо.	582	Серебренникъ.	337
Пшичье млеко	222 223	Серпуха.	514 515
Пузырникъ.	287 — 289	Сизякъ.	881
Пупавка.	555 — 558	Сиякъ.	859
Пупыричникъ.	957 958	Ситникъ.	228 — 236
Пупникъ.	859 868	Ситница.	244
Пуховникъ.	522	Скипетръ каролинскій.	411
Пушица.	35 36	Скриница.	889
Пчелнососка.	384 — 386	Скрипуха.	507 508
Пшеница.	99	Сладка и горька.	169
Пырей.	99 698	Смолевка.	306
Пѣтушья головка.	388	Смолянка.	290 291
Пѣтушій гребень.	403	Смородина.	174 — 176
Пѣтушокъ.	28	Сморчокъ.	971
Пѣзданка.	297 — 300	Снишь.	212
Пьяница.	254	Собачья голова.	415
Пятилишникъ.	337 — 343	Собачія щетрушка.	205
		Собачій хвостъ.	76
Ракушникъ.	880	Собачій языкъ.	139
Рдестъ.	123 — 128	Собачникъ.	139
Ребина.	324	Сокольникъ.	497 — 506
Редька.	443	Солнечная роса.	217 218

	№.		№.	№.
Сольникъ.	459	Хмѣль.	473	482 648
Солянка.	875	Христофорова шрава.		344
Сосна.	628	Царалница.		114
Сошенникъ.	119	Царица луговъ.		327
Спорышъ.	237 264	Царскій скипешръ.	166	167
Стаканничокъ.	979 — 982	Цвѣшорогъ.		756
Сшарина.	540 — 543	Цихорій.		512
Спародубка.	186 — 189	Частуха.		246
Спрочокъ.	972 — 974	Чашница.	975 —	978
Спрѣла.	625	Черемха.		322
Спуденецъ.	922	Черника.		253
Спѣнная шрава.	655	Черница.		253
Сусакъ.	269	Чернобѣльничкъ.	528	530
Сухарь.	923	Черноголовъ.		402
Суклянка.	931 — 932	Чернушка.		923
Сучковъ мохъ.	717 — 737	Чертополохъ.		562
Сыроѣжка.	857 864	Чеснокъ.	220	321
Сѣшочница.	1002	Чесночникъ.		900
Таволга.	326 327	Чечевица.	471	472
Тальникъ.	637 — 639	Чистецъ.		203
Твердочашечница.	144 145	Чистотѣль.		345
Тиміянъ.	399 400	Чистоустъ.	671 —	674
Тимонъ.	210	Чистякъ.	28 345	366
Толокнянка.	274	Чихошная шрава.		559
Торица.	312 — 114 426	Чумный корень.		539
Травянка.	285 286	Шампиніонъ.		852
Тривострица.	245	Шерошница.		105
Трилистникъ.	147 355 473 — 483	Шильница.		421
Троечный цвѣшъ.	574	Шиповникъ.	328	329
Троечница.	247.	Щевель.	238 —	243
Тростникъ.	90 — 93	Щепинница.		37
Трушъ.	945	Щишовка.		401
Трушовица.	926 — 930	Яблонь.		325
Труфель.	1006	Ягадки.		253
Трясучка.	74	Ядрушки.		577
Тѣлорѣзъ большой.	354	Язвенникъ.		459
Тѣнный мохъ.	738 — 748	Яички.		577
Уединенница.	270	Ярушка.		424
Ужовникъ.	488	Ясень.		656
Узловый мохъ.	706 — 716	Ясень.		659
Укропъ.	203	Ястребка.	509	510
Хасимъ.	494	Ястребная шрава.		509
Хвещъ.	660 — 665			
Хлѣбница.	591			

